

Х Е Р Б И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	ЛД 50 орал но за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за упот-реба
1.	АГРОКСОН /СЕРИДОР МЦПА НюФарм Удостоверение № 0551- ПРЗ- 2/30.05.2011 г. Валидно до : 31.12.2011г.	500 г/л МЦПА	200 мл/дка	Срещу широколистни плевели при: Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	700	-	2
2.	АДЕНГО 465 СК Байер КропСайанс АГ - Германия Удостоверение № 01171-ПРЗ - 2/28.08.2013 г. Валидно до: 30.04.2015 г. Заповед №РД 11- 180/18.02.2013 г. Заповед № РД 11- 839/05.08.2013 г.	225 г/л изоксафлутол + 90 г/л тиенкарбазон – метил + 150 г/л ципросулфамид (антидот)	35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно)	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена при: Царевица (зърно и силаж) Момент на приложение: фаза на културата (преди поникване) - ВВСН 00-07 или фаза на културата (ранно вегетационно) до фаза 3-ти лист на културата (ВВСН 09-13) и фаза на развитие на плевелите 2-3 лист.	> 5.000	-	първа професи онална
3.	АЖИЛ 100 ЕК /ШОГУН 100 ЕК АДАМА КУЕНА Н.В., Кюракао Разрешение №01093 – ПРЗ* - 3/28.04.2016 г. Валидно до: 30.11.2020 г. Заповед №РД 11- 1508/02.10.2015 г. и Заповед №РД 11- 613/19.04.2016 г	100 г/л пропаквизафоп	75-120 мл/дка 150-200 мл/дка 100-150 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища: Домати, лук, захарно цвекло, памук: внася се във фаза След ВВСН 11 Домати – първи същински лист на основното стъбло. Лук – първи лист ясно видим. Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени. Памук – първи същински лист разтворен Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; Срещу балур, при височина на балура 10-20	>5000	Домати, лук – 30; Захарно цвекло -45; Памук – 90; Соя, Слънчоглед, Маслодайна рапица, - 90; Лозя – 30; Картофи -40; Тютюн – 40, Леща – 50; Моркови, магданоз – корен, спанак – 30;	втора професи онална

<p>Разрешение №01093 – ПРЗ*- 2/19.10.2015 г. Валидно до: 30.11.2020 г.</p> <p>*Гаратисен период за продажба 6 месеца, и употреба 12 месеца, считано от 19.10.2015 г.</p>			см		<p>Патладжан, чесън, броколи – 30, Варива (фасул, грах, бакла нахут) – 50, Пресни (фасул, грах)- 40, Лен – 90; Копър-30;</p>
		75-120 мл/дка	Соя: внося се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа		
		80 мл/дка	Слънчоглед: внося се след ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени		
		50 мл/дка 75-120 мл/дка 150-200 мл/дка 100-150 мл/дка	Маслодайна рапица: След ВВСН 11 разтворен първи лист Срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см Срещу балур, при височина на балура 10-20 см		
		75-120 мл/дка; 150-200 мл/дка 100-150 мл/дка	*Допълнителна употреба Лозя : ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; Срещу балур, при височина на балура 10-20 см		
		75-120 мл/дка; 150мл/дка 100-150 мл/дка	*Допълнителна употреба Картофи: След ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; Срещу балур, при височина на балура 10-20 см		

			<p>75-120 мл/дка</p> <p>150-200 мл/дка</p> <p>100-150 мл/дка</p>	<p>*Допълнителна употреба</p> <p>Тютюн, леща: След ВВСН 11.Тютюн – първи същински лист на основното стъбло.Леща – разлистен първи лист</p> <p>Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>Срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p>			
			<p>75-120 мл/дка;</p> <p>150мл/дка</p> <p>100-150 мл/дка</p>	<p>*Минимални употреби</p> <p>Моркови, магданоз – корен, спанак: Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист</p> <p>Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>Срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p>			
			<p>75-120 мл/дка;</p>	<p>*Минимални употреби</p> <p>Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове: След ВВСН 11.Патладжан – първи същински лист на основното стъбло.Чесън – първи лист ясно видим.Броколи –разтворен първи същински лист.Фасул – развитие на първите листа.Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче.Бакла, нахут -разлистен първи лист.Лен –първи същински лист разтворен.Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа</p> <p>Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p>			

			150-200 мл/дка 100-150 мл/дка	Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; Срещу балур, при височина на балура 10-20 см			
			75-120 мл/дка; 125 мл/дка 100-125 мл/дка	*Минимални употреби Копър: След ВВСН 11 първи същински лист разтворен Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото Срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; Срещу балур, при височина на балура 10-20 см			
4.	АКРИС БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01474 – ПРЗ- 1/18.04.2017г. Валидно до:31.10.2018г. Заповед № РД 11- 710/06.04.2017 г.	диметенамид-П 280 г/л тербутилазин 250 г/л	200-300 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Царевича *Прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване - след поникване до 6 лист на културата)	> 300 - < 500	-	втора професионална
5.	АКСИАЛ 050 ЕК Синджента -Разрешение № 01075- 5/ 09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. Заповед №РД 11- 1367/25.07.2016 г. *Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 25.07.2016 г. на ПРЗ Разрешение № 01075- 4/ 13.08.2014 г.	50 г/л пиноксаден	60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при: Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите	2000	-	втора професионална (2)
6.	АКСИАЛ ЕДНО	45 г/л		Срещу едногодишни житни плевели в т. ч.	5000	-	непрофе

	<p>Синджента -Разрешение № 01121-5 / 09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. Заповед №РД 11-1368/25.07.2016 г. *Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 25.07.2016 г. на ПРЗ с Разрешение № 01121-4 / 13.08.2014 г.</p>	<p>пиноксаден+ 5 г/л флорасулам</p>	<p>100 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор</p>	<p>див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при: Пшеница и ечемик - внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели</p>			<p>сионална (3)</p>
7.	<p>АКТИВУС Адама Аган, Израел Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г., Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. Разрешение № 01288 – ПРЗ-2/18.11.2015 Валидно до : 31.07.2017г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 06.11.2015г. на ПРЗ ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ Разрешение № 01288 – ПРЗ-2/18.11.2015</p>	<p>Второ търговско име на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ</p>					

	Валидно до : 31.07.2017г.						
8.	АКУРАТ 20 ВГ Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01396 – ПРЗ*-1/ 10.05.2016 г. Валидно до : 30.06.2017 г. Заповед №РД 11- 683/22.04.2016 г.	метсулфурон- метил 200 гр./кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:		Пшеница, Ечемик, Зимна ръж, Тритикале- 90; Свободни площи - 120*Срок на пускане на паша на селскостопан- ски животни след приложение	втора професи онална
			1,5 гр./дка	Пшеница (мека и твърда): Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
			1,5 гр./дка	Ечемик (зимен и пролетен): Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
			1,5 гр./дка	Зимна ръж: Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
1,5 гр./дка	Тритикале: Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)						
3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)						
	Ограничаване на растежа и образуването на семена при плевелите						
2 гр./дка	Свободни площи *Срок на пускане на паша на селскостопански животни след приложение - 120 дни						
9.	АКУРАТ 60 ВГ Хеминова Удостоверение №	600 г/кг метсулфурон - метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	5000	-	3

	0359/26.04.2006г.		1 г/дка	Пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата. Забележка: В предложената доза продуктът не контролира лепка и паламида			
10.	АКУРАТ ЕКСТРА ВГ Хеминова Агро Франция С.А.С -Удостоверение № 1243 –ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 31.12..2016 г.	680 г/кг тифенсулфурон метил 70 г/кг метсулфурон метил		Едногодишни широколистни плевели:		-	2
			5 г/дка	Пшеница Ечемик *да не се прилага при хлебна пшеница, както и при пивоварен ечемик и ечемик за семе			
11.	АКЦЕНТ 75 РХ ДюПон Де Немур САС Разрешение № 01220- ПРЗ-2 /19.03.2015 г. Валидно до: 29.01.2024 г. Заповед №РД 11- 263/13.02.2015г.	750 г/кг никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей) и някои широколистни плевели		-	непрофесионална (3)
			7 г/дка + 0,1% Тренд 90	Царевница: внася се във фаза: 2-8 лист на културата (ВВСН 12-18) 1-3 лист на едногодишните житни плевели (ВВСН 11-13), височина на балура 15-25 см и пирея (ВВСН 21-23), 2-4 лист на широколистните плевели (ВВСН 12-14) и 4-6 лист на паламидата (ВВСН 14-16)			
12.	АЛАЙ МАКС/ ПОЙНТЕР УЛТРА ДюПонт ИО -Удостоверение № 01058-ПРЗ-2/ 25.04.2013 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	143 г/кг метсулфурон- метил+ 143 г/кг трибенурон- метил		Срещу широколистни плевели при:	5000	-	3
			3,5 г/дка с 30-40 л/дка работен разтвор	Пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретене на културите			
13.	АЛИАНС ВГ / ПОЛИМЕР ВГ Ню Фарм С.А.С. -Разрешение № 1186- ПРЗ-2/04.07.2016 г.. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11- 1050/14.06.2016 г. *Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за	дифлуфеникан 600 г/кг + метсулфурон метил 60 г/кг	7,5 г/дка	Срещу широколистни плевели при: Ечемик Твърда пшеница Мека пшеница Ръж Тритикале *Момент на приложение(фаза на приложение):ВВСН 32 (до втори възел)		-	втора професионална (2)

	съхранение и употреба, считано от 14.06.2016 г. на ПРЗ етикетирани в съответствие с -Удостоверение № 1186/28.08.2013 г.						
14.	АЛКАНС СИНК ТЕК ФМС Кемикъл Спрл, Белгия Разрешение № 01350 – ПРЗ-2/07.09.2017г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11-1859/11.12.2015 г. Заповед №РД 11-1673/10.08.2017 г.	кломазон – 43 г/л пендиметалин – 298 г/л	250 мл/ дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели: Картофи (с изключение на картофи, отглеждани за посадъчен материал): Внася се във фаза ВВСН 00-10 (от засяване до фаза първите листенца започват да нарастват) *Вода литра/дка - 20-60 л/дка *Брой Мин/макс приложения -1		-	втора професионална
15.	АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ Мактешим Аган Агро Полша -Удостоверение № 01019-ПРЗ-2/10.08.2010 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
16.	АРАТ БАСФ СЕ -Разрешение № 332-ПРЗ-2/21.01.2016 г. Валидно до: 30.11.2019 г. Заповед №РД 11-08/07.01.2016 г.	500 г/л дикамба+ 250 г/л тритосулфурон		Срещу широколистни плевели:	5000 1700	-	втора професионална
			10-20 г/дка	Пшеница, ечемик Прилага се във фаза ВВСН 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето) *Може да се прилага с адювант ДЕШ-50 мл/ дка			
			20 г/дка + ДЕШ-100 мл/дка	Царевича: Прилага се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист) * Да не се използва при сладка царевича			
	*Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от	500 г/л дикамба+ 250 г/л тритосулфурон		Срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при		-	3
			10-20 г/дка	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			

	09.12.2015 г. на ПРЗ АРАТ -Удостоверение № 332/25.01.2006 г.		10-20 г/дка+ 50 мл/дка ДЕШ	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 50 мл/дка			
			20 г/дка+ 100 мл/дка ДЕШ	Царевича - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 100 мл/дка			
17.	АРИГО ВГ Дю Пон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария Разрешение №01455 – ПРЗ- 1/17.11.2016 г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед №РД 11- 2015/20.10.2016 г	мезотрион 360 г/кг никосулфурон 120 г/кг римсулфурон 30 г/кг	33 г/дка +0,1% Тренд 90	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж) *Приложение: От 2ри до 8ми лист на царевичата (ВВСН 12-18), 1 - 3 лист на житните и 2 - 4 лист на широколистните плевели		-	втора професионална
18.	АРКАДА 880 ЕК Синджента -Удостоверение №01257–ПРЗ -3 / 16.09.2015 г. Валидно до: 03.07.2024 г.	800 г/л просулфокараб 80 г/л метрибузин	400-500 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели при: Картофи: Приложение: фаза ВВСН 00-10 (след засаждане, преди поникване на културата до височина на стъблото 5 см.)	>2000	Не се изисква	Непрофесионална
19.	АСТРАЛ 4 СК НюФарм САС -Разрешение № 01055-ПРЗ- 3/04.07.2016г. Заповед №РД 11- 1049/14.06.2016 г.	Второ търговско име на СИРИО 4 СК					

20.	АТЛАНТИС ФЛЕКС 20,25 ВГ Байер САС, Франция, Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 01524 – ПРЗ -1/07.12.2017 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед №РД 11- 2545/29.11.2017 г.	Мезосулфурон-метил - 45 г/кг Пропоксикарбазон-натрий - 67,5 г/кг Мефенпир – диетил (антидот) – 90 г/кг	20-33 г/дка	Зимна пшеница (мека и твърда) тритикале - срещу едногодишни житни и широколистни плевели Внася се във фаза ВВСН 13-32 три листа разтворени – вторият възел е най-малко на 2 см. над първия възел *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 * Прилага се с адювант Биопауър – 100 мл/дка	-	-	втора професионална
21.	АУРА БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01397 – ПРЗ-1/ 10.05.2016 г. Валидно до: 31.07.2022 г. Заповед №РД 11- 686/22.04.2016 г.	профоксидим 200 г/л	40 мл/дка 50 мл/дка 60-80 мл/дка 100 мл/дка	Кокошо просо (<i>Echinochloa crus galli</i>), Дараджан (<i>Echinochloa oryzoides</i>), Диво просо (<i>Echinochloa colonum</i>), Есенно просо (<i>Panicum dichotomiflorum</i>) Ориз (пресушено поле) Внася се във фаза ВВСН 14-15 (4-5 листа на културата) Внася се във фаза ВВСН 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя) Внася се във фаза ВВСН 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя) Внася се във фаза ВВСН 29 (край на братене, максимален брой братя) * Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%		-	втора професионална
22.	АФАЛОН 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 241/22.12.2004 г.	450 г/л линурон	100-150 мл/дка 300 мл/дка 300-400 мл/дка	Срещу едногодишни широколистни плевели при: Лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите Слънчоглед Соя Внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед	4000	60	2
23.	АЧИБА 5 ЕК Нисан кемикъл -Разрешение № 01054-ПРЗ-2 /17.11.2016 г. Заповед №РД 11.- 2020/20.10.2016 г	Второ търговско име наТАРГА СУПЕР 5 ЕК					

24.	БАЗАГРАН 480 СЛ БАСФ СЕ -Разрешение № 512-4/13.08.2014 г.	480 г/л бентазон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>1000	56 дни за картофи и 30 дни за всички останали култури	3
			100-150 мл/дка	Градински грах за семепроизводство			
			180 мл/дка	Копър Резене Хизоп			
			200 мл/дка	Лук Чесън Картофи			
		200 мл/дка	Фасул и грах - полско производство Соя Лен				
25.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт -Удостоверение № 144/05.02.2004 г.	980 г/кг дазомет		Срещу едногодишни житни и широко- листни плевели при:	520	-	1
			10-20 г/кв.м.	Тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен			
26.	БАЗИС 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0531/20.10.2008 г.	500 г/кг римсулфурон+ 250 г/кг тифенсулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:	>5000	30	3
			2-2,5 г/дка+ Тренд - 0,1 %	Царевича - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.			
27.	БАЛЕАГЛЮФО Монсанто Юръп С.А., Белгия Разрешение №01404 – ПРЗ- 2/06.03.2017г. Валидно до: 30.06.2017г. Заповед № РД 11- 684/22.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 292/08.02.2017 г.	Второ търговско име на ВЕЗУВИЙ					
28.	БАСТА 15 СЛ Байер КропСайанс Германия -Удостоверение № 563 –ПРЗ -	150 г/л глюфозинат амониум		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	1.730	14	3
			500 мл/дка	Овощни градини и лозя - внася се само редово в активна вегетация на плевелите			

	2/29.01.2014 г Валидно до: 29.12.2009 г*** Заповед №РД 12- 61/29.12.2006г.						
29.	БАРКЛИ ГАЛЪП 360 /БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 Баркли Кемикалс -Удостоверение №1156/01.08.2012г. Валидно до: 30.07.2022 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели през вегетацията	2000	30	2
			400 - 1200мл/дка	Лозя и овощни градини			
			1200 мл/дка	Стърница и ж.п. линии			
30.	БАТЪЛ ДЕЛТА Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01526 – ПРЗ-1/19.12.2017 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед №РД 11- 2652/06.12.2017 г.	флуфенасет - 400 г/л дифлуфеникан - 200 г/л	60 мл продукт/дка	Пшеница, ечемик, ръж, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-разтворени 3 листа) * Брой мин/макс приложения – 1 * Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	-	-	втора професионална
31.	БЕЛВЕДЕРЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01297–ПРЗ-1 /19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	десмедифам – 160 г/л фенмедифам – 160 г/л		Срещу широколистни плевели		90	непрофесионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло * Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение: 1.ВВСН 10 (видими първи листа) 2. ВВСН 12 (първи чифт листа) 3. ВВСН 14 (втори чифт листа) Максимална доза – 300 мл/дка за година			
32.	БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01296–ПРЗ-1 / 19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	фенмедифам – 100 г/л десмедифам – 100 г/л етофумезат – 200 г/л		Срещу широколистни плевели:		90	непрофесионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло *Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение ВВСН 10 -14 (котиледоните са хоризонтално разтворени – втори чифт листа); Максимална доза – 300 мл/дка за година			

33.	БЕЛУРЕ – Т Пробелте, С.А., Испания Разрешение № 01406 – ПРЗ -1/ 09.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11- 611/19.04.2016 г.			Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	непрофесионална
			2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж			
34.	БИАТЛОН 4Д БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01312 – ПРЗ- 1/16.0.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г	флорасулам – 54 г/кг тритосулфурон – 714 г/кг		Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели	>300 - >2000	Неприложимо	втора професионална
			4 -5,5 г/дка	Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале			
			4 -5,5 г/дка + 100 мл/дка адювант ДЕШ	Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале			
35.	БИСМАРК КС Оксон Италия С.п.А Разрешение №01419 – ПРЗ- 2/14.02.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД 11-946/31.05.2016 г. и Заповед №РД 11-171/24.01.2017 г. Разрешение № 01419 – ПРЗ-1/07.06.2016 г. Валидно до: 31.07.2017 г. Заповед №РД 11-946/31.05.2016 г.	кломазон - 55 г/л пендиметалин - 275 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална
			200-250 мл/дка	Памук *След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			250-300 мл/дка	Тютюн * Преди разсаждане			
			120-150 мл/дка	Рапица * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			200-300 мл/ дка	Аспержи * След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата ВВСН 49-59			
			150-200 мл/дка	Резене *След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Преди разсаждане			
			150-200 мл/дка	Кориандър *След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			200-300 мл/дка	Ориз (засят на сухо) * След сеитба преди поникване ВВСН 00-05			

			150-200 мл/дка	Царевича * Преди поникване, рано след поникване ВВСН 00-12				
			200-250 мл/дка	Соя * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
			150-200 мл/дка	Фасул, Грах, Бакла * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
			150-200 мл/дка	Картофи *Преди поникване След загърляне ВВСН 00-10				
			150-200 мл/дка	Моркови * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
36.	БИТЪП КОМПАКТ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 71/21.07.2003 г.	82,5 г/л фенмедифам+ 82,5 г/л десмедифам		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>2000	30	3	
			600 мл/дка	Захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите				
			300+300 мл/дка	Захарно цвекло - внася се двукратно: I-во трети-ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото				
37.	БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г.	Второ търговско име на СУЛТАН 500 СК						
38.	БРАСАН 540 ЕК Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение № 01346 – ПРЗ-2/ 07.06.2016г. Валидно до: 31.10.2019 г.	диметахлор – 500 г/л кломазон – 40 г/л	200 мл/дка	Зимна маслодайна рапица: Едногодишни широколистни и някои житни плевели След сеитба, преди поникване на културата ВВСН 00 * На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години	1911	-	втора професионална	

	<p>Заповед №РД 11-1651/06.11.2015 г. ; Заповед №РД 11-932/30.05.2016 г.</p> <p>*Гратисен период - 6 месеца за продажба и още 1 година, считано от 30.05.2016 г. за употреба за ПРЗ БРАСАН 540 ЕК Разрешение № 01346 – ПРЗ-1/ 18.11.2015г.</p>						
39.	<p>БЕФЛЕКС Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01369 – ПРЗ-1/21.01.2016г. Валидно до: 31.07.2019 г.</p>	<p>бефлубутамид – 500 г/л</p>	<p>50 мл./ дка</p>	<p>Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница Ечемик Прилага се във фаза ВВСН 00-13</p>		-	втора професионална
40.	<p>БУГУИС Проплан Планта Протекшън Ко. С.Л., Испания Разрешение № 01451 – ПРЗ*-1/20.09.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-1711/14.09.2016 г.</p>	<p>клодинафоп-пропаргил – 95 г/л клоквинтоцет-мексил (антидот) – 25 г/л</p>	<p>63 мл/дка</p>	<p>Срещу едногодишни житни плевели: Пшеница(мека; твърда)</p>		-	втора професионална
41.	<p>БУЛШЕН 40 СК Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение №01280 – ПРЗ-4/30.01.2017 г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № Заповед № РД 11-</p>	<p>Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК</p>					

	1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11-2505/16.12.2016 г. и Заповед № РД 11-850/24.04.2017 г.						
42.	БУТИЗАН 400 СК БАСФ СЕ -Удостоверение № 01068-2/04.09.2013 г. Валидно до: 03.01.2011 г.*** Заповед № РД 12-3/03.01.2008 г. Заповед № РД 12-26/05.03.2010 г.	400 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели	500 - < 2.000	70	1
			250 мл/дка	Зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите Зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване Рапица - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
43.	БУТИЗАН S БАСФ СЕ -Удостоверение № 01069-2/04.09.2013 г.	500 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:	500 - < 2.000	70	1
			200 мл/дка	Зеле - внася се 8-10 дни след разсаждане Фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
44.	БУТИЗАН МАКС БАСФ СЕ -Удостоверение № 01258–ПРЗ/ 29.07.2014 г. Валидно до: 03.07.2024 г.	200 г/л метазахлор 200 г/л диметенамид-П 100 г/л квинмерак		Едногодишни житни и широколистни плевели при	> 2.000	70	1
			200-250 мл/дка	Маслодайна рапица: приложение: след сеитба, преди поникване на културата - ВВСН 00-06			
			250 мл/дка	Маслодайна рапица: приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14)			
45.	БУКТРИЛ	бромоксинил		срещу широколистни плевели:		-	втора

	УНИВЕРСАЛ Байер КропСайънс АГ, Германия -Удостоверение № 01221 – ПРЗ/28.01.2014г. Валидно до: 31.12.2016 Заповед №РД 11- 86/28.01.2014г.	октаноат /хептаноат- 400,8 г/л (съответстващо на бромксинил- 280 г/л) 2,4 Д етилхексилесте р-422,1 г/л (еквивалентно на 2,4 Д - 280г/л)	100мл/дка	Пшеница, ечемик, овес, ръж: Прилага се във фенофаза на културата ВВСН 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най - малко на 2см над първия възел)			професи онална
			80мл/дка	Царевица, сорго: Прилага се във фенофаза ВВСН 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)			
46.	ВАЛСАГЛИФ Стоктон Кемикул Удостоверение № 153/04.01.2005 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	>2000	30	3
			600 мл/дка	Лозя - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина) *Заб.: прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор			
47.	ВАЛСАМИН Стоктон Кемикул -Удостоверение № 154/04.01.2005 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	1200	-	3
			150 мл/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата			
48.	ВЕЗУВИЙ/ГЛИФО МЕГА/БАЛЕАГЛО ФО/КИЛЛЪР 360 Монсанто Юръп С.А., Белгия Разрешение №01404 – ПРЗ- 2/06.03.2017г. Валидно до: 30.06.2017г. Заповед № РД 11- 684/22.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 292/08.02.2017 г. ВЕЗУВИЙ Разрешение № 01404 – ПРЗ-	глифозат - 360 г/л		Едногодишни и многогодишни, житни и широколистни плевели			втора професи онална
			200 мл/дка	Памук Тютюн *Преди сеитба (разсаждане) на културите - при височина на плевелите 5-10 см			Памук Тютюн -7; Пшеница Ечемик -14; Овощни градини Свободни площи Стърнища Канали – 7; Топола, Орех (над 3 г.) Смърч (над 2 г.) -7; Железо-пътни линии -7; Пасища - 10
			400 мл/дка	Пшеница Ечемик* * Преди жътва			
			400-1000 мл/дка	Овощни градини, Свободни площи Стърнища, Канали * При бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели			
			500 мл/дка	Топола, Орех (над 3 г.) Смърч (над 2 г.) * При бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели			

	1/10.05.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. Заповед №РД 11-684/22.04.2016 г.		1000 мл/дка	Железо-пътни линии * При бутонизация на широколистните и изкласяване/ изметляване на житните плевели			
			1000 мл/дка	Пасища * При пълно развитие на плевела			
49.	ВЕНТУМ ВГ Байер КропСайанс - Германия -Удостоверение № 01023-ПРЗ-1/05.02.2010 г. Валидно до : 10.08.2010 г. Заповед № РД 12-19/10.08.2007 г Заповед №РД 12-56/14.08.2009 г.	300 г/кг форамсулфурон + 10 г/кг йодосулфурон-метил-натрий+ антидот - 300 г/кг		Срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при:	4.300	-	3
			10-15 г/дка+ 200 мл/дка Метро (прилепител)	Царевича – внася се вегетационно във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевичата. Във фаза от котиледони до 6-ти лист на едногодишните широколистни плевели, 3-4 лист на едногодишните житни плевели и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см			
50.	ВИКТУС 4 СК /КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0574/14.10.2008 г. *Считано от 17.07.2015г. ,се определя 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ВИКТУС 4 СК/КЕЛВИН ТОП, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 0574/14.10.2008 и Удостоверение №	43 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при:	>5000	-	3
			125 мл/дка	Царевича - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели			

	0577/02.12.2008 Заповед № РД 11-1243/17.07.2015 г						
51.	ВИКТУС ОД ДюПон ИО САРЛ, Швейцария Разрешение № 0577 – ПРЗ-3/ 14.12.2016. Валидно до: 31.12.2019 г.	Второ търговско име на КЕЛВИН ОД					
52.	ГАЛАКСИЯ СЛ Индустиас Афраса С.А., Испания Разрешение № 01282 – ПРЗ-1 / 30.01.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г.	МЦПА – 180 г/л глифозат – 180 г/л	400-600 мл/дка	Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Ябълки, круши и цитрусови култури: Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято		ябълки, круши и цитрусови култури, маслини - 15 дни	втора професи онална
			400-600 мл/дка	Маслини: Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен			
53.	ГАЛЕРА СУПЕР Дау Агросайансис С.А.С. -Удостоверение № 1246-ПРЗ /27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2017г.	240 г/л – клопиралид + + 80 г/л – пиклорам + 40 г/л аминопиралид	20 мл/дка	Срещу широколистни плевели при: Зимна маслодайна рапица; Пролетна маслодайна рапица; Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата *На една и съща площ да се използва веднъж на 3 години		-	3
54.	ГАЛИГАН 240 ЕК / ОКСИГАН 240 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение № 278-ПРЗ-2/31.07.2012 г.	240 г/л оксифлуорфен	80-100 мл/дка	Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при: Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата	5000	-	3
			150 мл/дка	Лук II-ра год. - внася се трикратно			
				(50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
55.	ГАРДОПРИМ	312,5 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни	>3000	60-	Втора

	ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК Синджента Разрешение № 01001 – ПРЗ-4/16.02.2017г. Валидно до31.07.2019г. Заповед № РД 11-243/03.02.2017 г. *Считано от 03.02.2017г. ,се определя 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК разрешен за пускане на пазара и употреба със Заповед № РД 11-264/13.02.2015 г. -Разрешение № 01001-ПРЗ-3 /19.03.2015г. Валидно до: 08.07.2015г.	S-метолахлор+ 187,5 г/л тербутилазин	350 -400мл/дка	плевели при: Слънчоглед - внася се след сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите Или ВВСН 10-14Котелидоните са напълно разтворени – четири листа (втора двойка листа) на културата, преди поникване на плевелите		царевица за фураж; царевица за зърно не се налага	професионална (2)
			400-450 мл/дка	Царевица – внася се след сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите			
			350-400 мл/дка	Царевица - внася се във фаза ВВСН 10-14-при поява на първи лист – разтваряне на четвърти лист на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните			
56.	ГЛИН 75 ВГ ДюПонт ИО 537-ПРЗ - 2/18.12.2014 г. Валидно до: 09.12.2024 г.	750 г/кг хлорсулфурон		Срещу широколистни в т. ч. слабоуствителни на хормоноподобните хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели при:при:	5545	-	Втора професионална
			1,3-2 г/дка	Пшеница, ечемик и овес момент на приложение: разтворен първи			

				лист- начало на удължаване на стъблото (ВВСН 11-30)				
			1,5-2 г/дка	Пшеница – внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури *Гратисен период за предлагане на пазара и употреба на продукта с етикет изготвен на база Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. на министъра на земеделието и горите – 6 месеца, считано от 09.12.2014 г.				
57.	ГЛИФОГАН 480 СЛ /ГЛИФОГОЛД 480 СЛ Монсанто Юръп -Удостоверение № 01098-3/05.03.2013 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5000	7 дни	2	
			400-1000 мл/дка	Овощни градини Лозя Свободни площи (стърнища)				
			1000 мл/дка 300 мл/дка	Ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели При тютюн за премахване на цв.китка и ограничаване на филизообразуването				
58.	ГЛИФОГОЛД 480 СЛ Монсанто Юръп -Удостоверение № 01098-3/ 05.03.2013 г.	Второ търговско име на ГЛИФОГАН 480 СЛ						
59.	ГЛИФОЗАТ 360 - С Синон Удостоверение № 557/16.04.2009 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: Овощни градини Лозя Свободни площи (стърнища) Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	5600	30	3	
60.	ГЛИФОМЕГА Монсанто Юръп С.А., Белгия Разрешение №01404	Второ търговско име на ВЕЗУВИЙ						

	– ПРЗ- 2/06.03.2017г. Валидно до: 30.06.2017г. Заповед № РД 11- 684/22.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 292/08.02.2017 г.						
61.	ГЛИФОС 36 СЛ Хеминова -Удостоверение № 531/14.01.2007 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Овощни градини Лозя Свободни площи (стърнища)			
			1200 мл/дка	Ж.п.лнии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
62.	ГЛИФОС ДАКАР Хеминова, А/S, Дания Разрешение № 01348 – ПРЗ-1/18.11.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г.	глифозат (амониева сол) 680 гр./кг	370 г/дка 318 г/дка 159 г/дка	Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култури: Многогодишни плевели; Двугодишни плевели Едногодишни плевели * Преди засаждане на културата		зеленчукови култури – 30 дни, лозя, цитрусови култури, семкови овощни култури, орехоплодни, овощни култури с дребни и с месести безкостилков и плодове – 21 дни; костилкови овощни култури – 14 дни; Пшеница, ечемик – 7 дни	непрофе сионална
			424 г/дка 318 г/дка 212 г/дка	Лозя и всички овощни култури, срещу : Многогодишни плевели; Двугодишни плевели Едногодишни плевели * По време на вегетация			
			318 г/дка	Пшеница, ечемик: Поникнали плевели * Не се прилага при хлебна пшеница, малцов и пивоварен ечемик и при семепроизводство			
			370 г/дка 318 г/дка 159 г/дка	Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култури: Многогодишни плевели; Едногодишни и двугодишни широколистни плевели Едногодишни плевели * След прибиране на реколтата			

63.	ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ Хеминова -Удостоверение № 532/14.01.2007 г.	450 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			320-960 мл/дка	Свободни площи (стърнища)			
			960 мл/дка	Ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
64.	ГЛИФОС УЛТРА Хеминова, А/S, Дания Разрешение № 01460-ПРЗ- 1/14.02.2017г. Валидно до: 31.12.2018г. Заповед №11- 160/24.01.2017 г.	глифозат - 360 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална
			0,150-1,2 л/дка	Аспержи * след сеитба преди поникване			
			0,150-1,2 л/дка	Овощни градини, лозя * между растенията * Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.			
			0,150-1,2 л/дка	Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Свободни площи (незасети терени) * Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането.			
			0,150-1,2 л/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години) – -внася се между растенията * Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност..			
		0,150-1,2 л/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Ж.п. линии, Канали		-		
65.	ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис -Удостоверение №	Второ търговско име на ЕФАЗАТ 36 СЛ					

	01051- ПРЗ/24.02.2010 г .						
66.	ГРАНСТАР 75 ДФ /ТРИМЕР 75 ДФ ДюПонт ИО -Разрешение № 01028-ПРЗ-2/ 21.07.2015 г. Валидно до: 24.06.2025 г. *Гратисен период - 6 месеца за продажба и още 1 година, считано от 21.07.2015г. за употреба за ПРЗ Гранстар 75 ДФ/ Тример 75 ДФ, Удосотверение № 1028-ПРЗ- 1/17.02.2010 г.	трибенурон- метил - 750 г/кг		Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5000	30	Непрофе сионална (3)
			1-1,5 г/дка	Пшеница и ечемик – * ВВСН 13- 39-от развитие на 3 лист до начало на поява флагов лист на културите и начални фази на плевели При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол.			
67.	ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ ДюПон Интернешънъл Оперейшънс- Швейцария Разрешение №01142- 2/07.09.2017г. Валидно до: 13.10.2021г. Заповед № РД 11- 1244/13.10.2011 г. Заповед №РД 11- 1675/10.08.2017 г.	250 г/кг трибенурон метил 250 г/кг тифенсулфурон метил		Срещу едногодишни широколистни, в това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида	5000	-	непрофе сионална
			4 г/дка	Пшеница и ечемик - прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите разтворени две листа до флагов лист /12-39 ВВСН/ Максимален брой приложения: 1 Техника на приложение:наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка			
68.	ГЪЛИВЕР 50 ВГ ДюПон ИО САРЛ, Швейцария Разрешение №01398	азимсулфурон 500 г/кг		Житни и широколистни плевели (от семена и от коренища) 1-ви до 4-6-ти лист, Видове просо (Echinochloa spp) 1-ви до 4-ти лист, преди начало на братене		-	втора професи онална

	– ПРЗ-1/ 10.05.2016 г. Валидно до: 31.12.2022 г. Заповед №РД 11- 687/22.04.2016 г.		4 - 5 г/дка	Ориз *ВВСН 12-29 на културата (две листа разтворени-видими са максималния брой брата) *Прилага се с прилепител Тренд 90- 0,1%			
69.	ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-ПРЗ -4/ 03.08.2015 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
70.	ДЕВРИНОЛ 4 Ф Юнайтед Фосфоръс Удостоверение № 69/21.07.2003 г.	450г/л напропамид		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	5000	45	3
			300-350 мл/дка	Фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			300-400 мл/дка	Тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			400 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане Сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране Шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Лавандула - разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
400-500 мл/дка	Зеле - внася се преди разсаждане Домати (безразсадни) Пипер (безразсадни) - Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури						
71.	ДЕРБИ СУПЕР Дау АгроСайънсис -Удостоверение № 01073-3/28.08.2013 г.	150,2 г/кг флорасулам+ 300,5 г/кг аминопиралид- калий		Срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3
			2,5-3,3 г/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида			
72.	ДЕРБИ СУПЕР	флорасулам -150		Срещу широколистни плевели при:		60	втора

	ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТ Дау АгроСайънсис Експорт SAS Разрешение № 01287- ПРЗ -2/28.12.2015г. Валедно до: 18.12.2017 г. Заповед №РД 11- 1846/09.12.2015 г. *Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 09.12.2015 г. на ПРЗ ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО Разрешение № 01287- ПРЗ -1/30.01.2015г	г/кг аминокпиралид - 300 г/кг	2,5-3,3 г/дка	Пшеница (твърда и мека): Прилага се във фаза ВВСН 21 – 32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите			професи онална
			2,5-3,3 г/дка	Ечемик Прилага се във фаза ВВСН 21 – 32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите			
73.	ДИКВА 20 СЛ/ ДИМОР 20 СЛ/ ДИМАЗО 20 СЛ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/ 15.09.2016г Валедно до: 30.06.2018 г. Заповед №РД 11- 211/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 615/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 1567/29.08.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 29.08.2016 г. на ПРЗ	дикват – 200 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		30 дни За картофи - 10 дни	втора професи онална
			330-500 мл/дка	Лозя, овощни градини, цитрусови култури, маслини: * Преди активна вегетация на културата, при активна вегетация на плевелите			
			200-400 мл/дка	Разсдници, зеленчукови култури, аспержи, декоративни растения *30 дни преди засаждане/засяване, при активна вегетация на плевелите			
			250-330 мл/дка	Люцерна * Преди засяване, при активна вегетация на плевелите			
			330-500 мл/дка	Царевича, тревен чим (Бермудска трева (Bermuda grass), Bluegrass, Bentgrass, Ryegrass, Quakgrass, Fescue, Zoysiagrass, St. Augustine grass, Bahiagrass, Centipedegrass, Carpetgrass, Grama grass) * Преди засяване, при активна вегетация на плевелите			
		330-500 мл/дка	Картофи: като десикант *1 месец преди прибиране				

	Разрешение № 01320 – ПРЗ-4/ 28.04.2016г		500 мл/дка	Пасища: Преди създаване на пасища Преди засяване, при активна вегетация на плевелите			
	*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 19.04.2016 г. на ПРЗ Разрешение № 01320 – ПРЗ-3/ 16.02.2016г *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 08.02.2016 г. на ПРЗ Разрешение №01320 – ПРЗ-2/ 19.10.2015г						първа професионална
74.	ДИКОПУР Ф/ ХЕРБОКСОН ТОП Нюфарм -Удостоверение № 0202-ПРЗ-2/19.07.2011 г. Валидно до: 31.12.2011г.	2,4 Д – 600 г/л		Срещу широколистни плевели при: Царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите		-	3
75.	ДИМАЗО 20 СЛ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/ 15.09.2016г Валедно до: 30.06.2018 г. Заповед №РД 11-211/08.02.2016 г. Заповед №РД 11-615/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11-	Второ търговско име на ДИКВА 20 СЛ					

	1567/29.08.2016 г.						
76.	ДИМБО 480 СЛ Гарда Кемикълс Лимитед, Великобритания Разрешение №01529 – ПРЗ - 1/ 07.12.2017 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 2548/29.11.2017 г.	Дикамба 480 г/л	50-75 мл/дка	Срещу Широколистни плевели Царевича –внося се във фаза ВВСН 12-16 (разтворен 2-ри - 6-ти лист) *Брой мин/макс приложения - 1 * Вода л/дка мин/макс - 27,5-30 л/дка	-	-	втора професио нална
77.	ДИМОР 20 СЛ/ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/ 15.09.2016г Валидно до: 30.06.2018 г. Заповед №РД 11- 211/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 615/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 1567/29.08.2016 г.	Второ търговско име на ДИКВА 20 СЛ					
78.	ДИФЛАНИЛ СД Глобахем НВ, Белгия Разрешение № 01421 – ПРЗ -1 / 07.06.2016 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 935/30.05.2016 г.	дифлуфеникан– 500 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	втора професи онална
			25 мл/дка	Пшеница (зимна)			
			37,5 мл/дка	Пшеница (пролетна)			
			25 мл/дка	Ечемик (зимен)			
			25 мл/дка	Ръж (зимна)			
			37,5 мл/дка	Ръж (пролетна)			
79.	ДЕССИКАШ 200 СЛ	200 г/л дикват		Срещу едногодишни и многогодишни житни и шитоклистни плевели и десикант при:		7	1

	Шарда Уърлдуайд Експорт -Удостоверение № 01259-ПРЗ / 11.08.2014г. Валидно до: 01.08.2024 г.		250 мл/дка	Картофи * не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените достигат до 70% от крайното си тегло до кожата се е оформила напълно)			
80.	ДИОВИД 60 СЛ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 170/10.03.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	Царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница - във фаза братене на културата			
81.	ДИФЕНДЪР СЛ /ПАСИФИК СЛ /МАГНЕТО СЛ Ню Фарм -Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до:26.04.2015г.	360 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба		Срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1276	30	3
			80-100 мл/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата			
			120 мл/дка	Царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
82.	ДОМИНАТОР 360 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0214-2/29.11.2012 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Овощни градини, лозя			
			1200 мл/дка	Ж.п.линии			
83.	ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ Дау АгроСайансис СА, Франция -Удостоверение № 01218 – ПРЗ / 29.01.2014 г. Валидно до: 29.01.2024 г.	480 г/л – глифозат (като диметиламоние ва сол - 608 г/л)	300мл/дка	На стърнища Срещу едногодишни житни и широколистни плевели		-	2
			900мл/дка	На стърнища Срещу многогодишни житни и широколистни плевели			
84.	ДОМИНАТОР УЛТРА Дау Агросайънсис -Удостоверение №	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			300 мл/дка с 20-30 л/дка	Лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане			

	356/20.04.2006 г.		раб.р-р				
85.	ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК /ТЕНДЪР ЕК Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г.	960 г/л S-метолахлор		Срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:	2149	-	3
			120 мл/дка	Домати (разсадни и безразсадни) Пипер (разсадни и безразсадни) Моркови Лук I, II, III година			
			150 мл/дка	Царевича Слънчоглед Соля Захарно цвекло Тютюн Памук Картофи Фасул Люцерна Сорго Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди засаждане на културите Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви Семената на соргото, предварително се третира с антидот Concer III			
86.	ЕВОЛИЯ Синджента Разрешение №01484 – ПРЗ1/27.06.2017г. Валидно до:31.07.2018г. Заповед № РД 11- 1197/07.06.2017 г.	мезотрион 500 г/кг	15 г/продукт/дка	Едногодишни широколистни плевели Сладка царевича *Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист-разтворен девети лист)	>5000	-	втора професи онална
			30г/продукт/дка	Едногодишни широколистни и житни плевели Царевича за фураж, зърно и семенепроизводство *Прилага се във фаза ВВСН 00-19 (след сеитба, преди поникване-разтворен девети лист)			
87.	ЕКИП ОД Байер КропСайанс -Удостоверение № 01087-ПРЗ-2/ 29.07.2014г.	22,5 г/л форамсулфурон + изоксадифен- етил (антидот) – 22,5 г/л		Срещу кокошо просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде и Балур (<i>Sorghum helepense</i>) при:	>5000	-	непрофе сионална

	Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед РД 12- 24/30.04.2009 г. Заповед №РД 11- 1050/03.07.2014г.		200-250 мл/дка	Царевича - Внася се във фаза разтваряне на 3-ти лист до фаза разтваряне на 6-ти лист на културата			
88.	ЕКИП СК Байер КропСайанс -Удостоверение № 39/05.01.2003 г. Заповед №РД09- 790/28.12.2002 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 11.08.215 -Краен срок за употреба на наличните количества: 11.02.2016	22,5 г/л форамсулфурон + 22,5 г/л антидот	200-250 мл	Срещу едногодишни житни и широко-листни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при: Царевича - внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура	>5000	-	3
89.	ЕКЛИПС 70 ВДГ АДАМА АГАН Лтд Разрешение № 01095- ПРЗ-3/ 25.07.2016 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 770/10.05.2016 г. и Заповед №РД 11- 1234/07.07.2016 г.	700 г/кг метрибузин	25-40 г/дка 25-30 г/дка	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели: Картофи: - ВВСН 00-09 Преди поникване - След ВВСН 10 След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени) След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена)	2000	домати -30; моркови – 60; люцерна – 60; соя, картофи, мека пшеница, твърда пшеница, Ечемик - не се изисква	втора професи онална
			25-30 г/дка 25-40 г/дка	Домати: - Преди поникване (ВВСН 00-09) - След пълно разваряне на котиледоните (След ВВСН 10)			
			25-35 г/дка	Моркови: - След разтворен четвърти същински листсъщински (След ВВСН 14)			
			25-35 г/дка	Соя: - след сеитба ,преди поникване			
			50-75 г/дка	Люцерна: - Есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой			
			100 г/дка	Мека пшеница, Твърда пшеница Ечемик: Разтворени две листа-край на братенето			

				(ВВСН 12-29)			
	*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 08.02.2016 г. на ПРЗ ЕКЛИПС 70 ВДГ Файнкеми Швебда -Удостоверение № 1095/ 11.05.2012 г.			Срещу едногодишни широколистни плевели при:		50 – картофи, 30 – домати, 60-люцерна (стара)	3
			50 г/дка	Домати (безразсадни) - внася се в 1-ва цветна китка на културата			
			60 г/дка	Картофи - внася се при височина 5-10 см на културата Домати (разсадни) - внася се в 1-ва цветна китка на културата			
			70 г/дка	Домати (разсадни) - внася се преди разсаждане на културата Картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			75 г/дка	Люцерна (стара) фаза на приложение преди вегетация на люцерната			
90.	ЕКОПАРТ ТУРБО Ничино Юръп Ко Лтд Разрешение № 01387 – ПРЗ – 1 / 25.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. Заповед № РД 11-398/16.03.2016 г. *Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване на продукта	пирафлуфен-етил 26,5 г/л	80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лозя: внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни	Лозя ,Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула, Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива – 30; Череша – 7; Лешник -20; Картофи -3; Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки -	втора професионална	
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си			

				азмер (ВВСН 51-75) *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Череша: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер			
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лешник: - Широколистни плевели, Коренови издънки - В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			
			80 мл/дка	Картофи: - Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза *Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни			
			25-30 мл/дка	Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки Широколистни плевели, Коренови издънки *Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни			
91.	ЕКСПРЕС 50 СГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0508/15.06.2007 г.	500 г/кг трибенурон-метил		Срещу широколистни плевели при:	5000	30	3
			4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	Слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите			
92.	ЕЛЕКТРОН 500 СК	квинмерак 125		Срещу едногодишни житни и широколистни		-	първа

	Адама Аган ООД, Израел -Удостоверение № 01300–ПРЗ-1/ 19.03.2105 г. Валидно до: 31.07.2020 г..	г/л метазахлор 375 г/л	200 мл/дка	плевели Маслодайна рапица: * След сеитба преди поникване или вегетационно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (ВВСН 12-14)			професионална
93.	ЕЛУМИС ОД Удостоверение №1151-ПРЗ- 2/25.10.2013 г. Валидно до: 03.05.2022г.	75 г/л мезотрион + 30 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища:	2000	-	Непрофесионална
			130 – 200 мл/дка 100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка	Царевича: Еднократно Двукратно			
94.	ЕРГОН ВГ Ротам Агрокемикал -Удостоверение № 01163/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	68 г/кг метсулфурон- метил + 682 г/кг тифенсулфурон- метил		Срещу двусемеделни плевели (едногодишни широколистни плевели)	5000	-	3
			5-9 г/дка	Пшеница, тритикале и ръж			
			5-6 г/дка	Зимен ечемик			
			6 г/дка	Пролетен ечемик			
				Момент на приложение: есенно или пролетно третиране; ВВСН 13-39 (трети лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до шести лист на плевелите)			
95.	ЕСТЕРОН 600 ЕК Дау АгроСайънсис Юръп - Разрешение № 01385–ПРЗ- 1/25.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. Заповед № РД 11- 397/16.03.2016 г.	2,4 Д - 600 г/л		Едногодишни широколистни плевели, паламида и поветица:		Пшеница, Ечемик - 60; Царевича – не се изисква	втора професионална
			50-100 мл/дка	Пшеница, Ечемик: * ВВСН 21-30(начало на братене-начало на удължаване на стъблото)ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите)			
			50-100 мл/дка	Царевича: * ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16(Фаза 4-6 лист на плевелите) * Не се прилага при сладка царевича и при семепроизводство на царевича			

96.	ЕФАЗАТ 36 СЛ /ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис -Удостоверение № 01051- ПР3/24.02.2010 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Лозя – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
97.	ЗЕНКОР 70 ВГ Байер КропСайанс Германия Удостоверение № 564/29.09.2009 г. Заповеди №: РД 12- 61/29.12.2006 г. Валиден до: Считано от 01.12.2017 г се определяя гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЗЕНКОР 70 ВГ	700 г/кг метрибузин		Срещу едногодишни широколистни плевели:	1.449	30	3
			50 г/дка	Домати (безразсадни) – внася се във фаза 1 цветна китка на културата			
			60-70 г/дка	Домати (разсадни) – внася се във фаза 1 цветна китка на културата Картофи – внася се при височина 5-10 см на културата			
			70 г/дка	Домати (разсадни) – внася се преди засаждане			
			70-80 г/дка	Картофи – внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			100 г/дка	Люцерна (стара) – внася се преди вегетацията на културата			
98.	ЗЕНКОР 600 СК Байер КропСайънс, Франция -Удостоверение №01253– ПР3/21.01.2016 г. Валидно до: 31.07.2019г. Заповед №РД 11- 11/07.01.2016 г.	600 г/л метрибузин		Едногодишни широколистни плевели и житни плевели при:			втора професионална (2)
			90 мл/дка	Картофи: внася се след засаждане, преди поникване на културата;			
			60 мл/дка	внесен след поникване (вегетационно);			
		90 мл/дка	Аспержи: внесен (преди поникване) или след прибиране на реколтата, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза			аспержи – 7;	

	*Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 09.12.2015 г. на ПРЗ ЗЕНКОР 600 СК -Удостоверение №01253-ПРЗ/ 29.07.2014г.		35 мл/дка	Моркови: внесен след поникване, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза		моркови – 42	
			60 мл/дка	Моркови: внесен във фаза ВВСН 12 (Разтворен втори същински лист)		моркови - 60	
			76 мл/дка	Моркови за семепроизводство Преди поникване		не се изисква	
			90 мл/дка	Люцерна за семепроизводство Преди поникване		не се изисква	
			46 мл/дка	Домати - еднократно приложение във фаза: - ВВСН 00-07 (След сеитба до преди поникване), или - ВВСН 12-14 (Втори същински лист – четвърти същински лист), след направата на лехи и тирове, или - ВВСН 13-14 (Трети-четвърти същински лист), 20 дни след разсаждане и при добро вкореняване.		30	
			75-90 мл/дка	Картофи: еднократно приложение във фаза ВВСН 00-08 (След сеитба до 3-4 дни преди поникване: стъблата нарастват към почвената повърхност);		60	
			45-60 мл/дка	еднократно приложение във фаза ВВСН 09-15 (Поникване: стъблата излизат над почвената повърхност – разтваряне на пет листа на главното стъбло и височина на растенията 5-10 см);			
60 + 30 мл/дка	двукратно приложение - Преди поникване + При височина на растенията 5-10 см	60					
35 мл/дка	Соя: Внася се във фаза ВВСН 00-08(След сеитба- преди поникване)						
99.	ИГЪЛ 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 537-ПРЗ - 2/18.12.2014 г.	750 г/кг хлорсулфурон		Срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели при:	5545	-	Втора професионална
			1,3-2 г/дка	Пшеница, ечемик и овес			

	Валидно до: 09.12.2024 г.			момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (ВВСН 11-30)				
			1,5-2 г/дка	Пшеница – внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури *Гратисен период за предлагане на пазара и употреба на продукта с етикет изготвен на база Заповед № РД 09-457/10.07.2007 г. на министъра на земеделието и горите – 6 месеца, считано от 09.12.2014 г.				
100.	ИЗОР 500 СК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 349/01.12.2005 г. Срок за продажба:15.03.2017г . Срок за съхранение и употреба :15.09.2017 г. *Гратисен период 6 месеца за продажба и още 6 месеца за съхранение и употреба, считано от 15.09.2016 г. на ПРЗ ИЗОР 500 СК -Удостоверение № 349/01.12.2005 г. Заповед №РД 11-759/15.09.2016 г.	500 г/л изопротурон		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	3600	45	3	
			350 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културите				
			400-500 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се след сеитба, преди поникване на културите				
101.	ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600-3/04.05.2012 г.	Второ търговско име на СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ						

102.	КАБАДЕКС ЕКСТРА Дау АгроСайънсис LLC, САЩ Разрешение № 01495/30.08.2017 г. Заповед №РД 11 – 1710/16.08.2017 г. Валидно до: 31.07.2018 г.	мезотрион – 267 г/л флорасулам – 16.7 г/л	45 мл/дка	Широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж): внася се във фаза ССПП ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване (колеоптилът пробива земната повърхност))			втора професионална
			30 мл/дка	Широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж): внася се вегетационно третиране в ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист – разтваряне на шести лист) *Да се прилага в резервоарна смес с адювант – Дасоил 26-2N с доза 50 мл/дка за по-добра ефикасност			
103.	КАЛАМ БАСФ СЕ -Разрешение № 0588 –ПРЗ - 2/21.01.2016 г. Валидно до: 30.11.2019 г. Заповед №РД 11- 09/07.01.2016 г.	125 г/кг тритосулфурон + 600 г/кг дикамба		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели: Царевича- внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист)	5000 2000 калам 2200 деш	-	втора професионална
			20 г-40 г/дка +100 мл/дка ДЕШ	Срещу широколистни плевели при: Царевича – внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на развитие на плевелите, като най-високата се препоръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан шир и черно куче грозде		-	
	*Гратисен период 6 месеца за продажба и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 07.01.2016 г. на ПРЗ КАЛАМ+ДЕШ -Удостоверение № 0588/27.03.2009 г.		20 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант) 30 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант) +100 мл/дка ДЕШ (аджувант)				3
104.	КАЛИН ФЛО Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 347-2/18.11.2013 г. *Гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение до 07.12.2017 г.и срок за	425 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при: внася се след сеитба, преди поникване на културите		60	2
			150-200 мл/дка	Моркови Корнандър			
			200-250 мл/дка	Картофи			
			250-300 мл/дка	Слънчоглед			

	съхранение и употреба на съществващи наличности до 03.06.2018 г. Заповед №РД 11-1194/07.06.2017 г.						
105.	КАЛИФ 480 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение №01185-ПРЗ /22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	480 г/л кломазон		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:	-	-	2
			20 мл/дка (200 мл/ха)	Маслодайна рапица			
106.	КАЛИФ МЕГА ЗК Аган Кемикъл Манюфакчърърс -Удостоверение №01248-ПРЗ/27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2024г.	33 г/л – кломазон 250 г/л – метазахлор		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:		-	1
			250 мл/дка	Маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
			300 мл/дка;	Маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
107.	КАЛИСТО 480 СК Синджента -Удостоверение № 01053-ПРЗ-1/ 02.03.2010 г.	480 г/л мезотрион		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	-	Непрофесионална
			20 мл/дка+ Атплюс (прилепител)-0,5 %	Царевича – внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите			
			30-40 мл/дка	Царевича – внася се след сеитба, преди поникване на културата			
108.	КАЛИСТО ПЛЮС Синджента Кроп Протектшън АГ Разрешение №01487 – ПРЗ-1/27.06.2017г. Валидно до:31.07.2018г. Заповед № РД 11-1201/07.06.2017 г.	мезотрион – 50 г/л дикамба – 120г/л	200 мл продукт/дка	Едногодиш ни и многого дишни широколистни плевели Царевича: прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист)	>2000	-	втора професионална

109.	КАМБИО СЛ БАСФ СЕ -Удостоверение № 240/25.02.2005 г. Валидно до: 28.12.2012 г. Заповед №РД 09- 790/28.12.2002 г.	320 г/л бентазон+ 90 г/л дикамба		Срещу широколистни плевели при:	2219	-	3
			125 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
			200 мл/дка	Царевица – внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите			
110.	КАМИКС 560 СЕ Синджента Удостоверение № 01155-ПРЗ- 1/01.08.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	60 г/л мезотрион + 500 г/л S- метолахлор		Срещу едногодишни житни плевели и едногодишни широколистни плевели;	2000	-	Втора професионална
			200 и 250 мл/дка	Царевица			
111.	КАОС Сапек Агро С.А. Разрешение №01470 – ПРЗ- 1/16.02.2017г. Валидно до:30.06.2018г. Заповед № РД 11- 238/03.02.2017 г.	бентазон 480 г/л	250 - 300 мл/дка	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели Царевица *Прилага се във фаза ВВСН 15-16 /Разтворен пети – шести лист/		-	втора професионална
			300 - 400 мл/дка	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели и плевели от род <i>Сурепaceous</i> Ориз *Прилага се във фаза ВВСН 13-34/ 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлията или фаза на съединяване; междувъзлията започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм		-	
112.	КАПРЕНО СК Байер С.А.С., Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 01341 – ПРЗ- 2/10.05.2016г. Валидно до: 30.04.2025 г. Заповед №РД 11- 1681/10.11.2015 г. и	темботрион – 345 г/л тиенкарбазон- метил – 68 г/л изоксадифен- етил (антидот) – 134 г/л		Едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели при		-	втора професионална
			22-29 мл/дка	Царевица: От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата ВВСН 12-16 Фаза на развитие на плевелите: втори-шести лист на широколистните и втори-четвърти лист на едногодишните житни плевели * Прилага се с прилепител Метро 200 мл/дка			

	Заповед №РД 11-678/22.04.2016 г.						
	*Гратисен период - 6 месеца за продажба и още 1 година, считано от 22.04.2016 г. за употреба за ПРЗ с Разрешение № 01341 – ПРЗ-1/18.11.2015г.						първа професионална
113.	КАСПЪР 55 ВГ Синджента Удостоверение № 01089-ПРЗ-2/ 02.11.2010 г. Валидно до: 26.04.2020 г.	50 г/кг просулфурон+ 500 г/кг дикамба	30 г/дка	Царевича за зърно и силаж – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см на поветицата (до цъфтеж)	2000	- 14 -царевича за силаж	Непрофесионална
114.	КЕЛВИН ОД/ВИКТУС ОД ДюПон ИО САРЛ, Швейцария Разрешение № 0577 – ПРЗ-3/ 14.12.2016. Валидно до: 31.12.2019 г.	никосулфурон – 40 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели, в т.ч. балур от коренища Царевича: от 2ри до 8ми лист на културата (ВВСН 12-18) *дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване *Да не се прилага при сладка царевича		-	непрофесионална
115.	КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0577/14.10.2008 г.	Второ търговско име на ВИКТУС 4 СК *Считано от 17.07.2015г. ,се определя 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ВИКТУС 4 СК/КЕЛВИН ТОП, разрешен за пускане на пазара и употреба с Удостоверение № 0574/14.10.2008 и Удостоверение № 0577/02.12.2008 - Заповед № РД 11-1243/17.07.2015 г.					
116.	КИЛЪР 360 Монсанто Юръп С.А., Белгия Разрешение №01404 – ПРЗ-2/06.03.2017г.	Второ търговско име на ВЕЗУВИЙ					

	Валидно до: 30.06.2017г. Заповед № РД 11-684/22.04.2016 г. и Заповед №РД 11-292/08.02.2017 г.						
117.	КИДЕКА Нюфарм САС, Франция Разрешение №01509 – ПРЗ-1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед № РД 11-2129/19.10.2017 г.	мезотрион - 100 г/л	75 – 150 мл продукт /дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Царевница Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) * Брой мин/макс - 1 *Вода л/дка мин/макс - 15 – 50 л/дка	-	-	втора професионална
118.	КЛЕРАВО БАСФ Агрокемикъл Продуктс Б.В., Пуерто Рико. Разрешение №01485 – ПРЗ-1/27.06.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД 11-1199/07.06.2017 г.	имазамокс 35 г/л квинмерак 250 г/л	0,1л/дка	Едногодишни широколистни и житни плевели Зимна маслодайна рапица Клиърфийлд толерантни хибриди *Прилага се във фаза ВВСН 10-18(напълно оформени котиледони-разтворен 8 лист) * Да не се прилага повече от един път на три години.	> 2.000	-	втора професионална
119.	КЛЕРАНДА + ДЕШ БАСФ СЕ-Германия -Удостоверение №01130-ПРЗ 5/20.03.2014г. Валидно до: 27.07.2021 г. Използва се самостоятелно или в комбинация с адюванта Деш.	375 г/л 375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури при:	2000 Кле-ранда 2200 Деш	-	1
			150 мл/дка – 200 мл/дка	Зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд хибриди) – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.			

120.	КЛИК ДУО Оксон Италия СпА Разрешение № 01518 – ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2124/19.10.2017 г.	тербутилазин - 125 г/л пендиметалин – 250 г/л	400 мл/продукт / дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Царевича – внася се след сеитба преди поникване на културата ВВСН 01-03 – начало на набъбването - край на набъбването на семето *Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка	-	-	Втора професионална
121.	КЛИНИК 36 СЛ /КРЕДИТ 36 СЛ Нюфарм С.А.С. Франция Разрешение № 01208 – ПРЗ -2/.04.07.2016 г. Валидно до: 29.01.2024г Заповед №РД 11-104/29.01.2014 г. и Заповед №РД 11-1051/14.06.2016 г. *Гратисен период - 6 месеца за продажба и още 1 година, считано от 14.06.2016 г. за употреба за ПРЗ с Удостоверение № 01208 – ПРЗ/ 9.01.2014 г.	360 г/л глифозат	400мл/дка	Ябълки и лозя: Срещу едногодишни житни плевели		ябълки, лозя - 21 дни; заплевяване в обработваемите площи– 30 дни; пшеница и ечемик -7 дни	непрофесионална (3)
			600мл/дка	Срещу широколистни плевели			
			800мл/дка	Срещу многогодишни плевели (насочено с протрктор)			
			300мл/дка	Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта:			
				Срещу едногодишни житни плевели			
			600 мл/дка	Широколистни плевели			
			700 мл/дка	Многогодишни плевели			
			600 мл/дка	Пшеница (без хлебна и за производство на семена) - преди жътва Едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели			
Ечемик (без пивоварен и за производство на семена) - преди жътва Едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели							
122.	КЛИО БАСФ СЕ, -Удостоверение № 01274–ПРЗ -1/18.12.2014 г. Валидно до: 09.12.2017г. Заповед №РД 11-1964/09.12.2014г.	топрамезон – 336 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		не се изисква	Първа професионална
			15 мл/дка	Царевича момент на приложение: втори - пети лист на културата (ВВСН 11-15) *може да се използва и в комбинация с адюванта Деш в доза 100 мл/дка			
123.	КЛИОФАР 600 СЛ Ариста ЛайфСайънс Бенелюкс Спрл,	клопиралид – 600 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели и паламида		Захарно и крѐмно цвекло-42	непрофесионална
			17 мл/дка	Пшеница, ечемик, овес, ръж :внася се във			

	Белгия Разрешение №01441 – ПРЗ* - 1/ 15.09.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11- 1561/29.08.2016 г.			фаза ВВСН 21-39 начало на братене: видим първи брат – флаговия лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима(през пролетта)		Царевича за зърно – 90; Маслодайна рапица – 56; останалите – не се изисква	
			25 мл/дка	Захарно и кръмно цвекло: внося се във фаза ВВСН 11-33:видима първа двойка листа, все още неразтворени – листата покриват 30% от повърхността			
			25 мл/дка	Зеле, карфиол: внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени			
			17 мл/дка	Царевича за зърно: внася се във фаза ВВСН 13-16 разтваряне на трети лист – растежа продължава до шести лист			
			25 мл/дка	Маслодайна рапица: внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори лист – 9 или повече листа оформени			
			25 г/дка	Лук: внася се във фаза ВВСН 11-14Котиледона като „кукичка” е със зелен цвят – растежа продължава до четвърти лист			
			25 мл/дка	Ряпа: внася се във фаза ВВСН 12-19 Разтворен същински лист – 9 или повече същински листа разтворени			
124.	КОЛАЖ 64 ОД ДюПон И О С.а.р.л, Швейцария Разрешение №01351 – ПРЗ-1/ 28.12.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г.	тифенсулфурон -метил - 4 г/л никосулфурон - 60 г/л	75 - 100 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни плевелии някои широколистни плевели: Царевича (за зърно и за силаж) * Да не се прилага при сладка царевича. При пропадане на културата може да се засява само царевича след 30 дни		-	втора професионална
125.	КОЛЗОР ТРИО ЕК Синдженга Съплай АГ, Швейцария Разрешение № 01380 – ПРЗ-3/01.11.2017 г. Валидно до: 31.10.2019 г.	диметахлор 187,5 г/л + напропамид 187,5 г/л + кломазон 30 г/л	400 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели: Рапица – внася се във фаза ВВСН 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност) * да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметахлор,	>2000	-	втора професионална

	Заповед №РД 11-299/01.03.2016 г. Заповед №РД 11-938/30.05.2016 г. Заповед №РД 11-2133/19.10.2017 г.			кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.			
126.	КОРУМ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01305 – ПРЗ-2/14.02.2017г. Валидно до: 31.12.2018г. Заповед № РД 11-416/10.03.2015 г. и Заповед №РД 11-170/24.01.2017 г. Разрешение № 01305 – ПРЗ-1/08.04.2015 Валидно до: 31.12.2016 г.	бентазон – 480 г/л имазамокс – 22,4 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:	>300 - <2000	фасул, грах – 35; соя – 60; Люцерна - 40	Непрофесионална
			125 мл/дка	Фасул (обикновен и градински): Еднократно приложение (ВВСН 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда)) Двукратно приложение ВВСН 12-25 (непосредствено преди 2 развити листа – 5-то странично разклонение се вижда) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (ДАСН НС) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			62,5+62,5 мл/дка	Обикновен и фуражен грах (зимни и пролетни форми) Еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)) Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (ДАСН НС) в концентрация 0,25 – 0,3%			
190 мл/дка	Соя: Еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см)) Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (ДАСН НС) в концентрация						
			95 + 95 мл/дка				

				0,25 – 0,3%			
			125 мл/дка	Люцерна - стара: Еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))			
			62,5+62,5 мл/дка	Двукратно приложение (Първо третиране – непосредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
127.	КОРЕЛО ДУО Дау Агросайансис Експорт С.А.С -Удостоверение № 01251–ПРЗ / 29.07.2014 г. Валидно до: 30.04.2025г	14,2г/кг флорасулам 70,8г/кг пироксулам 70.8 г/кг Клоквинтоцет мексил - антидот		Широколистни и житни плевели при:		-	2
			26,5 г/дка	Пшеница (мека и твърда)			
128.	КОРИДА 75 ВДГ /ПИТОН 75 ВДГ Зенит Кроп сайансис България ЕООД -Разрешение № 01078-4/ 20.09.2016 г. Валидно до: 13.10.2021 г. Заповед №РД 11- 1705/14.09.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 06.11.2015г. на ПРЗ с -Удостоверение № 01078-3/21.10.2016 г. ГАТ Макроенкапсю- лейшън АГ	750 г/кг трибенурон- метил		Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:	2000	-	непрофесионална (3)
			1,5 г/дка	Пшеница – внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата(13-29 ВВСН) и фази на плевелите 2-4 лист Максимален брой приложения: 1 Техника на приложение: наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка			
129.	КОСМИК	360 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни	5600	30	3

	Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 323/09.01.2006 г.	глифозат		и широколистни плевели при:			
			400-1200 мл/дка	Лозя Овощни градини			
			1200 мл/дка	Ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
130.	КРЕДИТ 36 СЛ Нюфарм С.А.С. Франция Разрешение № 01208 – ПРЗ -2/04.07.2016 г. Валидно до: 29.01.2024г Заповед №РД 11- 104/29.01.2014 г. и Заповед №РД 11- 1051/14.06.2016 г	Второ търговско име на КЛИНИК 36 СЛ					
131.	КРЮ 4 СК НюФарм САС -Разрешение № 01055-ПРЗ- 3/04.07.2016г. Заповед №РД 11- 1049/14.06.2016 г.	Второ търговско име на СИРИО 4 СК					
132.	ЛАНСЕЛОТ Дау АгроСайънсис Експорт SAS Разрешение № 01287- ПРЗ -2/28.12.2015г. Валедно до: 18.12.2017 г. Заповед №РД 11- 1846/09.12.2015 г.	Второ търговско име на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО					
133.	ЛАРЕН 20 СГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 570/14.10.2008 г.	200 г/кг метсулфурон- метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. Лепка при:	>5000	-	3
			3 г/дка	Пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите			
134.	ЛАУДИС ОД	44 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни и	>=	100	3

	Байер КропСайанс -Удостоверение № 0581-ПРЗ - 1/31.07.2012 г. Валидно до: 09.01.2012 г. Заповед №РД 12- 1/09.01.2009 г	темботрион+ 22 г/л изоксадифен- етил (антидот)		широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при: Царевича – внася се във фаза 2-8 лист на културата (ВВСН 12-18); от котиледони до 6- ти лист на едногодишните житни и широколистни плевели и при височина на балура и семе от коренища 15-25 см Максимален брой приложения: 2 Интервал между третиранията: 14 дни Количество на работния разтвор: 200 – 400 л/ха	5.000		
135.	ЛАУДИС ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение №01177- 1/05.03.2013 г. Валидно до:31.05.2014 г Заповед №РД 11- 177/18.02.2013 г	200 г/кг темботрион+ 100 г/л изоксадифен- етил (антидот)		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища: Царевича (за зърно, силаж и фураж) и сладка царевича): внася се от фаза 2-ри до 8-ти лист на царевичата, от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2- ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, и при височина на балура от семе и коренища 15-25 см	5000	100- за зърно; 80 – за силаж и фураж; 47 – сладка царевича	2
136.	ЛЕГАТО ПЛЮС 600 СК Аган Кемикъл Манюфакчърърс -Удостоверение № 01204 – ПРЗ / 29.01.2014г. Валидно до: 29.01.2024 г.	100 г/л дифлуфеникан 500 г/л изопротурон		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели Пшеница и ечемик		-	1
137.	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън – Белгия -Удостоверение № 01141-1/21.10.2011г. Валидно до: 13.10.2021г.	450 г/кг пиридат		Срещу едногодишни широколистни и плевели: Зеленчуци от род <i>Brassica</i> , вид <i>Brassica oleraceae</i> (главесто зеле (бяло, червено, савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле карфиол, броколи) – прилага се еднократно през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (4-6-ти лист на културата), в доза 2 кг/ха	2230	42 дни – <i>Brassica</i> ; 28 дни праз	2

				Праз лук-прилага се еднократно през пролетта, след засаждане, когато трети лист е ясно видим (>3 см), в доза 2 кг /ха Максимален брой приложение: 1 Количество на работния разтвор: 15-40 л/дка при зеленчуци от род Brassica; 15-40 л/дка при праз.			
138.	ЛЕОПАРД 5 ЕК/ /НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г.	50 г/л квизалафоп-П- етил		Срещу едногодишни житни плевели при:	1210	90 дни за рапица; 60 дни за всички останали култури	3
			150 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Тютюн Соя Домати Картофи			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			200 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Тютюн Домати Картофи Соя Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
			120 мл/дка	Срещу самосевки от житни култури при: -зимна маслодайна рапица			
139.	ЛИНТУР 70 ВГ Синджента -Удостоверение № 01010-ПРЗ- 1/06.10.2009 г	4,1 % триасулфурон+ 65,9 % дикамба		Срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	>2000	-	3
			15 г/дка	Пшеница и ечемик – внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите			
140.	ЛИНУРЕКС 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 142/22.12.2004 г.	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			200 мл/дка	Кориандър			
			300 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите			
141.	ЛИНУРЕКС 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение №	500 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			150-200 мл/дка	Кориандър			

	174/10.03.2004 г.		200-250 мл/дка	Картофи				
			250-300 мл/дка	Слънчоглед Соя Внася се след сеитба, преди поникване на културите				
142.	ЛИНУРОН 45 СК И Пи Чи -Удостоверение № 161/06.01.2005 г.	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	90	2	
			200 мл/дка	Кориандър				
			250-300 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите				
143.	ЛИСТЕГО 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Заповед №РД 11-607/19.04.2016 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40						
144.	ЛОГОС 4 СК Сапек Агро -Удостоверение № 01097-ПРЗ/ 16.06.2010 г.	40 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища и при:	5000	-	3	
			125 мл/дка	Царевица – внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата				
145.	ЛОГРАН 20 ВГ Синджента Кроп Протекшън АГ Удостоверение №01252–ПРЗ-1/29.07.2014г. Валидно до: 31.12.2016 г.	200 г/кг триасулфурон		Срещу широколистни плевели при:	>2000		3	
			3,75 г/дка	Пшеница (мека и твърда) Ечемик *Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели				
146.	ЛОНТРЕЛ 72 СГ Дау АгроСайансис -Удостоверение № 01235–ПРЗ/ / 17.04.2014 г. Валидно до: 30.04.2018г	клопиралид - 720 г/кг		Срещу широколистни плевели при:		Не се изисква	3	
			17-21 г/дка	Маслодайна рапица, лук, чесън, дребен лук Шалот				
			17-21 г/дка	Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле				
			11-14 г/дка	Царевица (за зърно и фураж), пшеница, ечемик, овес и ръж				
			11-21 г/дка	Захарно и фуражно цвекло				
147.	ЛОНТРЕЛ 300 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение №	300 г/л клопиралид		Срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:	4300	-	3	
			30-40 мл/дка	Ягоди - внася се след беритба на плодовете				

	0245-4/05.03.2013 г.		30-50 мл/дка	Цвекло Лен Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите			
			40-50 мл/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата Лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата			
			35-40 мл/дка 35-40 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Пролетна маслодайна рапица			
148.	ЛУМАКС 312 Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение № 01514- ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2127/19.10.2017 г.	s-метолахлор 312.5 г/л тербутилазин 187.5 г/л мезотрион 37,5 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	-	-	втора професи онална
			300 -400 мл/продукт/ дка	Царевича Внася се във фаза ВВСН 00-14 (след сеитба- разтворен 4-ти лист) *Вода л/дка Мин/макс - 30-40 л/дка * Брой мин/макс приложения *Да не се прилага върху сладка царевича			
149.	МАГНЕТО СЛ Ню Фарм Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до:26.04.2015г.	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ					
150.	МАЙСТЕР ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 351/22.03.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 21.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 21.09..2016 г.	30 г/л форам- сулфурон+ 1 г/л йодосулфурон+ 30 г/л изоксадифен- етил (антидот)		Срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели, вкл. Балур от семе и коренища при:	>5000	-	3
			120; 150 мл/дка	Царевича – внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на балура Забележка: по-високата доза се използва при преобладаващо запле-веляване с балур			
151.	МАТОН 600 ЕК НюФарм -Удостоверение №	600 г/л 2,4 Д естер		Срещу широколистни плевели при:	375		3
			110 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			

	0546/30.01.2009 г.		120-150 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
152.	МЕЗМЕР 48 СК Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01378 – ПРЗ-1/ 15.02.2016г. Валидно до: 31.07.2017 г. Заповед №РД 11- 182/03.02.2016 г.			Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вкл. кокоше и кръвно просо (<i>Echinochloa crus-galii</i> и <i>Digitaria sanguinalis</i>)		-	втора професионална
			20-30 мл/дка	Царевича за зърно и силаж * Не се прилага при сладка царевича и при семепроизводство на царевича * Да не се прилага чрез въздушно пръскане.			
153.	МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК Байер АГ, Германия Разрешение № 01127 – ПРЗ-2/20.12.2017 г. Валидно до: 09.05.2021г. Заповед № РД 11 – 365/09.05.2011 г Заповед №РД 11-2622/01.12.2017 г.	240 г/л изоксафлутол	42 мл/дка	Царевича за зърно и силаж – прилага се след сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата, Срещу едногодишни житни и широколистни плевели.	>5000	-	2
154.	МЕТСУРАМ 200 ВГ /РИКОРСО Рогам Агрокемикъл -Удостоверение №01076-ПРЗ/ 16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон-метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист			
155.	МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД /САМСОН ЕКСТРА 6 ОД /ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД /НИШИН ЕКСТРА 6 ОД / ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД/ ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение №	60 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, включително балур от семена и коренища и някои широколистни плевели при:	>5000	-	2
			65-75 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Царевича – внася се във фаза 1-8 лист на културата, 2-4 лист на плевелите или височина на балура 15-25 см. Максимален брой приложения: 1			

	01101-ПРЗ -4/ 03.08.2015 г. Валидно до:28.11.2023 г.						
156.	МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148/12.07.2013г. Валидно до: 27.02.2022 г.	Второ търговско име на . ХЕМНИКО 24 СК					
157.	МОДАОН 4 Ф Фейнхими Швебда -Удостоверение № 176-2/28.08.2013 г.	480 г/л бифенокс		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>5000	-	3
			150 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата			
			100 мл/дка	Рапица – внася във фенофаза 4-8 лист на културата			
158.	МОНСУН АКТИВ ОД Байер КропСайанс АД - Удостоверение №01255–ПРЗ- 2/16.06.2015г. Валидно до: 30.06.2025 г. Заповед №РД 11- 1058/03.07.2014г.	31,5 г/л форамсулфурон - натрий 10 г/л тиенкарбазон- метил 15 г/л ципросулфамид (антидот)		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	> 5.000	-	1
			150 мл/дка	Царевица: Приложение разтваряне на втори-осми лист (ВВСН 12-18)			
			75 мл/дка	Царевица: брой приложения -2 1) втори лист-трети лист (ВВСН 12-13); 2)пети-осми лист (ВВСН 15-18)			
				Срещу балур от коренища (<i>Sorghum halepense</i>) при			
			200 мл/дка	Царевица: Приложение - разтваряне на втори- осми лист (ВВСН 12-18)			
159.	МУСТАНГ 306,25 СК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 156/05.01.2005 г.	6,25 г/л флорасулам+ 300 г/л 2,4 Д естер		Срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1593	65	3
			40 мл/дка или 60 мл/дка	Царевица – внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)			
			60-80 мл/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата			

160.	МИШЪН 200 СЛ Агри Кем Б.В., Холандия Разрешение № 01416 – ПРЗ- 1/07.06.2016г. Валидно до: 30.06.2018 г. Заповед №РД 11- 952/31.05.2016 г.	дикват 200 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		Картофи -10; ябълка, круша, дюля, праскова, кайсия, череша, вишна, Слива, Бадем, Лешник, Фисташка, Кестен, Орех, Маслини (за зехтин), Лозя -30; останалите не се изисква	втора професионална
			330-500 мл/дка	Ябълка, Круша, дюля, Праскова, Кайсия, череша, вишна, Слива, Бадем, Лешник, Фисташка, Кестен, Орех, Маслини (за зехтин), Лозя Срещу кускута (<i>Cuscuta</i> spp.)			
			200-250 мл/дка	Люцерна, Детелина За десикация			
			400 мл/дка	Картофи			
			300-350 мл/дка	Люцерна (семепроизводство)			
161.	НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г.	Второ търговско име на ЛЕОПАРД 5 ЕК					
162.	НАСА 360 СЛ Агрис С.А. България Разрешение №0031 – ПРЗ- 4/06.03.2017г. Валидно до:28.12.2012г. Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. Заповед №РД 11-287/08.02.2017 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 08.02.2017г. на ПРЗ НАСА 360 СЛ	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
		400-1200 мл/дка	Овощни градини Лозя Свободни площи (стърница) Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				

	Заповед №РД 11-287/08.02.2017 г. НАСА 360 СЛ Зениг Кроп Сайънсис АД – Лихтенщайн -Удостоверение № 31-3/04.05.2012 г.						
163.	НЕМАСОЛ 510 Таминко -Удостоверение № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	Галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилийум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена – за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилено	896	-	1
164.	НЕРО ЕК Хеминова А/С, Дания Разрешение№ 01496 – ПРЗ- 1/07.09.2017 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед № РД 11- 1668/10.08.2017 г.	петоксамид 400 г/л кломазон 24 г/л	300 мл/дка	Зимна маслодайна рапица При едногодишни широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 След сеитба преди поникване на културата Приложение до 5 дни след сеитба.	-	-	втора професи онална
165.	НИКОГАН 4 СК АДАМА Агрикулчър БВ Разрешение № 01129-ПРЗ- 2/31.10.2017 г. Валидно до:09.05.2021г. Заповед № РД 11- 2035/17.10.2017 г.	40 г/л - никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде)	>2000	-	Втора професи онална
			125 мл/дка	Царевича – прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели			

	НИКОГАН 4 СК Аган Кемикъл -Удостоверение № 01129- ПРЗ/18.05.2011 г. Валидно до:09.05.2021г.	40 г/л никосулфурон	125 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде) Царевича – прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели			3
166.	НИКО Сапек агро С. А Разрешение№ 01329 – ПРЗ- 2/11.01.2017г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 1106/24.06.2015 г. и Заповед №РД 11- 2496/15.12.2016 г.	Второ търговско име на НИКОЗЕА ОД					
167.	НИКОЗЕА ОД/НИКО Сапек агро С. А Разрешение№ 01329 – ПРЗ- 2/11.01.2017г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 1106/24.06.2015 г. и Заповед №РД 11- 2496/15.12.2016 г. НИКОЗЕА ОД Сапек агро С. А Разрешение№ 01329 – ПРЗ-1/ 21.07.2015 Валидно до: 31.12.2019 г.	никосулфурон - 40 г/л	100 -150 мл/дка 1) 100 мл/дка 2) 50 мл/дка Да не се прилага при сладка царевича и при семе-производство. В случай на продължителен период на никнене на плевелите максималната	Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж) *Прилага се във фаза ВВСН 12 – 18 (разтваряне на 2-ри лист – разтваряне на 8-ми лист)			непрофесионална

			доза може да бъде достигната чрез две приложени Първото - с доза 100 мл продукт/дка, а второто - с 50 мл .продукт /дка и интервал между третиранията 7-10 дни.				
				Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели		-	непрофесионална
			100-150 мл/дка	Царевица (за зърно и силаж) : еднократно прилагане			
			1) 100 мл/дка + 2) 50 мл/дка	Царевица (за зърно и силаж) еднократно прилагане Двукратно прилагане през 7-10 дни			
168.	НИРВАНА БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 0589 - 2/22.10.2014 г. Валидно до: 04.06.2013 г.*** Заповед РД 09-440/04.06.2003 г. г. *Гратисен период за използване на наличните количества в страната - 18 месеца ,като се допуска срок от 6 месеца за предлагане на пазара, считано от 21.04.2015 г.	16,7 г/л имазамокс+ 250 г/л пендиметалин		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	30	3
			300 мл/дка	Слънчоглед (имитолерантен хибрид “Рими” на ф. “Лимагрейн”) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите			
			300-400 мл/дка	Слънчоглед (имитолерантни хибриди) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеляване от паламида			

169.	НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД					
170.	НИШИН ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
171.	НОМИНЕ 400 СК Кумиай кемикъл -Разрешение № 392 – ПРЗ -2/ 15.02.2016г. Валидно до: 31.07.2022 г. Заповед №РД 11- 180/03.02.2016 г.	408 г/л биспирибак- содиум		Срещу Кокошо просо (<i>Echinochloa crus – galli</i>), Кокошо просо оризово (<i>Echinochloa phyllopogon</i>), Морски болбосхъонус (<i>Bolboschoenus maritimus</i>), Живовлековидна лаваница (<i>Alisma plantago-aquatica</i>), (<i>Heterantheria reniformis</i>), (<i>Lindernia Diffusa</i>) (<i>Limnophila sessilifolia</i>), (<i>Murdannia keisak</i>), (<i>Schoenoplectus mucronatus</i>)	>5000	-	втора професионална
			6 - 7,5 мл./дка	Ориз * Прилага се с 100 мл/дка адювант Биобауър			
		*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 03.02.2016г. на ПРЗ НОМИНЕ 400 СК+ БИОПАУЪР -Удостоверение № 392/02.02.2007 г.			Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: Ориз – внасят се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода		
172.	НУФЛОН СК Белхим Кроп Протекшън -Удостоверение № 01197-ПРЗ/ 19.11.2103г. Валидно:05.11.2023г.	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:		-	1
			100 - 200 мл/дка	Фасул и грах			
			100 - 160 мл/дка	Картофи			
173.	ОКСИГАН	Второ търговско име на ГАЛИГАН 240 ЕК					

	240 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение № 278-ПРЗ-2/31.07.2012 г.						
174.	ОКСО 337 ЕК Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 01456 – ПРЗ-1/ 17.11.2016 г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед №РД 11- 2016/20.10.2016 г.	бромоксинил - октаноат – 262 г/л темботрион – 50 г/л изоксадифен- етил – 25 г/л (антидот)	100 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Царевича, сладка царевича –еднократно приложение *ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист + 100 мл/дка прилепите Мера		-	втора професи онална
			2 x 75 мл/дка (общо 150 мл/дка)	Царевича, сладка царевича - двукратно приложение (дозата не трябва да надвишава 150 мл/дка) * ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист;Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист Интервал между третиранията 7-14 дни			
175.	ОМНЕРА ОД ДюПон Интернешанъл Опереишънс САРЛ, Швейцария Разрешение № 01502 – ПРЗ – 1/25.09.2017 г. Валидно до: 31.12.2022 г. Заповед № РД 11- 1842/05.09.2017 г.	флуороксипир - 135 г/л метсулфурон- метил - 5 г/л тифеенсулфуо н-метил – 30 г/л	75-100 мл/дка	Зимни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, твърда пшеница) ▪ При широколистни плевели се внася във фаза ВВСН 20-39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) * Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели	-	-	втора професи онална
			75-100 мл/дка	Пролетни житни култури (пшеница, ечемик, овес, твърда пшеница) ▪ При широколистни плевели се внася във фаза ВВСН 12-39 (два листа разтворени - фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) * Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели		-	
176.	ОПТИКА ТРИО НюФарм	130 г/л мекопроп-П		Срецу: широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните	1083	-	2

	-Удостоверение № 0548/30.01.2009 г. Валидно до:28.12.2012г.	310 г/л дихлорпроп-П 160 г/л МЦПА	150-200 мл/дка	хербициди плевели при: Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите				
177.	ОРДАГО СК Адама Аган ООД, Израел Разрешение № 01517 –ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до : 31.07.2019 г. Заповед № РД 11-2123/19.10.2017 г.	Пендиметалин 400 г/л	Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели					втора професионална.
			300-500 мл/дка	Пшеница, ечемик Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			300-500 мл/дка	Царевица Внася се преди поникване или скоро след поникване на културата (1-3 лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			250-400 мл/дка	Артишок Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			250-400 мл/дка	Домати Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			250-400 мл/дка	Зеле Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			250-400 мл/дка	Броколи Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	
			250-400 мл/дка	Карфиол Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40			-	

			250-400 мл/дка	Лук (директна сеитба) Внася се преди поникване или скоро след поникване (ВВСН 12-14) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			250-400 мл/дка	Лук (от арпаджик) Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Чесън Внася се преди поникване или скоро след поникване (ВВСН 10-13) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Фасул и грах Внася се преди сеитба или преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			250-400 мл/дка	Целина Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Слънчоглед Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Соя Внася се преди сеитба *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Картофи Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Пипер Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	

			300-500 мл/дка	Тютюн Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300 мл/дка 300-500 мл/дка	Тютюн Внася сепри поява на първите цветове *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		21	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури През цялата вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Памук Внася се преди сеитба или преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Ягоди Внася се преди засаждане или след засаждане до края на зимния покой *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
178.	ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-ПРЗ -4/ 03.08.2015 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
179.	ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Заповед №РД 11-607/19.04.2016 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40					
180.	ПАЛАС 75 ВГ Дау Агросайънсис експорт –Франция -Удостоверение № 01118-3/28.08.2013 г.	75 г/кг пироксулам		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	-	3
			20 г/дка; 25 г/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата (ВВСН 23-29), 3-5 лист (начало на братене на житните плевели) и 2-4 до 6-8 лист на широколистните плевели			

181.	ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК					
182.	ПАНТЕРА 40 ЕК /РАНГО 40 ЕК /ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	40 г/л квизалофоп-П- тефурил	80 мл/дка	Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик при: Рапица – внася се във фаза 1-3 лист на самосевките и 3-5 лист на плевелите	1140	60	3
150 мл/дка	Срещу едногодишни житни плевели при: Слънчоглед Соя Захарно цвекло Домати						
175 мл/дка	Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: Слънчоглед Домати Тютюн (ориенталски и едролитен)						
250 мл/дка	Соя Захарно цвекло Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)						
183.	ПАСИФИК СЛ Ню Фарм Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до:26.04.2015г.	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ					
184.	ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР Байер АГ, Германия Разрешение № 578- ПРЗ-3/20.12.2017 г. Валидо до: 13.04.2009 г.*** Заповед №РД 09- 231/13.04.2006 г. Заповед №РД11-	мезосулфурон - 30 г/кг йодосулфурон - 10 г/кг+ мефемпир диетил (антидот) - 90 г/кг	35 г/дка+ 70 мл/дка Дженапол Лро	Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: Пшеница – внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели	>2000	-	3

	2616/01.12.2017 г. *** Разрешаването на продукта е валидно до приключване на процедурата по подновяването на разрешаването на продукта						
185.	ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ Байер С.А.С Разрешение № 01401 – ПРЗ- 1/10.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2017 г. Заповед №РД 11- 688/22.04.2016 г.	амидосулфурон – 50 г/кг йодосулфурон- метил-натрий – 10 г/кг мезосулфурон- метил – 30 г/кг + Мефенпир- диетил (антидот) – 90 г/кг		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професи онална
			50 г/дка	Зимна пшеница (твърда и мека) Ръж Тритикале: внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел			
			30 г/дка	Пролетна пшеница (твърда и мека): внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел			
186.	ПЕЛИКАН ДЕЛТА Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01417 – ПРЗ- 1/07.06.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. Заповед №РД 11- 947/31.05.2016 г.	дифлуфеникан - 600 г/л метсулфурон- метил – 60 г/л		Едногодишни и многогодишни широколистни плевели		-	втора професи онална
			10 г/дка	Обикновена и твърда пшеница			
			10 г/дка	Зимен ечемик			
			10 г/дка	Пролетен ечемик			
			10 г/дка	Ръж			
10 г/дка	Тритикале						
187.	ПЕНДИНОВА Ширм ГмбХ, Германия Разрешение № 01510 – ПРЗ- 1/01.11.2017 г.		400-600 мл/продукт/дка При ориз 400-510 мл/продукт/дка	Пшеница, ечемик,ръж, ориз (сеитба на сухо) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13) *Вода л/дка Мин/макс 20-60 л/дка		-	втора професи онална

<p>Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2130/19.10.2017г.</p>		400-600 мл/продукт/дка	<p>Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели –внося се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-12) *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		-	
		300-500 мл/продукт/дка	<p>Аспержи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внося се преди прорастване на културата, по време на покой *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		28	
		300-500 мл/продукт/дка	<p>Артишок Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - внося се преди засаждане/ разсаждане *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		-	
		300-600 мл/продукт/дка	<p>Пипер, домати, патладжан Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внося се преди поникване или преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		-	
		300-600 мл/продукт/дка	<p>Зеле, карфиол, броколи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внося се преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		90	
		400-600 мл/продукт/дка	<p>Моркови Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка</p>		140	
		300-500 мл/продукт/дка	<p>Лук Срещу едногодишни житни и широколистни плевели- внося се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13)</p>		-	

			400-600 мл/продукт/дка	Чесън Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13) *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Грах, фасул Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Бакла, грах, нахут Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка			
			300-500 мл/продукт/дка	Марули, цикория, ендивия Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		75	
			400-600 мл/продукт/дка	Слънчоглед, соя, фъстъци Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Картофи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Тютюн Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди или след разсаждане на културата между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

			300-400 мл/продукт/дка	Декоративни култури: разсадник, дървета (топола) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане-третиране цяла площ; след разсаждане насочено третиране *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			300 мл/продукт/дка	Житни треви за семена Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - След поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Лозя Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Семкови: ябълки, круши Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Костилкови: праскова, нектарина, кайсия Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Цитрусови култури (портокал, лимон, лайм, грейфрут и всички други цитрусови хибриди) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

			400-600 мл/продукт/дка	Памук Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
188.	ПЕНДИСТАР 40 СК/ПЕНКОТ 40 СК/ПЕНДИ 40 СК/БУЛПЕН 40 СК	пендиметалин – 400 г/л	300-500 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Слънчоглед, царевича- * След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	втора професионална -
	Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение№01280 – ПРЗ-4/30.01.2017 г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № Заповед № РД 11-1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11-2505/16.12.2016 г. и Заповед № РД 11-850/24.04.2017 г.		300-500 мл/дка	Фасул- *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Соя *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Моркови, ряпа *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Аспержи *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Картофи *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Тютюн * Преди разсаждане		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Пипер *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Марули *След сеитба, преди поникване (ССПП)		75 дни	
			250-500 мл/дка	Ендивия * ССПП или преди разсаждане		75 дни	
			250-500 мл/дка	Карфиол * Преди разсаждане		Ограничен от фазата на приложение	

			250-410 мл/дка	Цикория * Преди разсаждане		75 дни	
			200 мл/дка	Козя брада *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			300 мл/дка	Лупина *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Памук *ССПП или преди разсаждане		Ограничен от фазата на приложение	
			230-300 мл/дка	Топола * След разсаждане		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) * В периода на зимен покой		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Ябълки, круши * В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Кайсии, праскови,нектарини * В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Овощни разсадници * Преди или след разсаждане		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) * В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Фъстъци *След сеитба, преди поникване (ССПП)		Ограничен от фазата на приложение	
			250-600 мл/дка	Декоративни растения и разсадници		Ограничен от фазата на приложение	

		170-330 мл/дка	Треви за семена AGSTE ALOPR ARRAL CYXCR DECCA, LOLSS PHLPR POASS FESSS AGSST Да не се прилага при треви за храна на животните * След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя /растение)		Ограничен от фазата на приложение	
189.	ПЕНДИ 33 ЕК/ Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279 – ПРЗ-3/14.02.2017г. Валидно до :31.07.2018г. Разрешение № 01279 – ПРЗ-2/18.11.2105г. Валидно до: 31.07.2017 г. Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед №.РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед №РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г Разрешение № 01279 – ПРЗ-2/18.11.2105г. Валидно до: 31.07.2017 г.	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК				

<p>190.</p>	<p>ПЕНДИ 40 СК Шарда Кропчем Лимитед Шарда Кропчем Лимитед, Индия Разрешение №01280 – ПРЗ-4/30.01.2017 г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД 11- 1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11- 1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11- 2505/16.12.2016 г. и Заповед № РД 11- 850/24.04.2017 г.</p> <p>Разрешение № 01280–ПРЗ - 2/18.11.2015г Валидно до: 31.07.2017 г.</p>	<p>Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК</p>					
<p>191.</p>	<p>ПЕНДИГАН 330 ЕК Аган Кемикъл- Удостоверение № 01074- 2/06.12.2012г**</p> <p>Валидно до:05.03.2020 г. Заповед №РД 12- 21/05.03.2010г.</p> <p>Заповед №РД 11- 1446/03.12.2012г.</p>	<p>330 г/л пендиметалин</p>	<p>400 мл/дка 400-600 мл/дка 400-600 мл/дка 400 мл/дка 400-600 мл/дка 450 мл/дка 400 - 600 мл/дка</p>	<p>Срещу едногодишни житни и широко- листни плевели при: Царевица, след сеитба преди поникване; Царевица, след поникване във фаза ВВСН 10 – 14, приложен с 20-40 л/вода/дка; Слънчоглед, след сеитба преди поникване, приложен с 20-40 л/вода/дка; Тютюн, след сеитба преди поникване; Тютюн - преди разсаждане или след разсаждане, междуредово във фаза ВВСН 17, приложен с 20-40 л/вода/дка; Ориз (суха почва) - преди разсаждане, приложен с 20-50 л/вода/дка; Овощни градини - след поникване (Преди цъфтеж) приложен с 20-40 л/вода/дка;</p>	<p>1050</p>	<p>Ориз-90</p>	<p>непрофе сионална</p>

			300-500 мл/дка	Домати – преди разсаждане или след разсаждане, междуредово, до фаза ВВСН 20, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400- 600 мл/дка	Картофи - преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			300- 500 мл/дка	Лук I, II година - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400 – 600 мл/дка	Чесън - внася се след сеитба, преди поникване или във фенофаза ВВСН 11 – 13, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
192.	ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС Адама Аган, Израел Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г., Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. Разрешение № 01288 – ПРЗ-2/18.11.2015 Валидно до : 31.07.2017г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 06.11.2015г. на ПРЗ ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ Разрешение № 01288 – ПРЗ-1/30.01.2015	пендиметалин - 330 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		90	втора професионална
			0,4 л/дка	Пшеница - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,4 л/дка	Ечемик - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,4 л/дка	Ръж - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,53 л/дка	Царевича - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата		90	
			0,53 л/дка	Слънчоглед - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,4 л/дка	Чесън - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата		75	
			0,53 л/дка	Граха - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,53 л/дка	Картофи - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,3 л/дка	Соя - Преди сеитба или преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,4 л/дка	Лук - Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза ВВСН 10-13 на културата		Не се прилага	
			0,530 л/дка	Тютюн - Преди разсаждане на културата		Не се прилага	
0,400 л/дка	Тревни площи - След поникване на културата.		Не се прилага				

				Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона			
			0,450 л/дка	Объл артишок - Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието		60	
			0,275 л/дка	Карфиол - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Броколи - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Главесто зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Брюкселско зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,360 л/дка	Нахут - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Фасул - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Копър - Преди или след поникване на културата		75	
			0,275 л/дка	Патладжан - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Пипер (зеленчукова култура) - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Домати - Преди разсаждане на културата		75	
			0,450 л/дка	Ориз (засят в суха почва) - Преди засяване на културата		90	
			0,450 л/дка	Топола - След засаждане		Не се прилага	
			0,275 л/дка	Украсни (декоративни) култури (включително разсадници)		Не се прилага	
193.	ПЕНКОТ 33 ЕК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279 – ПРЗ- 3/14.02.2017г. Валидно до :31.07.2018г. Разрешение № 01279 – ПРЗ-2/ 18.11.2105г. Валидно до:	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК					

	31.07.2017 г. Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед № РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г Разрешение № 01279 – ПРЗ-2/ 18.11.2105г. Валидно до: 31.07.2017 г.						
194.	ПЕНКОТ 40 СК Шарда Кропчем Лимитед Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение № 01280 – ПРЗ-4/30.01.2017 г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № Заповед № РД 11-1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11-1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11-2505/16.12.2016 г. и Заповед № РД 11-850/24.04.2017 г. Разрешение № 01280–ПРЗ - 2/18.11.2015г Валидно до: 31.07.2017г.	Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК					
195.	ПИК 75 ВГ Синджента -Удостоверение №	750 г/кг просулфурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при: Царевича – внася се във фаза 3-8 лист на	1000- 2000	Зърно -не се Изисква;	Първа професи онална
			1,5 г/дка+				

	01031-ПРЗ-1/ 18.02.2010 г.		0,2 % Апллюс с 20 л/дка работен разтвор	културата и 2-4 лист на плевелите		60 -фураж	
196.	ПИТОН 75 ВДГ ГАТ Макроенкапсью- лейшън АГ -Удостоверение № 01078-3/21.10.2011 г. Валидно до : 13.10.2021г.	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ					
197.	ПЛЕДЖ 50 ВП Сумитомо Кемикъл Агро Юръп -Удостоверение № 543/18.10.2007 г.	500 г/кг флумиоксазин		Срещу широколистни и някои житни плевели при: Слънчоглед Царевича Внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата	5000	-	3
198.	ПОЙНТЕР УЛТРА ДюПонт ИО -Удостоверение № 01058-ПРЗ-2/ 25.04.2013 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	Второ търговско име на АЛАЙ МАКС					
199.	ПОЛИМЕР ВГ Ню Фарм С.А.С. -Разрешение № 1186- ПРЗ/04.07.2016 г.. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11- 1050/14.06.2016 г.	Второ търговско име на АЛИАНС ВГ					
200.	ПРИНЦИПАЛ ДюПонт ИО -Удостоверение № 01109- ПРЗ/02.11.2010 г. Валидно до: 19.10.2020 г.	429 г/кг никосулфурон+ 107 г/кг римсулфурон		Срещу едногодишни житни и много- годишни житни (в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни плевели при: Царевича за зърно и силаж (фураж), внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15- 25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели	5000	-	3
			9 г/дка+ Тренд 90 – 0,1 %				

201.	ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ ДюПонт ИО - Удостоверение № 01170/05.03.2013г. Валидно до: 18.02.2023г.	92 г/кг никосулфурон + 23 г/кг римсулфурон + 552 г/кг дикамба	44 г/дка.+ 0,1 % Тренд 90	Срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и широколистни плевели, при: Царевича за зърно и силаж (не –при захарна царевича и за пуканки и за семепроизводство– от 2ри до 6ти лист на културата (5000	-	3
202.	ПРОМАН / СОЛЕТО Фитюръп С.А., Франция Разрешение № 01362–ПРЗ-3/03.08.2016 Валидно до: 31.12.2025 г Заповед № РД 11-1934/30.12.2015г. Заповед №РД 11-625/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11-1300/19.07.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 19.04.2016 г. на ПРЗ с Разрешение № 01362–ПРЗ-2/28.04.2016г.	метобромурон – 500 г/л	400 мл/дка	Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели: Картофи		-	втора професионална
	*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 19.04.2016 г. на ПРЗ с Разрешение № 01362–ПРЗ-1/08.01.2016						първа професионална

203.	ПРОТУГАН 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 224/09.11.2004 г.	500 г/л изопротурон		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1826	45	3
			350 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културите, или			
			400-500 мл/дка	Пшеница и ечемик – внесен след сеитба, преди поникване на културите			
204.	ПУЛСАР 40 /ЛИСТЕГО 40 / ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Заповед №РД 11- 607/19.04.2016 г.	40 г/л имазамокс		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	слънчоглед , люцерна млада - 90; Ориз – не се изисква	втора професи онална
			120 мл/дка	Слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) – внася се във фаза 2-6 лист на културата; Люцерна млада – внася се един месец след засяване			
			120 мл/дка + 230 мл/дка Стомп нов 330 ЕК	Слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) внесени едновременно във фаза 2-6 лист на културата			
			125 мл/ дка	Ориз –(Clearfield/Клиърфийлд толерантни хибриди) ВВСН 12-22 (2 листа разтворени до забележими 2 братя)			
			87,5 мл/ дка	Ориз (Clearfield/ Клиърфийлд толерантни хибриди)- ВВСН 13-14 (3-4 разтворени листа)			
	*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 19.04.2016 г. на ПРЗ с Разрешение № № 0210 – ПРЗ-4 / 26.06.2014 г.						3
205.	ПУЛСАР ПЛЮС БАСФ Агро Б.В. Разрешение №01458 –ПРЗ- 1/08.02.2017г. Валидно до:31.07.2018г. Заповед № РД 11-	имазамокс 25 г/л	120-200 мл/ дка	Слънчоглед (Клиърфийлд плюсхибриди)- Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка (<i>Orrobanche spp.</i>) *При силно нападение, срещу по- развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка.		-	втора професи онална

	144/23.01.2017 г.			*Не се разрешава сеитба на рапица и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта			
206.	ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ Байер КропСайънс АГ, Германия - Разрешение № 0565 – ПРЗ -2/ 08.02.2016г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11-160/29.01.2016 г.	69 г/л феноксапроп- П-етил + 75 г/л мефенпир- диетил (антидот)		Срещу Лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Див овес (<i>Avena fatua</i>), тръстичина/двуцветно сорго (<i>Phalaris spp.</i>), Обикновена метлица (<i>Poa trivialis</i>), Ветрушка (<i>Apera spica venti</i>)	> 5.000	-	втора професионална
			100 мл/дка	Пшеница и ечемик: прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен).Прилага се във фенофаза втори лист-братене на плевелите:			
			120 мл/дка	Пшеница и ечемик: прилага се във фаза ВВСН 13-31 3 листа разтворени –първият възел е поне на 1 см над възела на братене(пролет).Прилага се във фенофаза втори лист-братене на плевелите:			
	*Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 29.01.2016 г. на ПРЗ ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ -Удостоверение № 565/29.09.2009 г. Заповед №РД 11-160/29.01.2016 г.	69 г/л феноксапроп- П-етил + антидот		Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: Пшеница и Ечемик:	3040	60	1
207.	РАНГО 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК					
208.	РАУНДЪП Монсанто Юръп -Удостоверение № 0240-3/05.03.2013 г. Валидно до:	360 г/л глифозат+180 г/л сърфактант	200 мл/дка	Памук Тютюн внесен преди сеитба (разсаждане) на културите	5000	14-пшеница, ечемик; 10 –пасища; 7- за всички останали	2
			400 мл/дка	Пшеница, ечемик внася се преди жътва като десикант			

	18.02.2023 г.		500 мл/дка	Топола Орех (над 3 години) Смърч (над 2 години)		култури	
			400-1000 мл/дка	Овощни градини Лозя Свободни площи (стърнища) Канали			
			1000 мл/дка	Ж.п. линии Пасища (срещу орлова папрат)			
209.	РАУНДЪП ЕКСТРА Монсанто Юръп -Удостоверение № 1154/01.08.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	540 г/кг глифозат (662 г/л калиева сол на N-фосфонометил глицин)	50 мл/дка	Люцерна (срещу кускута)	>5000	люцерна, домати – 2; памук, тютюн, фъстъци, соя, цвекло и други окопни култури, ориз, овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали, топола, орех, смърч, ЖП линии – 7; пасища – 10; слънчоглед, соя, пшеница, ечемик – 14;	3
			100-130 мл/дка	Домати (безразсадни)			
			130 мл/дка	Памук, тютюн, фъстъци			
			130-200 мл/дка	Соя, цвекло и други окопни култури			
			130-200 мл/дка	Ориз, срещу оризовия трясък			
			270 мл/дка	Слънчоглед, соя, пшеница, ечемик			
			270-700 мл/дка	Овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали			
			330 мл/дка	Топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години)			
650-700 мл/дка	ЖП линии Пасища (срещу орлова папрат)						
210.	РАУНДЪП ЕНЕРДЖИ Разрешение № 01357–ПРЗ-1/ 04.01.2016г. 2/20.09.2016 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11-1869/11.12.2015 г. Заповед №РД 11-1706/14.09.2016 г.	глифозат 450 г/л (под формата на калиева сол 551 г/л)	80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Корено/клубеноплодни (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, царевица: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране преди сеитба/разсаждане. Третране – минимум 6 часа преди разсаждане. При зеленчукови култури и доза над 320 мл продукт/дка третиране минимум 7 дни преди сеитба		корено/клубеноплодни (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя,	непрофесионална

			80-470 мл/дка	Аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели * Третиране след засаждане преди поникване. При зърнени култури, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици за цветя да се при-лага до 3 дни след засяване/ засаждане. При аспержи да се прилага преди поникване на пъпките		маслодайна рапица, царевица аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя, кореноплодни / грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови култури (грах, боб, бакла зелен фасул), листо-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози:	
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Кореноплодни/ грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови култури (грах, боб, бакла зелен фасул), листо-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране след засаждане (в културите), Между-редово прило-жение/ Само селективно оборудване с ограничители. Да се избягва контакт с културата			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Кореноплодни и грудкови зеленчуци (моркови, картофи захарно цвекло), зеленчуци домати, патладжан, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Третиране след при-биране на реколтата. При стърнища да се използва веднъж на сезон			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Лозя (по-стари от 4 години); Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
				Орехоплодни култури над 4 годишна възраст –Орехи, Лешници, Бадеми			
						лешници - 28; бадем, Цитрусови култури, Маслини, Киви,	

			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Насочено пръскане. При бадеми риск от чувствителност дори и при добре развит ствол		Семкови и костилкови овощни видове – 7; Ориз, Фуражни култури- люцерна, ливади, Пасища, поляни, Незасети земи, Угари, Промислени и градски площи, автомагистра ли и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, Употреба в дома и градината, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канални - не се изисква
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Цитрусови култури, Маслини, Киви: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Маслини за зехтин: макс. 480 мл /дка. При киви риск от чувствителност дори при добре развит ствол		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Семкови и костилкови овощни видове: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * При костилкови овощни риск от чувствителност дори и при добре развит ствол		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Разсадници (цветя, храсти, декоративни растения, топола): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Риск от чувствителност дори при добре развит ствол		
			80 мл./дка	Ориз: - Червен ориз (плевел) (<i>Oryza punctata</i>), Оризов тросък (<i>Leesia oryzoides</i>) *Само със селективно оборудване. Да се избягва контакт с културата. Третиране с неразреден продукт.		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Фуражни култури- люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Плевели, по-високи от културата. Да се избягва контакт с културата.		
			80-300 мл/дка	Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели):		

			300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Незасети земи, угари: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Промишлени и градски площи, автомагистрала и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Оточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Употреба в дома и градината: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
211.	РАУНДЪП КЛАСИК ПРО Монсанто Европа С.А./Н.В., Белгия Разрешение № 01340 – ПРЗ- 1/19.10.2015 г. 2/20.09.2016 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11- 1514/02.10.2015 г. Заповед №РД 11- 1707/14.09.2016 г.	глифозат 360 г/л (под форма на калиева сол 441 г/л)	0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Кореноплодни/грудкови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, царевица, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране преди сеитба/разсаждане		При третиране след поникване/ра зсаждане на кореноплодни /грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови	непрофе сионална
			0,1-1,0 л/дка	Аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя: Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели			

				* Третиране след засяване/засаждане, преди поникване на културата			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране след поникване/разсаждане на културата *Техника за намазване, навлажняване, пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата			зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози – 28; Лозя – 28; Орех, лешник, бадем, Цитрусуви култури, Семкови и костилкови овощни култури, Маслини – 7; *Третираната растителност да не се използва за храна на животни.
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Кореноплодни и грудкови зеленчукови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), зеленчукови култури, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, соя, лен, памук, синап, разсадници, синап, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Лозя (по-стари от 4 години): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Орех, лешник, бадем: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване при бадем има риск от чувствителност дори и при добре			

				развит ствол			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Цитрусуви култури: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Семкови и костилкови овощни култури: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Маслини: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Киви: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Разсаждащи се култури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от			

				чувствителност дори и при добре развит ствол			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Незасети земи, Угари: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Помишлени и градски площи, автомагистрала и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			*Третираната растителност да не се използва за храна на животни.				
212.	РАУНДЪП МАКС СЛ Монсанто Европа СА -Удостоверение № 01261–ПРЗ /11.08.2014 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л глифозат – (глифозат под формата на калиева сол-588 г/л)		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:		овощни градини, лозя-7 дни; пшеница, ечемик -14 дни	3
			300-450 мл/дка	Овощни градини (над 3 годишни дървета) Лозя (над 2 години)			
			300 мл/дка	Пшеница и ечемик *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна			

				зрялост на пшеницата				
			450 мл/дка	Ж.П. линии				
			300-450 мл/дка	Напоителни, дренажни канали и стърнища				
213.	РЕГЛОН ФОРТЕ Синджента -Удостоверение № 01032-ПРЗ-2/05.03..2013 г.	150 г/л дикват		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	876	10-картофи; 7-10-маслодайна рапица; 30 за всички останали култури	Първа професионална	
			300 мл/дка	Лозя Овощни градини				
			100 мл/дка 150-200 мл/дка 250 мл/дка 250-300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 250 мл/дка 250 мл/дка	Дефолиант/десикант при: Памук Кориандър Слънчоглед Люцерна за семепроизводство Соя Ориз Маслодайна рапица Картофи				
214.	РЕФАЙН ЕКСТРА ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ Разрешение № 0538-ПРЗ-3/16.06.2015 г. Валидно до: 31.12.2016	Второ търговско име на ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ						
215.	РИКОРСО /МЕТСУРАМ 200 ВГ Ротам Агрокемикъл -Удостоверение №01076-ПРЗ/16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон-метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3	
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист				
216.	РОТЕР ВГ Стоктон Кемикъл -Удостоверение №01184-ПРЗ/22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	600 г/кг метсулфурон метил	10 г/ха (1г/дка)	Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: Пшеница	>1200	-	2	

217.	САМСОН 4 ОД /ФОРНЕТ 4 ОД /НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	40 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели при :		-	2
			100 - 150 мл/дка	Царевича във фаза разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (ВВСН 12-18)			
			100 мл/дка 50 мл/дка	Двукратно прилагане срещу балур: Прърво третиране Второ третиране 7-10 дни по-късно			
218.	САМСОН ЕКСТРА 6 ОД -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
219.	САНАФЕН Дау Агросайънсис -Удостоверение № 215/20.10.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	Царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
220.	САТЕЛИТ 360 СЛ Индустриас Афрази -Удостоверение №01162/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	360 г/л глифозат	0.600-1.000 л/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели при овощни видове на повече от 3-4 години –семкови (ябълка и круша) и костилкови (кайсии, праскови, нектарини, череша и сливи) Изчистване на свободни площи (преди засяване)	>2000	-	3
			0.150-0.600 л/дка	Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели, за пътища, ливади, напоителни канали и противопожарни защитни пояси.			
221.	СИЛБА СК Синджента Разрешение № 01001 – ПРЗ- 4/16.02.2017г. Валидно до31.07.2019г. Заповед № РД 11- 243/03.02.2017 г. *Считано от 03.02.2017г. ,се определя 6 месеца за	Второ търговско име на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК					

	<p>продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита</p> <p>ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК</p> <p>разрешен за пускане на пазара и употреба със Заповед № РД 11-264/13.02.2015 г. -Разрешение № 01001-ПРЗ-3 /19.03.2015г. Валидно до: 08.07.2015г.</p>						
222.	<p>СИРИО 4 СК /КРЮ 4 СК/ АСТРАЛ 4 СК НюФарм САС -Разрешение № 01055-ПРЗ-3/04.07.2016г. Заповед №РД 11-1049/14.06.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 29.01.2016 г. на ПРЗ с -Удостоверение № 01055-2/ 28.02.2012 г.</p>	40 г/л никосулфурон	125 мл/дка	<p>Срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:</p> <p>Царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата</p>	5000	-	непрофесионална (3)
223.	<p>СИРТАКИ Оксон Италия С.п.А</p>	кломазон 360 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:		-	втора професи

	Разрешение № 01449 – ПРЗ-1/20.09.2016 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11-1712/14.09.2016 г.		25-30 мл/дка	Картофи:			онална
			30-50 мл/дка	Ориз (засят на сухо)			
			30-50 мл/дка	Ориз (засят във вода)			
			40-50 мл/дка	Тютюн * Трети-рането да се лока-лизира в редовете на култу-рата			
224.	СУОРД 240 ЕК Аган Кемикъл Мануфакчърс АД -Удостоверение № 01211 – ПРЗ / 29.01.2014г. Валидно до: 31.01.2018 г.	240 г/л клодинафоп-пропаргил	30-40 мл/дка	Соя: След сеитба преди поникване - до ВВСН 01-08 Начало на набъбване на семето до хипокотила достига повърхността на почвата: вижда се извивката на хипокотила; -Рано след поникване – до ВВСН 10-14 Котиледоните са напълно разтворени до разтваряне на трилистник на 4-ти възел			2
			17мл/дка	При пшеница (във фенофаза ВВСН 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата)):			
			20мл/дка	Срещу полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) и див овес (<i>Avena spp.</i>)			
			25мл/дка	Срещу тръстичина (<i>Phalaris spp.</i>), пролетно просо (<i>Milium vernale</i>) Срещу райграс и житна пиявица (<i>Lolium spp.</i>)			
225.	СЕКАТОР ОД Байер С.А.С., Франция; Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 371-3/07.12.2017 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед № РД 09-213/06.04.2006 г. Заповед № РД 11-2559/29.11.2017 г.	100 г/л амидо-сулфурон+ 25 г/л йодосулфурон + 250 г/л антидот (мефемпир-диетил)	10 -15 мл/дка	Срещу Широколистни, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди (2,4-Д, МЦПА) плевели Пшеница : внася се във фаза ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист - флаговият лист е напълно разтворен) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка	>5000		втора професионална
			10 мл/дка	Срещу Широколистни, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди (2,4-Д, МЦПА) плевели Ечемик - ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист - флаговият лист е напълно разтворен) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка			
226.	СЕЛЕКТ 240 ЕК Ариста Лайфсайънс	240 г/л клетодим	40 мл/дка	Срещу едногодишни житни плевели при: Домати	1630		3

	-Удостоверение № 01122-ПРЗ/01.02.2011 г.			Захарно цвекло Слънчоглед Соя Картофи Фасул			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			80 мл/дка	Домати Захарно цвекло Слънчоглед Соя Картофи Фасул Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин, Масло РЗ)			
227.	СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК / ЦЕНТУРИОН СУПЕР/ШАДОУ Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ-3/16.02.2017г. Валидно до: 26.04.2015г. Заповед № РД 12-20/26.04.2005 г. Заповед № РД 11-157/29.01.2016 г. и Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 07.02.2017 г. на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК със Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г.	120 г/л клетодим		Срещу едногодишни житни плевели при:	1360	100	3
			80 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Фасул Картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			160 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Фасул Картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			

	-Удостоверение за № 0348-ПРЗ-2/08.02.2016г. Заповед № РД 11-157/29.01.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 29.01.2016 г. на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК -Удостоверение за № 0348/01.12.2005 г.						
228.	СЕРИДОР МЦПА НюФарм Удостоверение № 0551- ПРЗ-2/30.05.2011 г. Валидно до : 31.12.2011г.	Второ търговско име на АГРОКСОН					
229.	СОЛЕТО Фитюръп С.А., Франция Разрешение № 01362-ПРЗ-3/03.08.2016 Валидно до: 31.12.2025 г Заповед №РД 11-1300/19.07.2016 г.	Второ търговско име на ПРОМАН					
230.	СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ /ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600-3/04.05.2012 г.	69 г/л феноксапроп- П- етил+антидот		Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	>5000	60	3
			100 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес			
231.	СМЕРЧ 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн	240 г/л оксифлуорфен		Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3
			80 мл/дка	Слънчоглед - внася се вегетационно за			

	-Удостоверение № 374/28.08.2006 г			културата и фаза 2-4 лист на плевелите			
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие			
			150 мл/дка	Лозя - внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане			
232.	СПЕКТРУМ БАСФ СЕ -Удостоверение № 360/26.04.2006 г	720 г/л диметенамид-П		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1480	-	3
			80-140 мл/дка	Царевича Слънчоглед Захарно цвекло Соя Картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
233.	СПРИНГБОК БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01366 – ПРЗ-2/ 20.12.2017 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед № РД 11-1938/30.12.2015 г. Заповед №РД 11-2605/01.12.2017 г.	диметенамид – П - 200 г/л метазахлор – 200 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, самосевки от житни култури	> 500 < 2000	70	първа професионална
			250 мл/дка	Зимна маслодайна рапица: * На една и съща площ еднократно третиране на 2 години. Еднократно приложение във фенофази ВВСН 00-09 (<i>сухо семе – показване на котиледоните на почвената повърхност</i>) или във фенофази ВВСН 10-18 (<i>напълно оформени котиледони - 9 листа оформени</i>)			
234.	СТАРАНЕ ГОЛД Дау АгроСайънсис С.А.С., Франция -Удостоверение № 01294 – ПРЗ-1/ 19.03.2015 г. Валидно до: 31.12.2016 г.	флуороксибир – 100,0 г/л флорасулам – 1,0 г/л		Срещу широколистни плевели:			
			180 мл/дка	Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале			
			120 мл/дка	Царевича за зърно и силаж * Да не се прилага при сладка царевича и царевича за семепроизводство			
						Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен),	втора професионална

						ръж (зимна и пролетна), тритикале - 50 дни; Царевица за зърно и силаж	
235.	СТЕЛАР 210 СЛ БАСФ СЕ -Удостоверение № 01090-2/04.09.2013 -Краен срок за предлагане на пазара: 30.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 30.09.2016г.	50 г/л топрамезон+ 160 г/л дикамба		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и паламида при:	>2000 1707	-	1
			100 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Царевица - внася се във фаза 2-5 лист на културата и фаза 2-5 лист на плевелите			
236.	СТОМП® АКВА БАСФ Агро Б.В. -Разрешение № 01011-ПРЗ-4/ 10.05.2016 г. Валидно до: 14.08.2019 г. Заповед №РД 12-54/14.08.2009 г. Заповед №РД 11-1982/10.12.2014 г. и Заповед №РД 11-703/22.04.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 22.04.2016 г. на ПРЗ -Удостоверение №	455 г/л пендиметалин		Едногодишни житни и широколистни плевели:	>5000	Царевица, лук, слънчоглед -60; кориандър 75; нахут 40; *Сорго-120 дни (зърно); 90 дни (силаж и зелен фураж); останалите култури – неприложим	втора професионална
			350 мл/дка	Царевица: внася се в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите			
			350 мл/дка	Слънчоглед: внася се в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите			
			350 мл/дка	Памук: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване			
			350 мл/дка	Лук (от арпаджик): внася се в начало на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите			
			350 мл/дка	Нахут: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване			
			350 мл/дка	Тютюн - внася се преди засаждане на разсада на полето			
			350 мл/дка	Кориандър: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване			
			350 мл/дка	Картофи: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване			

01011-ПРЗ-3/ 30.01.2015г.	250-300 мл/дка	Пшеница Ечемик Тритикале Ръж внося се след сеитба, преди поникване на културата
	300-350 мл/дка	Слънчоглед Царевца: внася се след сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите
	250-300 мл/дка	Фасул, Грах (полски и градински): След сеитба, преди поникване на културата
	250-300 мл/дка	Соя: внася се след сеитба, преди поникване на културата
	250-300 мл/дка	Ябълки Круши Праскови Нектарини Кайсии: внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.
	250-300 мл/дка	Портокали Лимони Мандарини Помело Грейпфрут: внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата
	200-300 мл/дка	Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета: Насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения
	250-300 мл/дка	Лозя: внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата (преди началото на вегетация)
	250-300 мл/дка	Ягоди: внася се преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта
	250-300 мл/дка	Домати: внася се преди разсаждане на културата
	250-300 мл/дка	Маруля Салати: внася се преди поникване на културата
	250-300 мл/дка	Зеле, Броколи, Карфиол: внася се преди разсаждане на културата
	250-300 мл/дка	Чесън: внася се след засаждане на културата, преди появата на стъблото
	200-250 мл/дка	Моркови: внася се преди поникване на културата
200-250 мл/дка	Артишок: внася се преди разсаждане или	

				при засети насаждения преди начало на вегетация			
			260 мл/дка	* Минимална употреба Сорго: внася се преди или рано след поникване, до ВВСН 16 на културата (шест разтворени листа)			
237.	СТОМП НОВ 330 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 01007/06.10.2009 г. Валидно до:30.04.2019 г. Заповед № РД 12- 27/30.04.2009 г.	330 г/л пендиметалин		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	>500 <2000	40-нахут, фасул, соя, фъстъци; 60-лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед; 75 - домати и пипер разсадни, мента, кориандър; 90 –пшеница, ечемик, ориз; неприложим – картофи, памук, тютюн, гладиоли	3
			230 мл/дка+ 40-120 мл/дка Пулсар 40	Слънчоглед (клиърфилд хибриди) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата			
			300-400 мл/дка	Гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			400 мл/дка	Царевица Слънчоглед Памук Фасул Соя Фъстъци Кориандър Внася се след сеитба, преди поникване на културите Тютюн - внася се преди засаждане Мента - внася се преди или след засаждане Ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата			
			400-500 мл/дка	Картофи Лук I, II год. Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите Домати (разсадни) Пипер (разсаден) Внася се преди засаждане на културите			
450 мл/дка	Ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата Нахут - внася се след сеитба, преди поникване на културата Царевица Слънчоглед Внася се в начало на вегетация на културата и до						

				2 лист плевелите			
			500 мл/дка	Пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			600 мл/дка	Малини Овощни градини - рано на пролет, след първата обработка на почвата Ориз - внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист			
238.	СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение за № 1006- ПРЗ/06.10.2009г.	Второ търговско име на ФОКУС УЛТРА					
239.	СУЛКОГАН 300 СК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД, Израел -Удостоверение №01228–ПРЗ/ 17.04.2014г. Валидно до: 28.03.2024г.	сулкотрион – 300 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели		не се изисква	1
			100 -150 мл/дка	Царевича			
240.	СУЛТАН 500 СК /БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г.	500 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	2150	70	1
			200 мл/дка	Маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
241.	ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК /ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г.	50 г/л квизалофоп-П- етил		Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:	>2000	60	3
			200 мл/дка	Слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
242.	ТАЙФУН СЛ Файнкеми Швебда, Аган Кемикъл, Монсанто Юръп	360 г/л глифозат	300 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели при: Слънчоглед * преди сеитба на културите		30	непрофесионална

	Разрешение №01174 – ПРЗ-2/01.02.2017г. Валидно до: 18.02.2023г. Заповед № РД 11-195/18.02.2013 г -Удостоверение №01174-1/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023г.		300 мл/дка	Царевича * преди сеитба на културите		30 дни	
			400 мл/дка	Като десикант Слънчоглед *Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, ВВСН 87		30 дни	
			400-1200 мл/дка	Овощни градини * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж);		-	
			400-1200 мл/дка	Стърнища * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж)		-	
			400-1200 мл/дка	Свободни площи * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж)		-	
			400-1200 мл/дка	Лозя * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж), фаза на развитие на културата ВВСН 19-65		-	
			1200 мл/дка	ЖП линии * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)		-	
			400 мл/дка	Зимна пшеница * ранна восьчна зрялост ВВСН 83 – 85, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)		14 дни	
243.	ТАРГА СУПЕР 5 ЕК /АЧИБА 5 ЕК Нисан кемикъл -Разрешение № 01054-ПРЗ-2 /17.11.2016 г. Заповед №РД 11.-2020/20.10.2016 г *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 20.10.2016 г. на ПРЗ с-Удостоверение № 01054-	50 г/л квизалофоп-П-етил	120 мл/дка	Маслодайна рапица - срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите Срещу едногодишни житни плевели при:	2550	90 рапица; 60 останалите	непрофесионална (3)
		150 мл/дка	Слънчоглед Соя Захарно цвекло Памук Лук Тютюн Фасул Картофи Домати Ягоди				

	ПРЗ/04.03.2010 г.			Малини Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: 175 мл/дка Домати 200 мл/дка Слънчоглед 200-250 мл/дка Соя Захарно цвекло Памук Тютюн Фасул 250-300 мл/дка Картофи Домати Лук Ягода 300 мл/дка Малини 300-600 мл/дка Лозя Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
244.	ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД ДюПонт ИО -Разрешение № 01065-4/01.07.2015г Валидно до: 18.02.2023 г. * Заповед №РД 11-1015/17.06.2015 г.	3,26 % римсулфурон + 60,87 % дикамба		Срещу широколистни и житни плевели (вкл. срещу балур от семе) при: 30,7 г/дка+ 1 % Тренд 90 38,4 г/дка+ 1 % Тренд 90 Царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16) Царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16) *По-високата разрешена доза се използва при по-силно заплевеляване и при прераснали плевели			втора професионална
245.	ТАРИКА Лаинко, С.А., Испания Разрешение № 01407 – ПРЗ-1/09.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11-610/19.04.2016 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг		Едногодишни широколистни плевели: 2 г/дка Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж		-	непрофесионална

246.	ТЕМЗА СК Глобахем Н.В., Белгия Разрешение № 01494 – ПРЗ*1/30.08.2017 г. Заповед №РД 11 – 1709/16.08.2017 г. Валидно до: 31.07.2018 г.	мезотрион – 100 г/л	75 - 150 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Царевича за фураж и зърно: внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист)	-	-	втора професи онална
247.	ТЕНДЪР ЕК Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г.	Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК					
248.	ТЕНУРОН 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11- 414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11- 831/24.04.2017 г.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					
249.	ТЕРИДОКС 500 ЕК Синджента -Удостоверение № 01096-ПРЗ- 1/16.06.2010 г.	500 г/л диметахлор	200 мл/дка с 40 л/дка работен разтвор	Срещу кокоше просо, кръвно просо, сива кощрява, зелена кощрява, прешленеста кощрява, балур от семе, видове щир, татул, видове лайка, врабчови чревца, бръшлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчар-ска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, самосевки от пшеница, полско подрумче, полски синап, войничница, лечебен росопас при: Зимна маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване и ранни фази на плевелите	2000	-	Втора професи онална

250.	ТЕРМИНАТОР 4 СК Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд -Удостоверение за № 0598-2/06.08.2012 г.	40 г/л никосулфурон		Срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кошрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви при:	5000	-	3
			125 мл/дка	Царевица - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.			
251.	ТИТУС 25 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0543/20.10.2008 г.	250 г/кг римсулфурон		Срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при:	5000	30	3
			4-6 г/дка	Царевица Картофи			
			5 г/дка	Домати Внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевичката *При царевичка може да се комбинира с 2,4 Д ам.сол. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевичка и с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15%. *Да не се използва при картофи сорт Бинге			
252.	ТОЛУРЕКС 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 503/18.06.2007 г.	500 г/л хлортолурун		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	10000	30	3
			350-400 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите			
253.	ТОПИК 080 ЕК Синджента -Удостоверение № 01033-ПР3-2/ 18.05.2011 г.	80 г/л клодинафоп пропаргил +антидот		Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	3000		Непрофесионална
			30-40 мл/дка	Пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес			
254.	ТОРИНКА /ФР – 888 Монсанто Юръп -Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат	200 мл./дка	прилага се при: Памук, тютюн. , внесен преди сеитба (разсаждане) на културите - при 5-10 см височина на плевелите;	5000	14 дни – пшеница, ечемик 10 дни- пасища;	2
			400 мл./дка	Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант);			
			400-1000 мл./дка.	Овощни градини, лозя, свободни площи (стърница), канали (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели);			
			500 мл./дка	Топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - при бутонизация на широколистните и			

			1000 мл./дка	изкласяване на житните плевели; ЖП линии (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели); Пасища (срещу орлова папрат <i>Pteridium aquilinum</i> – при пълно развитие на плевела, локално третиране);			
255.	ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г.	Второ търговско име на ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК					
256.	ТОСКАНА Проплан Плант Протекшън Компани -Разрешение № 01375 – ПРЗ-1/08.02.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11-155/29.01.2016 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:	-	-	непрофесионална
			1-2 г/дка	Пшеница Ечемик *ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29			
257.	ТРАКСОС 50 ЕК Синджента Кроп Протекшън Разрешение № 01216-ПРЗ-2/09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. Заповед № РД 11-1369/25.07.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 25.07.2016 г. на ПРЗ Удостоверение № 01216-ПРЗ/29.01.2014 г.	25 г/л пиноксаден 25 г/л клодинафоп пропаргил 6,25 г/л клоквинтоцет-мексил (антидот)		Срещу едногодишни житни плевели (в т.ч. и див овес):	>2000	-	втора професионална (2)
			120 мл./дка	Пшеница: Момент на приложение (фаза на приложение): от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели			
258.	ТРЕЙЛЪР Индъстриас Афраза	трибенурон-метил – 750		Срещу Едногодишни широколистни плевели		-	непрофесионална

	С. А., Испания Разрешение № 01408 – ПРЗ- 1/09.05.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11- 609/19.04.2016 г	г/кг	2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж			
259.	ТРИБЕ 75 ВГ/ТЕНУРОН 75 ВГ/ТРИНУ 75 ВГ /ТРИРОН 75 ВГ/ТРИША 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11- 414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11- 831/24.04.2017 г. ТРИБЕ 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение № 01307- ПРЗ-1/ 08.04.2015г. Валидно до: 31.10.2018 г.	трибенурон – метил - 750 г/кг	2 гр./дка	Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес (пролетен и зимен), Ръж, Тритикале * ВВСН 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима * Да не се прилага след фаза ВВСН 39 на културата. Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколти-ране.		-	втора професионална
260.	ТРИНУ 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до:	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					

	31.10.2018г. Заповед № РД 11-414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11-183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11-2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11-831/24.04.2017 г.						
261.	ТРИМЕР 75 ДФ ДюПонт ИО -Разрешение № 01028-ПРЗ-2/ 21.07.2015 г. Валидно до: 24.06.2025 г.	Второ търговско име на ГРАНСТАР 75 ДФ *Гратисен период -6 месеца за продажба и 1 година за употреба за ПРЗ Гранстар 75 ДФ/ Тример 75 ДФ, разарешен с Удосотверение № 1028-ПРЗ-1/17.02.2010 г., считано от 21.07.2015 г..					
262.	ТРИМУР Ексклузивас Сарабия, С.А -Разрешение № 01386-ПРЗ-1/ 25.03.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед № РД 11-396/16.03.2016 г.	трибенурон-метил 750 г/кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	непрофесионална
			1- 2 г/дка	Пшеница Ечемик Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29			
263.	ТРИПАЛИ ВГ ДюПон Интернешънъл Оперейшънс , Швейцария Разрешение № 01504-ПРЗ-1/ 31.10.2017 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед № РД 11-2040/17.10.2017 г.	трибенурон-метил 83 г/кг метсулфурон-метил 83 г/кг флорасулам 105 г/кг		Едногодишни и многогодишни широколистни плевели Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) Внася във фаза ВВСН 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) *Брой приложения мин/макс *Вода л/дка мин/макс - 10 – 40 * Да не се прилага през есента		-	Втора професионална
			5 г/дка				

264.	ТРИРОН 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11- 414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11- 831/24.04.2017 г.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					
265.	ТРИША 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11- 414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11- 831/24.04.2017 г.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					
266.	ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ Синджента -Удостоверение № 010015-ПРЗ/ 14.10.2009 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	30	Непрофесионална (3)
150 мл/дка	Стърнища						
200 мл/дка	Лозя Овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели						
	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:						

			300 мл/дка	Пшеница и ечемик внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %			
				Срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:			
			400 мл/дка	Стърнища			
			600 мл/дка	Лозя Овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели			
267.	У 46 М ФЛУИД* Ню фарм	500 г/л МЦПА		Срещу широколистни плевели при:	700	-	2
			200 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
268.	УИДМАСТЕР 464 СЛ Синджента -Удостоверение №528/17.06.2008 г. Краен срок за предлагане на пазара: 29.11.2015 г. Краен срок за употреба на наличните количества: 29.11.2016 г.	344 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба	80-100 мл/дка	Срещу широколистни в т. ч. слаб-очувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	1347	-	3
269.	УИНГ-П БАСФ -Удостоверение № 530/12.07.2007 г. Валидно до: 10.07.2010 г. Заповед № РД 12-27/30.04.2009 г.	212,5 г/л диметенамид-П+ 250 г/л пендиметалин		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>500 <2000	30	3
			300-400 мл/дка	Царевича Слънчоглед Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
270.	УИШ ТОП Шарда Кропкем Лтд,			Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели		35	втора професи

<p>Индия Разрешение № 01515 – ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 30.11.2020 г. Заповед № РД 11- 2126/19.10.2017 г.</p>		83-125 мл/продукт/ дка	<p>Овощни култури (ябълки, круши, праскови) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-59 (първи развити листа-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за едно-годишни, а по-високата е за многогодишни те плевели</p>			онална	
		125 мл/продукт/ дка	<p>Лоза Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-57 (отворени втори листа-съцветията са напълно развити) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка</p>				35
		83-125 мл/продукт/ дка	<p>Боровинки, малини, френско грозде Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен втори лист-леторастите са достигнали 90% от дължината си) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-годишните, а по-високата е за многогодишни те плевели</p>				42
		83-125 мл/продукт/ дка	<p>Картофи Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтваряне на втори листа на главно стъбло-посева се съгъстява:около 90% от растенията в редовете се допират) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за едно-годишните, а по-високата е за многогодишни те плевели</p>				56
		83-125 мл/продукт/ дка	<p>Захарно цвекло Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първи чифт листа-листата покриват 90% от повърхността) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-годишните, а по-</p>				60

				високата е за многогодишни те плевели		
			83-125 мл/продукт/ дка	Слънчоглед Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първа двойка листа- поява на 9-то удължено междувъзлие) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-дишните, а по- високата е за многогодишни те плевели		84
			83-125 мл/продукт/ дка	Тютюн Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-повече от 90% от м/у- редията са покрити) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		30
			83-125 мл/продукт/ дка	Кръмно цвекло Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първи чифт листа- листата покриват 90% от повърхността) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка		60
			83-125 мл/продукт/ дка	Люцерна, детелина Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		21
			83-125 мл/продукт/ дка	Домати, патладжан Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (втори същински лист- формиране на странични разклонения) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка		15

			83-125 мл/продукт/ дка	Листни зеленчуци (маруля, спанак, подправки маруля, скарола, радичио спанак, подправки – див керевиз, див лук, листа от целина, магданоз, градински чай, розмарин, машерка, босилек, дафинови листа, естрагон Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		28	
			83-125 мл/продукт/ дка	Грах, фасул, леща, нахут Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		23	
			83-125 мл/продукт/ дка	Маслодайни (рапица,лен, соя,памук) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		84	
			83-125 мл/продукт/ дка	Декоративни растения Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		-	
			83-125 мл/продукт/дка	Горско стопанство (изчистване разсадници, засадени иглолистни дървета, засадени широколистни дървета) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39		-	

				*Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едно-годишните, а по-високата е за многогодишни те плевели			
271.	ФЕН 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 367-3/21.05.2012 г. Краен срок за предлагане на пазара: 03.04.2014 г. Краен срок за употреба на наличните количества: 03.04.2015 г. Заповед № РД 11-1033 от 03.10.2013г. *Заповедта не е в сила, поради обжалване	240 г/л оксифлуорфен		Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3
			80 мл/дка	Слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите			
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие			
			150 мл/дка	Лозя - внася се вегетационно (април- май) с насочено пръскане			
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
272.	ФИНИ ВГ Брабант Кеми Б.В., Холандия -Удостоверение № 1237-ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 20.06.2024 г.	метсулфурон-метил-200 г/кг		Срещу едногодишни широколистни		пшеница, ечемик, овес, тритикале -90 дни	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик, овес, тритикале и внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12-14 (2-4 лист)			
				Свободни площи внася се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14)			
273.	ФЛУРОСТАР 200 Глобахем н.в., Белгия Разрешение № 1317 – ПРЗ-1/ 01.07.2015 г. Валидно до: 31.12.2022 г	флуороксибир – 200 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели		Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес, Царевица -60 дни	втора професионална
			90 мл/дка	Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес. * Когато се смесва с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да бъде намалена на 70 мл/дка			

			50-70 мл/дка	Царевича * Да не се прилага след 6-ти лист при царевича. * За контрол на многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100 мл/дка, като се раздели на две третирания			
274.	ФОКСТРОТ 69 ЕВ Хеминова -Удостоверение № 518/12.07.2007 г.	69 г/л феноксапроп-П-Етил + Антидот		Срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:	>5000	60	1
			100 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)			
275.	ФОКУС УЛТРА /СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение за № 1006-ПРЗ-1/06.10.2009 г. Валидно до: 30.06.2010 г. Заповеди № РД 09-541/10.08.2007 г. Заповеди №РД 09-457/10.07.2007 г. Заповеди №РД 12-26/30.04.2009 г. Заповеди №РД РД 12-16/16.03.2009 г.	100 г/л циклоксидим+ тензит		Срещу едногодишни житни плевели при:	3940	60	3
			100 мл/дка	Захарно цвекло Соя Фасул Грах Люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) Маслодайна рапица - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			200 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Соя Фасул Грах Люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
				Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при:			
			200 мл/дка с 30-40 л/дка работен	Царевича - циклоксидим толерантна (СТМ) - внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите. Забележка: троскот-умерено чувствителен			

276.	ФОРНЕТ 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД					
277.	ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/ 18.12.2013 г. Валидно до: 28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
278.	ФРОНТИЕР СУПЕР БАСФ СЕ -Удостоверение № 184/10.03.2004 г. (СПЕКТРУМ) -Удостоверение № 360/26.04.2006 г.	720 г/л диметенами д-П		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1480	-	3
			80-140 мл/дка	Царевица Слънчоглед Захарно цвекло Соя Картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
279.	ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК Синджента Разрешение №01016- ПРЗ-2/25.09.2017 г. Валидно до:28.12.2012г. Заповед № 09- 790/28.12.2002г. Заповед № 11- 1846/07.09.2017 г. *Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване на	150 г/л флуазифоп- П-бутил	80 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)		90	непрофесионални
			130 мл/дка	Слънчоглед Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)			
			90 мл/дка	Картофи Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)			
			130 мл/дка	Картофи Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)			

продукта	90 мл/дка	Памук Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	-
	100-130 мл/дка	Памук Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	-
	130 мл/дка	Соя Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	75
	90мл/дка	Соя Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	75
	90мл/дка	Фасул в група варива Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	100 – 130 мл/дка	Фасул в група варива Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	50 – 250 мл/дка	Фасул с шушулки Срещу едногодишни плевели - листно пръскане преди ВВСН 50	28
	50 – 250 мл/дка	Фасул с шушулки Срещу многогодишни плевели - листно пръскане преди ВВСН 50	28
	50 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу самосевки от житни култури – внася се във фаза фаза 3-5 лист на самосевките	90

			90 мл/дка	Тютюн Срещу едногодишни плевели; Многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища – внася се в 3-5 лист (15 – 20 см височина на балура) *Да не се използва за хранителни цели		-	
280.	ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ/ РЕФАЙН ЕКСТРА ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ Разрешение № 0538- ПРЗ-3/16.06.2015 г. Валидно до: 31.12.2016	тифенсулфурон-метил - 333 г/кг трибенурон-метил - 167 г/кг		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:		Не се изисква	непрофесионални
			6,0 г/дка	Мека и твърда зимна пшеница			
			6,0 г/дка	Мека и твърда пролетна пшеница			
			6,0 г/дка	Зимен и пролетен ечемик			
			6,0 г/дка	Зимен и пролетен овес			
			6,0 г/дка	Зимна ръж			
6,0 г/дка	Тритикале						
281.	ХЕМНИКО 24 СК / МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148- 2/12.07.2013г. Валидно до: 27.02.2022г.	240 г/л никосулфурон		Срещу: многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур); едногодишни житни плевели (лисича опашка, едногодишна метлица, райграс и кощрява); едногодишни широколистни плевели (обикн.звездица, абутилон, щир, лепка, пача трева, и див синап)	>2000	-	2
			21 мл/дка	Царевича			
282.	ХЕМТРИБЕ 75 ВГ Хеминова -Удостоверение №01160/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	750 г/кг трибенурон метил		Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди при:	>2000	30	3
			1,5 г/дка	Пшеница Ечемик			
283.	ХЕРБАФЛЕКС Щелер -Удостоверение № 291/06.10.2005 г.	85 г/л бефлбутами д+ 500 г/л изопротурон		Срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	>2000	90	2
			200 мл/дка	Пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата			
284.	ХЕРБОКСОН ТОП Нюфарм -Удостоверение № 0202-ПРЗ- 2/19.07.2011 г. Валидно до:	Второ търговско име на ДИКОПур Ф					

	31.12.2011г.						
285.	ХУСАР МАКС ОД Байер АГ, Германия Разрешение № 523-3/20.12.2017 г. Валидно до: 10.07.2010 г.*** Заповед №РД 09-456/10.07.2007 г. Заповед № РД 11-2618/01.12.2017 г. *** Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяването на продукта	7,5 г/л мезосулфуру н+		Срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес при:	> 5.000	-	3
		7,5 г/л йодосулфуру н+ 22,5 г/л антидот (мефенпир-диетил)	100 мл/дка	Пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата			
286.	ЦЕЛИО ВГ Синджента Кроп Протекшън АГ Разрешение № 01454 – ПРЗ-1/17.11.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-2014/20.10.2016 г.	клодинафоп -пропаргил – 200 г/кг		Едногодишни житни и широколистни плевели	>5000	-	втора професионална
		пироксулам – 75 г/кг клоквинтоце т-мексил (антидот)- 75 г/кг		Пшеница (твърда и мека); ръж; тритикале *Да се прилага в комбинация с адювант на маслена основа			
287.	ЦЕНТУРИОН СУПЕР Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ-3/16.02.2017г. Валидно до: 26.04.2015 г. Заповед № РД 12-20/26.04.2005 г. на Министъра на земеделието и горите, Заповед № РД 11-157/29.01.2016 г. и	Второ търговско име на СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК					

	<p>Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г. Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 07.02.2017 г. на ПРЗ СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК със Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г.</p> <p>-Удостоверение за № 0348-ПРЗ-2/ 08.02.2016г. Заповед № РД 11-157/29.01.2016 г.</p>						
288.	<p>ЦИКЛОП Индустриас Афраза С.А.Испания Разрешение №01450 – ПРЗ-1/20.09.2016г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-1709/14.09.2016 г.</p>	<p>клодинафоп -пропаргил – 95 г/л клоквинтоце т-мексил (антидот) – 25 г/л</p>	<p>63 мл/дка</p>	<p>Срещу едногодишни житни плевели: Пшеница (мека; твърда)</p>		-	втора професионална
289.	<p>ЧИКАРА ДУО ИСК БИОСАЙЪНСИС ЮРЪП Разрешение № 01377 – ПРЗ-2/17.11.2016 г. Валидно до: 31.01.2018 г. Заповед №РД 11-181/03.02.2016 г. Заповед №РД 11-</p>	<p>флазасулфурон 6,7 г/кг + глифозат 288 г/кг</p>	<p>300 гр/дка</p> <p>300 гр/дка</p>	<p>Срещу едногодишни житни и едногодишни/двугодишни широколистни плевели Лозя – винени и десертни сортове: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см) Маслини: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)</p>		<p>Лозя – винени и десертни сортове – 75; Маслини**, Цитрусови култури – 45;</p> <p>** С изключение на маслини, опаднали на</p>	втора професионална

	2013/20.10.2016 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 20.10.2016 г. на ПРЗ с Разрешение № 01377 – ПРЗ-1/15.02.2016г		300 гр/дка	Цитрусови култури: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)		земята	
290.	ШАДОУ Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ-3/16.02.2017г. Валидно до:26.04.2015г.	Второ търговско име на СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК					
291.	ШАРПЕН 33 ЕК ПЕНДИ 33 ЕК/ ПЕНКОТ 33 ЕК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279 – ПРЗ-3/14.02.2017г. Валидно до :31.07.2018г. Разрешение № 01279 – ПРЗ-2/18.11.2105г. Валидно до: 31.07.2017 г. Заповед № РД 11-1981/10.12.2014 г., Заповед №.РД 11-193/03.02.2015 г., Заповед №РД 11-1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11-87/16.01.2017 г Разрешение № 01279 – ПРЗ-1/23.02.2015г	пендиметали н - 330 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		Аспержи -28; Марули, Ендивия, Цикория - 75; Слънчоглед, царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии,	Втора професионална
			360-600 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Царевица - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Фасул - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-600 мл/дка	Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-600 мл/дка	Моркови, ряпа - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			400-600 мл/дка	Аспержи - внася се период на покой			
			360-600 мл/дка	Картофи - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане			
			400-600 мл/дка	Пипер - внася се ССПП или преди разсаждане			
			300-600 мл/дка	Марули - внася се ССПП или преди разсаждане			
			300-600 мл/дка	Ендивия - внася се ССПП или преди разсаждане			

	*категория на употреба непрофесионална.		300-600 мл/дка	Карфиол - внася се преди разсаждане		праскови,нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Триви за семена(AGST E, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение		
			300-500 мл/дка	Цикория - внася се преди разсаждане				
			240 мл/дка	Козя брада - внася се ССПП				
			360 мл/дка	Лупина - внася се ССПП				
			400-600 мл/дка	Памук - внася се ССПП или преди разсаждане				
			280-360 мл/дка	Топола - внася се след разсаждане				
			400-600 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) - В периода на зимен покой				
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши, дюли - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	Кайсии, праскови, нектарини - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	Овощни разсадници - внася се преди или след разсаждане				
			400-600 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза				
			400-600 мл/дка	Фъстъци - внася се ССПП				
			300-730 мл/дка	Декоративни растения и разсадници - внася се преди или след разсаждане				
			210-400 мл/дка	Триви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) - внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)				
292.	ШАРПЕН 40 СК / ПЕНКОТ 40 СК/ ПЕНДИ 40 СК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №	пендиметал ин – 400 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели:		Аспержи -28; Марули, Ендивия, Цикория - 75; Слънчоглед, царевица,	Втора професионална	
			300-500 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)				
			300-500 мл/дка	Царевица - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)				

01280–ПРЗ - 2/18.11.2015г Валидно до: 31.07.2017 г. *Гратисен период за продажба 6 месеца и още 1 година за употреба, считано от 06.11.2015 г. ШАРПЕН 40 СК *категория на употреба непрофесионална Разрешение № 01280–ПРЗ- 1/30.01.2015г		300-500 мл/дка	Фасул - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Триви за семена(AGST E, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS,
		250-500 мл/дка	Соя - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		300-500 мл/дка	Грах (за консервиране) - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		300-500 мл/дка	Нахут - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		250-500 мл/дка	Моркови - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		250-500 мл/дка	Ряпа - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		330-500 мл/дка	Аспержи - внася се период на покой	
		300-500 мл/дка	Картофи - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)	
		300-500 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане	
		330-500 мл/дка	Пипер - внася се ССПП или преди разсаждане	
		250-500 мл/дка	Марули - внася се ССПП или преди разсаждане	
		250-500 мл/дка	Ендивия - внася се ССПП или преди разсаждане	
		250-500 мл/дка	Карфиол - внася се преди разсаждане	
		250-410 мл/дка	Цикория - внася се преди разсаждане	
		200 мл/дка	Козя брада - внася се ССПП	
		300 мл/дка	Лупина - внася се ССПП	
		330-500 мл/дка	Памук - внася се ССПП или преди разсаждане	
		230-300 мл/дка	Топола - внася се след разсаждане	
		330-500 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) - внася се в периода на зимен покой	
300-500 мл/дка	Ябълки, круши - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
300-500 мл/дка	Кайсии, праскови,нектарини - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
330-500 мл/дка	Овощни разсадници - внася се преди или			

				след разсаждане		PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			330-500 мл/дка	Фъстъци - внася се ССПП			
			250-600 мл/дка	Декоративни растения и разсадници - внася се преди или след разсаждане			
			170-330 мл/дка	Трeви за семена – (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) - внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)			
293.	ШОГУН 100 ЕК АДАМА КУЕНА Н.В., Кюракао Разрешение №01093 – ПРЗ*- 3/28.04.2016 г. Валидно до: 30.11.2020 г. -Удостоверение № 01093-ПРЗ/ 12.05.2010 г.	Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК					
294.	ЯСТРЕБ ПЛЮС Монсанто Европа С.А./Н.В, Белгия Разрешение №01511 – ПРЗ – 1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед № РД 11- 2120/19.10.2017 г.	Глифозат 360 г/л	300 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба на културите *Вода л/дка – 10 л /дка	-	30	Непрофесионална
			300 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба на културите *Вода л/дка – 10-20 л /дка		30	

			400 мл/дка	Слънчоглед Като десикант – внася се във фаза ВВСН 87 (физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80 сухо вещество) Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, *Вода л/дка – 10 л /дка		30	
			400-1200 мл/дка	Овощни градини, стърнища Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15-20 л /дка		-	
			400-1200 мл/дка	Лозя Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внасят се във фаза ВВСН 19-65 (девет и повече листа отворени до масов цъфтеж: 50% отпадане на ресите). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка		-	
			400-1200 мл/дка	Свободни площи Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка		-	
			1200 мл/дка	ЖП линии Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка		-	
			440 мл/дка	Зимна пшеница Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели- внася се във фаза		-	

				ВВСН 83-85 (ранна восъчна зрялост до восъчна зрелост: меко тесто). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)			
--	--	--	--	--	--	--	--