

НЕМАТОЦИДИ

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	ЛД 50 орал но за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за употреба
1.	АФРОМИЛ Индустриас Афраса, С.А., Испания Разрешение № 01428 –ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед № РД 11- 1307/19.07.2016 г	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване * Брой мин/макс приложения – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) – 20	-	21	първа професион ална
			1 л/ дка	Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Срещу нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. Внася се непосредствено след засаждане/ разсаждане, чрез капково напояване * Брой мин/макс приложения – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) – 20			
2.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт – Белгия Удостоверение № 0144/02.02.2004 г. Валидно до: 19.12.2013 г. Заповед № РД 09- 869/19.12.2003 г.	дазомет - 98 %	50-70 кг/дка	Галови нематоди (<i>Pod. Meloidogyne</i>) по оранжерийни домати – внася се 40-50 дни преди разсаждане	520	45-50 дни при почвена влага 70- 80 % от ППВ	първа професион ална
3.	ВЕЛУМ ПРАЙМ Байер АГ, Германия Разрешение № 01379– ПРЗ – 2/20.12.2017 г. Валидно до: 31.05.2025 г. Заповед № РД 11- 213/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 2621/01.12.2017 г.	флуопирам – 400 г/л	37,5-62,5мл/дка	Домати, патладжан, пипер, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква Срещу галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica, Meloidogyne hapla</i>) - внася се преди или след разсаждане * Брой мин/макс приложение 2 броя I-во: 1-3 дни преди или след разсаждане II-ро: 15-30 дни след разсаждане * Интервал между приложенията (мин) - 15-	-	1 ден при тиквички, краставиц и, корнишон и 3 дни за домати, патладжан , пипер, пъпеш, диня,	непрофеси онална

				<p>30 дни</p> <p>* Вода л/дка мин/макс - 200-600 л/дка</p> <p>* По-ниската доза да се прилага при слабо до средно нападение от нематоди.</p> <p>- Продукта има и фунгицидно действие срещу брашнеста мана при домати, пипер, патладжан, краставици, корнишони, тиквички, пъпеш, диня, тиква</p>		тиква	
4.	<p>ВИДЕЙТ 10 Г</p> <p>ДюПон Интернешънъл</p> <p>Оперейшънс</p> <p>Удостоверение № 0572 – ПРЗ – 3/25.10.2013 г.</p> <p>Валидно до: 25.01.2023 г.</p> <p>Заповед №РД 12-62/29.12.2006 г.</p> <p>Заповед №РД 11-93/25.01.2013г.</p> <p>Заповед №РД 11-1085/14.10.2013г.</p>	оксамил – 100 г/кг	<p>30 кг/х</p> <p>45-55 кг/ха</p> <p>40 кг/ха</p> <p>40-55 кг/ха</p> <p>30 кг/ха</p> <p>45-55 кг/х</p> <p>30 кг/ха</p> <p>42,5-55 кг/х</p>	<p>Нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по моркови в доза 25 кг/ха. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по патладжан. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Globodera pallida</i>) по картофи (ранни). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Цистообразуващи нематоди (<i>Globodera rostochiensis</i>, <i>Globodera pallida</i>) по картофи (основна култура). Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по домати. Прилага се при засаждане (браздово).</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн. Прилага се при засаждане (браздово)</p> <p>Галови нематоди (<i>Meloidogyne incognita</i>) по тютюн. Прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата.</p>	-	<p>75 дни за моркови;</p> <p>84 дни за картофи; за патладжан и, тютюн и домати не се налага</p>	първа професионална

			20 кг/ха	*Техника на приложение: трактор с апликатор Максимален брой приложения: 1 Телени червей (<i>Agriots spp.</i>) по картофи . Прилага се при засаждане (браздово) Техника на приложение: наземна техника Максимален брой приложения: 1				
5.	НЕМАСОЛ 510 Таминко – Белгия Удостоверение № 0363/08.06.2006 г. Валидно до: 29.12.2015 г. Заповед № РД 09-719/29.12.2005 г.	метам содиум - 510 г/л	80-100 л/дка	Галови нематоди (<i>Meloidogyne arenaria</i>), почвени патогени: Фузариум (<i>Fusarium oxisporum.</i>), вертицилиум (<i>Verticillium dahliae</i>), корки рут (<i>Pyrenochaeta lycopersici</i>), Питиум (<i>Pithium debarianum</i>), Ризоктония (<i>Rhizoctonia solani</i>), Склеротиния (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвените патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен.	-	-	първа професионална	
6.	НЕМАТОРИН Г Ишихара Сангио Каиша ООД – Япония Разрешение № 01117 – ПРЗ – 3/30.10.2017 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед № РД 12-3/18.01.2011 г. Заповед № РД 11-2026/20.10.2016 г. Заповед №РД 11-2065/17.10.2017 г. *Гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от	фостиазат - 100 г/кг	3 кг/дка;	Домати Срещу галообразуващи нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>)	-	-	втора професионална	
			1,5 кг/дка	Картофи Срещу картофена цистообразуваща нематода (<i>Heterodera rostochinensis</i>) Да не се прилага при сортове картофи с вегетационен период под 120 дни.				120
			2 кг/дка	Картофи Срещу телени червей (<i>Elateridae spp.</i>) – внося се по време на засаждане				120

	продукта за растителна защита НЕМАТОРИН Г, считано от 17.10.2017 г.						
7.	ОЛРЕДИ Лаинко, С.А., Испания Удостоверение № 01429 – ПРЗ – 1/03.08.2016 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед №РД 11-1308/19.07.2016 г.	оксамил – 100 г/л	1 л/ дка	Домати, Патладжан, Пипер, Растения от сем. Тиквови с ядлива кора Нематоди от рода <i>Meloidogyne</i> spp. и <i>Ditylenchus</i> spp. – продукта се внася непосредствено след засаждане/ разсаждане * Брой мин/макс – 1-3 * Интервал между приложенията (мин) - 20	-	21	първа професионална
8.	МОКАП 10 Г Байер Кропсайанс – Германия Удостоверение № 0286/04.02.2005 г. Валидно до: 04.02.2005 г Заповед № РД 09-665/09.12.2004 г.	етопрофос - 100 г/кг	4 кг/дка 5-8 кг/дка 15-20 кг/дка	Срещу Телени червеи (<i>Сем. Elateridae</i>) Срещу галови нематоди (<i>Под. Meloidogyne ssp.</i>) Срещу галови нематоди (<i>Под. Meloidogyne ssp.</i>)		14	първа професионална
9.	РЕЙСАН 51 Лайнко – Испания Удостоверение № 0524/12.07.2007 г. Валидно до: 10.07.2010 г. Заповед № РД 09-456/10.07.2007 г.	метам содиум - 420 г/л	100 л/дка	Галови нематоди при оранжерийни култури (<i>Meloidogyne arenaria</i>)	-	-	първа професионална