

Х Е Р Б И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	ЛД 50 орал но за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за упот-реба
1.	АГРОКСОН НюФарм ООД - Великобритания Удостоверение № 0551- ПРЗ- 3/19.03.2018 г. Валидно до : 31.12.2011 г.*	500 г/л МЦПА	200 мл/дка	Срещу широколистни плевели при: Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	700	-	втора професио нална
2.	АДЕНГО 465 СК Байер КропСайанс АГ - Германия Удостоверение № 01171-ПРЗ - 2/28.08.2013 г. Валидно до: 30.04.2015 г. * Заповед №РД 11- 180/18.02.2013 г. Заповед № РД 11- 839/05.08.2013 г.	225 г/л изоксафлугол + 90 г/л тиенкарбазон – метил + 150 г/л ципросулфамид (антидот)	35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно)	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена при: Царевича (зърно и силаж) Момент на приложение: фаза на културата (преди поникване) - ВВСН 00-07 или фаза на културата (ранно вегетационно) до фаза 3-ти лист на културата (ВВСН 09-13) и фаза на развитие на плевелите 2-3 лист.	> 5.000	-	първа професио нална
3.	АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК	100 г/л пропаквизафоп		Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища:	>5000	Домати, лук – 30; Захарно	втора професио

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	<p>АДАМА КУЕНА Н.В., Кюракао</p> <p>Разрешение №01093 – ПРЗ- 4/05.02.2018 г. Валидно до: 30.11.2022 г. Заповед №РД 11- 1508/02.10.2015 г. и Заповед №РД 11- 613/19.04.2016 г. Заповед №РД 11- 133/18.01.2018 г.</p>		<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка 75-120 мл/дка</p>	<p>Домати, лук, захарно цвекло, памук: внося се във фаза Внося се след ВВСН 11 Домати – първи същински лист на основното стъбло Лук – първи лист ясно видим Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени Памук – първи същински лист разтворен ◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60</p>		<p>цвекло -45; Памук – 90; Соя, Слънчоглед, Маслодайна рапица, - 90; Лозя – 30; Картофи -40; Тютюн – 40, Леща – 50; Моркови, магданоз – корен, спанак – 30; Патладжан, чесън, броколи – 30, Варива (фасул, грах, бакла нахут) – 50, Пресни (фасул, грах)- 40, Лен – 90; Копър-30;</p>	нална
			75-120 мл/дка	<p>Соя:внося се след ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60</p>			
			80 мл/дка	Слънчоглед: внося се след ВВСН 11			

				<p>котиледоните са напълно разтворени</p> <p>Срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>и</p> <p>срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			
			<p>◆ 50 мл/дка</p> <p>◆◆ 75-120 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>Маслодайна рапица: След ВВСН 11 разтворен първи лист</p> <p>◆ срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките</p> <p>◆◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆◆</p> <p>срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см</p> <p>◆◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			
			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>*Допълнителна употреба</p> <p>Лозя : ВВСН 00-85 покой – омокване на зърната</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			
				<p>*Допълнителна употреба</p>			

			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 150 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>Картофи: След ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			
			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p><u>Допълнителна употреба</u></p> <p>Тютюн, леща: След ВВСН 11. Тютюн – първи същински лист на основното стъбло. Леща – разлистен първи лист</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			
			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 150 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p><u>Минимални употреби</u></p> <p>Моркови, магданоз – корен, спанак: Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60</p>			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка</p>	<p>*Минимални употреби Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове: След ВВСН 11.Патладжан – първи същински лист на основното стъбло.Чесън – първи лист ясно видим.Броколи –разтворен първи същински лист.Фасул – развитие на първите листа.Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче.Бакла, нахут -разлистен първи лист.Лен –първи същински лист разтворен.Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60</p>			
			<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка</p>	<p>*Минимални употреби Копър: След ВВСН 11 първи същински лист разтворен</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60</p>			
4.	АКАМОС 500	метобромурон -	400 мл/дка	Каргофи	-	-	втора

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Фитюръп С.А., Франция Разрешение №01545- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 31.12.2025 г. Заповед № РД 11- 145/18.01.2018 г.	500 г/л		Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 Период на покой, клубените не покълват-поникване: стъблата излизат над почвената повърхност *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка			професионална
5.	АКРИС БАСФ СЕ, Германия Разрешение №01474 – ПРЗ-1/18.04.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11-710/06.04.2017 г.	диметенамид-П 280 г/л тербутилазин 250 г/л	200-300 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Царевица *Прилага се във фаза ВВСН 00 -16 (След сеитба преди поникване - след поникване до 6 лист на културата)	> 300 - < 500	-	втора професионална
6.	АКСИАЛ 050 ЕК Синджента Разрешение № 01075-5/ 09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. * Заповед №РД 11-1367/25.07.2016 г.	50 г/л пиноксаден		Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при:	2000	-	втора професионална (2)
			60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите			
7.	АКСИАЛ ЕДНО Синджента -Разрешение № 01121-5 / 09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. * Заповед №РД 11-1368/25.07.2016 г.	45 г/л пиноксаден+ 5 г/л флорасулам		Срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:	5000	-	непрофесионална (3)
			100 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	Пшеница и ечемик - внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели			
8.	АКТИВУС Адама Аган, Израел Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. *	Второ търговско име на ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

9.	АКУРАТ 20 ВГ Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01396 – ПРЗ*-1/ 10.05.2016 г. Валидно до : 30.06.2017 г. * Заповед №РД 11- 683/22.04.2016 г.	метсулфурон-метил 200 гр./кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:	5000	Пшеница, Ечемик, Зимна ръж, Тритикале-90; Свободни площи - 120*Срок на пускане на паша на селскостопански животни след приложение	втора професионална
			1,5 гр./дка	Пшеница (мека и твърда): Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
			1,5 гр./дка	Ечемик (зимен и пролетен): Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
			1,5 гр./дка	Зимна ръж: Внася се във фаза ВВСН 13-19 (три листа разтворени - 9 или повече разтворени листа)			
			3 гр./дка	Внася се във фаза ВВСН 20-39 (само главното стъбло-флаговият лист е напълно разтворен)			
	Ограничаване на растежа и образуването на семена при плевелите						
	2 гр./дка	Свободни площи *Срок на пускане на паша на селскостопански животни след приложение - 120 дни					
10.	АКУРАТ 60 ВГ Хеминова Удостоверение № 0359/26.04.2006г. Валидно до:	600 г/кг метсулфурон - метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:	5000	-	3
			1 г/дка	Пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата.			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	13.04.2009 г. *			Забележка: В предложената доза продуктът не контролира лепка и паламида			
11.	АКУРАТ ЕКСТРА ВГ Хеминова Агро Франция С.А.С Удостоверение № 1243-ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 31.12.2016г. *	680 г/кг тифенсулфурон метил 70 г/кг метсулфурон метил		Едногодишни широколистни плевели:		-	2
			5 г/дка	Пшеница Ечемик *да не се прилага при хлебна пшеница, както и при пивоварен ечемик и ечемик за семе			
12.	АКЦЕНТ 75 РХ ДюПон Де Немур САС Разрешение № 01220- ПРЗ-2 /19.03.2015 г. Валидно до: 29.01.2024 г. Заповед №РД 11- 263/13.02.2015г.	750 г/кг никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей) и някои широколистни плевели		-	непрофесионална (3)
			7 г/дка + 0,1% Тренд 90	Царевича: внося се във фаза: 2-8 лист на културата (ВВСН 12-18) 1-3 лист на едногодишните житни плевели (ВВСН 11-13), височина на балура 15-25 см и пирея (ВВСН 21-23), 2-4 лист на широколистните плевели (ВВСН 12-14) и 4-6 лист на паламидата (ВВСН 14-16)			
13.	АЛАЙ МАКС/ ПОЙНТЕР УЛТРА ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 01058- ПРЗ-3/12.03.2018 г. Валидно до: 05.03.2020 г. Заповед №РД 11- 394/01.03.2018 г.	143 г/кг метсулфурон- метил+ 143 г/кг трибенурон- метил		Срещу широколистни плевели при:	5000	-	3
			3,5 г/дка с 30-40 л/дка работен разтвор	Пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културите			
14.	АЛИАНС ВГ / ПОЛИМЕР ВГ Ню Фарм С.А.С. -Разрешение № 1186- ПРЗ-2/04.07.2016 г.. Валидно до: 31.12.2018 г. * Заповед №РД 11- 1050/14.06.2016 г.	дифлуфеникан 600 г/кг + метсулфурон метил 60 г/кг	7,5 г/дка	Срещу широколистни плевели при: Ечемик Твърда пшеница Мека пшеница Ръж Тритикале *Момент на приложение(фаза на приложение):ВВСН 32 (до втори възел)		-	втора професионална (2)

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

15.	АЛКАНС СИНК ТЕК ФМС Кемикъл Спрл, Белгия Разрешение № 01350 – ПРЗ-2/07.09.2017г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 1859/11.12.2015 г. Заповед №РД 11- 1673/10.08.2017 г.	кломазон – 43 г/л пендиметалин – 298 г/л	250 мл/ дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели: Картофи (с изключение на картофи, отглеждани за посадъчен материал): Внася се във фаза ВВСН 00-10 (от засяване до фаза първите листенца започват да нарастват) *Вода литра/дка - 20-60 л/дка *Брой Мин/макс приложения -1		-	втора професионална
16.	АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ Мактешим Аган Агро Полша Удостоверение № 01019-ПРЗ-2/ 10.08.2010 г. Валидно до: 28.12.2012 г. *	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
17.	АРАТ БАСФ СЕ -Разрешение № 332-ПРЗ-2/ 21.01.2016 г. Валидно до: 30.11.2019 г. Заповед №РД 11- 08/07.01.2016 г.	500 г/л дикамба+ 250 г/л тритосулфурон		Срещу широколистни плевели:	5000 1700	-	втора професионална
			10-20 г/дка	Пшеница, ечемик Прилага се във фаза ВВСН 13-29 (разтворени 3 листа-край на братенето) *Може да се прилага с адювант ДЕС-50 мл/ дка			
			20 г/дка + ДЕШ-100 мл/дка	Царевича: Прилага се във фаза ВВСН 12-16 (разтваряне на 2-ри лист-разтваряне на 6-ти лист) * Да не се използва при сладка царевича			
18.	АРИГО ВГ Дю Пон	мезотрион 360 г/кг		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална

	Интернешънъл Оперейшънс САРЛ, Швейцария Разрешение №01455 – ПРЗ- 1/17.11.2016 г. Валидно до: 31.07.2018 г. * Заповед №РД 11- 2015/20.10.2016 г	никосулфурон 120 г/кг римсулфурон 30 г/кг	33 г/дка +0,1% Тренд 90	Царевича (за зърно и силаж) *Приложение: От 2ри до 8ми лист на царевичата (ВВСН 12-18), 1 - 3 лист на житните и 2 - 4 лист на широколистните плевели			нална
19.	АРКАДА 880 ЕК Синджента -Удостоверение №01257 – ПРЗ -3 / 16.09.2015 г. Валидно до: 03.07.2024 г.	800 г/л просулфокараб 80 г/л метрибузин	400-500 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели при: Картофи: Приложение: фаза ВВСН 00-10 (след засаждане, преди поникване на културата до височина на стъблото 5 см.)	>2000	Не се изисква	Непрофесионална
20.	АСТРАЛ 4 СК НюФарм САС Разрешение № 01055- ПРЗ-3/04.07.2016г. Заповед №РД 11- 1049/14.06.2016 г.	Второ търговско име на СИРИО 4 СК					
21.	АУРА БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01397 – ПРЗ-1/ 10.05.2016 г. Валидно до: 31.07.2022 г. Заповед №РД 11- 686/22.04.2016 г.	профоксидим 200 г/л	40 мл/дка 50 мл/дка 60-80 мл/дка 100 мл/дка	Кокошо просо (<i>Echinochloa crus galli</i>), Дараджан (<i>Echinochloa oryzoides</i>), Диво просо (<i>Echinochloa colonum</i>), Есенно просо (<i>Panicum dichotomiflorum</i>) Ориз (пресушено поле) Внася се във фаза ВВСН 14-15 (4-5 листа на културата) Внася се във фаза ВВСН 21-23 (начало на братене: видим първи брат – забележими три братя) Внася се във фаза ВВСН 23-29 (забележими три братя – видими максимален брой братя) Внася се във фаза ВВСН 29 (край на братене, максимален брой братя) * Използва се с адюванта Деш ХЦ в концентрация 0,2-0,25%		-	втора професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

22.	АФАЛОН 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 241/22.12.2004 г. Валидно до: 31.12.2011 г. *	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			100-150 мл/дка	Лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите			
			300 мл/дка	Слънчоглед			
			300-400 мл/дка	Соя Внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед			
23.	АЧИБА 5 ЕК Нисан кемикъл Разрешение № 01054-ПРЗ-2 /17.11.2016 г. Заповед №РД 11.- 2020/20.10.2016 г	Второ търговско име наТАРГА СУПЕР 5 ЕК					
24.	БАЗАГРАН 480 СЛ БАСФ СЕ Разрешение № 512-4/13.08.2014 г. Валидно до: 10.08.2010 г. *	480 г/л бентазон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>1000	56дни за картофи и 30 дни за всички останали култури	3
			100-150 мл/дка	Градински грах за семепроизводство			
			180 мл/дка	Копър Резене Хизоп			
			200 мл/дка	Лук Чесън Картофи			
			200 мл/дка	Фасул и грах - полско производство Соя Лен			
25.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт Удостоверение № 144/05.02.2004 г. Валидно до: 19.12.2013 г. *	980 г/кг дазомет		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	520	-	1
			10-20 г/кв.м.	Тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен			
26.	БАСТА 15 СЛ Байер КропСайанс Германия -Удостоверение № 563 –ПРЗ - 2/29.01.2014 г	150 г/л глюфозинат амониум		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	1.730	14	3
			500 мл/дка	Овощни градини и лозя - внася се само редово в активна вегетация на плевелите			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Валидно до: 29.12.2009 г* Заповед №РД 12-61/29.12.2006г.						
27.	БАТЪЛ ДЕЛТА Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01526-ПРЗ-1/19.12.2017 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11-2652/06.12.2017 г. Заповед №РД 11-728/24.04.2018 г.	флуфенасет - 400 г/л дифлуфеникан - 200 г/л	60 мл продукт/дка	Пшеница, ечемик, ръж, тритикале Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-13 (сухо семе-разтворени 3 листа) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	-	-	втора професионална
28.	БЕЛВЕДЕРЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01297–ПРЗ-1 /19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	десмедифам – 160 г/л фенмедифам – 160 г/л		Срещу широколистни плевели		90	непрофесионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло * Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение: 1. ВВСН 10 (видими първи листа) 2. ВВСН 12 (първи чифт листа) 3. ВВСН 14 (втори чифт листа) Максимална доза – 300 мл/дка за година			
29.	БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01296–ПРЗ-1 / 19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	фенмедифам – 100 г/л десмедифам – 100 г/л етофумезат – 200 г/л		Срещу широколистни плевели:		90	непрофесионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло *Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение ВВСН 10 -14 (котиледоните са хоризонтално разтворени – втори чифт листа); Максимална доза – 300 мл/дка за година			

30.	БЕЛУКА Белхим Кроп Протекшън НВ/СА Разрешение № 01573- ПРЗ-1/19.03.2018 г. Валидно до: 31.08.2021 г. Заповед №РД 11- 460/15.03.2018 г.	нонанова (пеларгонова) киселина - 680 г/л	1.2-1.6 л продукт /дка	Лозя (насаждения над 4 години) Срещу Едногодишни и двугодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-77 (покой: зимните пъпки са заострени до закръглени, светло до тъмнокафяви в зависимост от сорта; люспите на пъпките са повече или по-малко затворени в зависимост от сорта - зърната започват да се събират, грозда се затваря) При наличие на плевели *Брой мин/макс приложения – 1-2 *Интервал между приложенията – 5-15 *Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с листата на културата	-	1	непрофесионална
			0.9-1.6 л продукт /дка	Лозя (насаждения над 4 години) Отстраняване (десикация) на филизи – внася се във фаза ВВСН 11-65 (първият лист е отворен и се разстила настрани от летораста - масов цъфтеж: 50 % опадане на ресите) *Брой мин/макс приложения – 1-3 *Интервал между приложенията – 15-21 *Вода л/дка мин/макс – 15-20 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА: Да се избягва контакт с неприцелни на третирането летораста/листа .С нарастването на летораста намалява ефикасността на ПРЗ.	-	1	
			1.2-1.6 л продукт /дка	Картофи Срещу Десикация (премахване на листната маса и стъблата) – внася се във фаза ВВСН 81-91 (плодовете от първото плодообразуванеса все още зелени, семената-светло оцветени (главно стъбло) - начало на пожълтяване на листата) *Брой мин/макс приложения – 1 *Интервал между приложенията – 15-21 *Вода л/дка мин/макс – 15-30 л/дка ЗАБЕЛЕЖКА:Приложение се извършва от 1 до 5 дни след механично надробяване	-	1	
31.	БЕЛУРЕ – Т			Срещу едногодишни широколистни	-	-	непрофес

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Пробелте, С.А., Испания Разрешение № 01406 – ПРЗ -1/ 09.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11- 611/19.04.2016 г.			плевели: Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж			ионална
32.	БИАТЛОН 4Д БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01312 – ПРЗ- 1/16.0.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г. *	флорасулам – 54 г/кг тритосулфурон – 714 г/кг		Срещу едногодишни и някои многогодишни широколистни плевели	>300 - >2000	Неприложимо	втора професио нална
			4 -5,5 г/дка	Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале			
			4 -5,5 г/дка + 100 мл/дка адювант ДЕС	Пшеница, есенен и пролетен ечемик, ръж, овес, тритикале			
33.	БИСМАРК КС Оксон Италия С.п.А Разрешение №01419 – ПРЗ- 2/14.02.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. * Заповед № РД 11- 946/31.05.2016 г. и Заповед №РД 11- 171/24.01.2017 г.	кломазон - 55 г/л пендиметалин - 275 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професио нална
			200-250 мл/дка	Памук * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			250-300 мл/дка	Тютюн * Преди разсаждане			
			120-150 мл/дка	Рапица * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			200-300 мл/ дка	Аспержи * След беритба, преди показване на новите стъбла над почвата ВВСН 49-59			
			150-200 мл/дка	Резене * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05 Преди разсаждане			
			150-200 мл/дка	Кориандър * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05			
			200-300 мл/дка	Ориз (засят на сухо) * След сеитба преди поникване ВВСН 00-05			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			150-200 мл/дка	Царевича * Преди поникване, рано след поникване ВВСН 00-12				
			200-250 мл/дка	Соя * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
			150-200 мл/дка	Фасул, Грах, Бакла * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
			150-200 мл/дка	Картофи *Преди поникване След загърляне ВВСН 00-10				
			150-200 мл/дка	Моркови * След сеитба, преди поникване ВВСН 00-05				
34.	БИТЪП КОМПАКТ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 71/21.07.2003 г. Валидо до: 28.12.2012 г.*	82,5 г/л фенмедифам+ 82,5 г/л десмедифам		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>2000	30	3	
			600 мл/дка	Захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите				
			300+300 мл/дка	Захарно цвекло - внася се двукратно: I-во трети-ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото				
35.	БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г	Второ търговско име на СУЛТАН 500 СК						
36.	БРАСАН 540 ЕК Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение № 01346 – ПРЗ-2/ 07.06.2016г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11-	диметахлор – 500 г/л кломазон – 40 г/л	200 мл/дка	Зимна маслодайна рапица: Едногодишни широколистни и някои житни плевели След сеитба, преди поникване на културата ВВСН 00 * На една и съща площ, продуктът може да се прилага веднъж на три години	1911	-	втора професионална	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	1651/06.11.2015 г.; Заповед №РД 11-932/30.05.2016 г.						
37.	БЕФЛЕКС Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01369 – ПРЗ-1/21.01.2016г. Валидно до: 31.07.2019 г.	бефлубутамид – 500 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	втора професионална
			50 мл./ дка	Пшеница Ечемик Прилага се във фаза ВВСН 00-13			
38.	БУГУИС Проплан Планта Протекшън Ко. С.Л., Испания Разрешение № 01451 – ПРЗ* - 1/20.09.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-1711/14.09.2016 г.	клодинафоп- пропаргил – 95 г/л клоквинтоцет- мексил (антидот) – 25 г/л		Срещу едногодишни житни плевели:		-	втора професионална
			63 мл/дка	Пшеница(мека; твърда)			
39.	БУЗИН Шарда Кропкем Лтд, Индия / Sharda Cropchem Ltd, India Разрешение №01564- ПРЗ-1/14.03.2018 г. Валидно до : 31.07.2019 г. Заповед №РД 11-425/09.03.2018 г.	метрибузин 700 г/кг	75 г/дка	Картофи Срещу широколистни и някои житни плевели – внася се във фаза след засаждане, преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	-	-	Втора професионална
40.	БУЛПЕН 40 СК Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение№01280 –ПРЗ-5/05.02.2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г.	Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК					
41.	БУТИЗАН 400 СК БАСФ СЕ	400 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели	500 - < 2.000	70	1

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	-Удостоверение № 01068-2/04.09.2013 г. Валидно до: 05.02.2014 г. * Заповед № РД 12-3/03.01.2008 г. Заповед № РД 12-26/05.03.2010 г.		250 мл/дка	Зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите Зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване Рапица - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
42.	БУТИЗАН S БАСФ СЕ -Удостоверение № 01069-2/04.09.2013 г. Валидно до: 05.02.2014 г.*	500 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:	500 - < 2.000	70	1
			200 мл/дка	Зеле - внася се 8-10 дни след разсаждане Фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
43.	БУТИЗАН МАКС БАСФ СЕ -Удостоверение № 01258-ПРЗ/ 29.07.2014 г. Валидно до: 03.07.2024 г.	200 г/л метазахлор 200 г/л диметенамид-П 100 г/л квинмерак		Едногодишни житни и широколистни плевели при	> 2.000	70	1
			200-250 мл/дка	Маслодайна рапица: приложение: след сеитба, преди поникване на културата - ВВСН 00-06			
			250 мл/дка	Маслодайна рапица: приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14)			
44.	БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ Байер КропСайънс АГ, Германия -Удостоверение № 01221 – ПРЗ/28.01.2014г. Валидно до: 31.12.2016 г. * Заповед №РД 11-86/28.01.2014г.	бромоксинил октаноат /хептаноат- 400,8 г/л (съответстващо на бромоксинил- 280 г/л) 2,4 Д етилхексилесте р-422,1 г/л (еквивалентно на 2,4 Д - 280г/л)		срещу широколистни плевели:		-	втора професионална
			100мл/дка	Пшеница, ечемик, овес, ръж: Прилага се във фенофаза на културата ВВСН 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най-малко на 2см над първия възел)			
			80мл/дка	Царевица, сорго: Прилага се във фенофаза ВВСН 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

45.	ВАЛСАГЛИФ Стоктон Кемикъл Удостоверение № 153/04.01.2005 г. Валидно до: 28.12.2011 г. *	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	>2000	30	3
			600 мл/дка	Лозя - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина) *Заб.: прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор			
46.	ВАЛСАМИН Стоктон Кемикъл -Удостоверение № 154/04.01.2005 г. Валидно до: *	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	1200	-	3
			150 мл/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата			
47.	ВЕНТУМ ВГ Байер КропСайанс - Германия -Удостоверение № 01023-ПРЗ-1/ 05.02.2010 г. Валидно до : 10.08.2010 г. * Заповед № РД 12- 19/10.08.2007 г Заповед №РД 12- 56/14.08.2009 г.	300 г/кг форамсулфурон + 10 г/кг йодосулфурон- метил-натрий+ антидот - 300 г/кг		Срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при:	4.300	-	3
			10-15 г/дка+ 200 мл/дка Меро (прилепител)	Царевича – внася се вегетационно във фаза от 2-ри до 6-ти лист на царевичата. Във фаза от котиледони до 6-ти лист на едногодишните широколистни плевели, 3-4 лист на едногодишните житни плевели и при височина на балура от семе и коренища 15 - 25 см			
48.	ВИКТУС 4 СК /КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0574/14.10.2008 г. Валидо до:*	43 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при:	>5000	-	3
			125 мл/дка	Царевича - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели			
49.	ВИКТУС ОД ДюПон ИО САРЛ, Швейцария Разрешение № 0577 – ПРЗ-3/ 14.12.2016. Валидно до: 31.12.2019 г.			Второ търговско име на КЕЛВИН ОД			
50.	ГАЛАКСИЯ СЛ Индустриас Афраза С.А., Испания Разрешение № 01282 –	МЦПА – 180 г/л глифозат – 180		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		ябълки, круши и цитрусови	втора професио нална
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши и цитрусови култури:			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	ПРЗ-1 / 30.01.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г. *	г/л		Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято		култури, маслини - 15 дни	
			400-600 мл/дка	Маслини: Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен			
51.	ГАЛЕРА СУПЕР Дау Агросайансис С.А.С. -Удостоверение № 1246-ПРЗ /27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2017г. *	240 г/л – клопиралид + + 80 г/л – пиклорам + 40 г/л аминопиралид	20 мл/дка	Срещу широколистни плевели при: Зимна маслодайна рапица; Пролетна маслодайна рапица; Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата *На една и съща площ да се използва веднъж на 3 години		-	3
52.	ГАЛИГАН 240 ЕК / ОКСИГАН 240 ЕК Аган Кемикъл Удостоверение № 278-ПРЗ- 2/31.07.2012г. Заповед № РД 11- 368/28.02.2018 г. Краен срок за продажба и разпространение до 21 април 2018 г. и краен срок за съхранение и употреба до 21 юни 2018 г. на съществуващите наличности от продукта за растителна защита Галиган 240 ЕК / Оксиган 240 ЕК	240 г/л оксифлуорфен		Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	-	3
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			150 мл/дка	Лук II-ра год. - внася се трикратно			
				(50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			

53.	ГАЛЪП СУПЕР 360 Barclay Chemicals Manufacturing Ltd./ Баркли Кемикалс Манифакчъринг Лтд., Ирландия Разрешение №01565- ПРЗ-1/14.03.2018 г. Валидно до: 15.12.2018 г. Заповед № РД 11- 426/09.03.2018 г.	глифозат 360 г/л	150-1200 мл/дка	Семкови овощни видове (ябълки, круши), лозя, орех, лешник, маслини *(1) Срещу едногодишни житни и широколистни и многогодишни плевели – внася се във фаза Плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка *Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите		7 (маслини)	Втора професионална
			150-1200 мл/дка	Костилкови овощни видове (праскови, кайсии, нектарини, череша, сливи, бадеми) (преди засаждане) Срещу едногодишни житни и широколистни и многогодишни плевели – внася се при плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка *Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите		-	
			150-1200 мл/дка	Цветни и декоративни дървета, дървесни видове, гори, топови разсадници, лехи** (2) Срещу едногодишни житни и широколистни и многогодишни плевели – внася се преди сеитба, засаждане, разсаждане, след прибиране или в края на вегетацията в разсадниците *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка *Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите			
			150-1200 мл/дка	Неземделски площи: ж.п. линии, канавки и канални диги, индустриални и строителни обекти, крайпътни площи Срещу едногодишни житни и широколистни и многогодишни плевели – внася се при плевели в активна вегетация. *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка *Дозите се прилагат в зависимост от вида на	-	-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				плевелит			
			150-1200 мл/дка	Третиране на площи преди сеитба или разсаждане ****(4) Срещу едногодишни житни и широколистни и многогодишни плевели – внася се при плевели в активна вегетация. *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-30 л/дка *Дозите се прилагат в зависимост от вида на плевелите			

				<p><u>Дозите, които се прилагат са в зависимост от вида на плевелите и са съответно:</u></p> <p>150-400 мл/дка: <i>Alopecurus</i> spp, <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum murinum</i>, <i>Lolium</i> spp., <i>Mercurialis</i> spp., <i>Poa</i> spp., червен ориз, <i>Ammi majus</i>, <i>Amaranthus</i> spp, <i>Celendula</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Orobanchе</i> spp., <i>Portulaca</i> spp., <i>Raphanus</i> spp., <i>Senecio</i> spp., <i>Sinapsis</i> spp., <i>Stellaria</i> spp., <i>Veronica</i> spp.;</p> <p>400-500мл/дка: <i>Agropyron repens</i>, <i>Carex</i> spp, <i>Cirsium</i> spp., <i>Euphorbia</i> spp., <i>Hypericum</i> spp., <i>Laersia oryzoides</i>, <i>Phalaris</i> spp., <i>Rumex</i> spp., <i>Sonchus</i> spp., <i>Sorghum halepense</i>;</p> <p>500-700 мл/дка: <i>Alisma</i> spp., <i>Asfodelus</i> spp, <i>Butomus</i> spp., <i>Cyperus</i> spp, <i>Ferula</i> spp., <i>Juncus</i> spp., <i>Nardus</i> spp., <i>Scirpus</i> spp., <i>Sparganium</i> spp., <i>Tussilago</i> spp.;</p> <p>800-1000 мл/дка: <i>Agrostis</i> spp., <i>Allium</i> spp., <i>Artemisia</i> spp., <i>Arundo</i> spp., <i>Cynodon</i> spp., <i>Eracleum</i> spp., <i>Glechoma</i> spp., <i>Oxalis</i> spp., <i>Paspalum</i> spp., <i>Phragmites</i> spp., <i>Pteridium</i> spp., <i>Ranunculus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Tipha</i> spp., <i>Urtica</i> spp., <i>Daucus carota</i>;</p> <p>1200 мл/дка: <i>Aristolochina</i> spp., <i>Clematis</i> spp., <i>Convolvulus</i> spp., <i>Rubia peregrine</i>;</p> <p>Храсти:</p> <p>400-600 мл/дка: <i>Acer</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Genista</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sambucus</i> spp., <i>Vaccinum</i> spp.;</p> <p>1000-1200 мл/дка: <i>Calluna</i> spp., <i>Cistus</i> spp., <i>Erica</i> spp., <i>Lonicera</i> spp.</p>			
54.	<p>ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК Синджента Разрешение № 01001 – ПРЗ-</p>	<p>312,5 г/л S-метолахлор+ 187,5 г/л тербутилазин</p>	350 -400мл/дка	<p>Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:</p> <p>Слънчоглед - внася се след сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите Или ВВСН 10-14Котелидоните са напълно разтворени – четири листа (втора двойка листа) на културата, преди поникване</p>	>3000	<p>60-царевича за фураж; царевича за зърно не се налага</p>	Втора професионална

	4/16.02.2017г. Валидно до: 31.07.2019г. Заповед № РД 11-243/03.02.2017 г.			на плевелите			
			400-450 мл/дка	Царевича – внася се след сеитба преди поникване на културата, преди поникване на плевелите			
			350-400 мл/дка	Царевича - внася се във фаза ВВСН 10-14-при поява на първи лист – разтваряне на четвърти лист на културата и 1-2-ри лист на житните плевели и 2-4-ти лист на широколистните			
55.	ГЛИФОН Sinon Corporation Taiwan / Синон Корпорейшън, Тайван Разрешение № 01567-1/14.03.2018 г. Валидно до: 15.12.2018 г. Заповед № РД 11-428/09.03.2018 г.	глифозат 360 г/л	300-1000 мл/дка	Поливни канали Срещу многогодишни плевели –внася се при плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	Втора професионална
			300-1000 мл/дка	Дървесни видове - срещу едногодишни плевели–внася се при плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			600-1000 мл/дка	Дървесни видове – срещу многогодишни плевели - внася се при плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			300-1000 мл/дка	Синори – срещу многогодишни плевели - - внася се при плевели в активна вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			300-1000 мл/дка	Пасища - срещу Нежелана дървесна растителност *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	-	-	
56.	ГЛИФОС 36 СЛ Хеминова -Удостоверение № 531/14.01.2007 г. Валидо до:*	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Овощни градини Лозя Свободни площи (стърнища)			
			1200 мл/дка	Ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на			

				широколистните и изкласяване на житните плевели			
57.	ГЛИФОС ДАКАР Хеминова, А/S, Дания Разрешение № 01348 – ПРЗ-1/18.11.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г. *	глифозат (амониева сол) 680 гр./кг	370 г/дка	Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култури: Многогодишни плевели; Двугодишни плевели Едногодишни плевели * Преди засаждане на културата		зеленчукови култури – 30 дни, лозя, цитрусови култури, семкови овощни култури, орехоплодни, овощни култури с дребни и с месести безкостилков и плодове – 21 дни; костилкови овощни култури – 14 дни; Пшеница, ечемик – 7 дни	непрофесионална
			318 г/дка				
			159 г/дка				
			424 г/дка	Лозя и всички овощни култури, срещу : Многогодишни плевели; Двугодишни плевели Едногодишни плевели * По време на вегетация			
318 г/дка	Пшеница, ечемик: Поникнали плевели * Не се прилага при хлебна пшеница, малцов и пивоварен ечемик и при семепроизводство						
			370 г/дка	Полски и зеленчукови култури, лозя, всички овощни култури: Многогодишни плевели; Едногодишни и двугодишни широколистни плевели Едногодишни плевели * След прибиране на реколтата			
58.	ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ Хеминова -Удостоверение № 532/14.01.2007 г. Валидно до: *	450 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			320-960 мл/дка	Свободни площи (стърница)			
			960 мл/дка	Ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
59.	ГЛИФОС УЛТРА Хеминова, А/S, Дания Разрешение № 01460-ПРЗ-1/14.02.2017г. Валидно до: 31.12.2018г.	глифозат - 360 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална
			0,150-1,2 л/дка	Аспержи * след сеитба преди поникване			
			0,150-1,2 л/дка	Овощни градини, лозя * между растенията * Да не се пръска при невдървесинени			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Заповед №11-160/24.01.2017 г.			стъбла. Костилковите овощни видове могат да покажат признаци на фитотоксичност.				
				0,150-1,2 л/дка				Самосевки, други едногодишни житни и широколистни плевели Свободни площи (незасети терени) *Сеитбата или разсаждането на следните култури: ягоди, зеленчуци, зах. цвекло, пшеница, ечемик, ръж, овес, царевица, сорго, слънчоглед, памук, маслодайна рапица, соя, ориз, ливади, разсадници да се извършва най-малко 48 часа след третирането.
				0,150-1,2 л/дка				Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Орех (над 3 години), топола, смърч (над 2 години) – -внося се между растенията * Да не се пръска при невдървесинени стъбла. Тополата може да покаже признаци на фитотоксичност..
			0,150-1,2 л/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели Ж.п. линии, Канали				
	ГЛИФОХЕМ БРОКДЕН С.Л., Испания Разрешение № 1568-ПРЗ-1/14.03.2018 г. Валидно до: 15.12.2018г. * Заповед №РД 11-429/09.03.2018 г.	глифозат - 360 г/л	300-600 мл/продукт/дка	Зърнено-житни култури Срещу едногодишни плевели – внося се преди сеитба *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка			втора професионална	
			600-1000 мл/продукт/дка	Зърнено-житни култури Срещу многогодишни плевели – внося се преди сеитба *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка				
			300-600 мл/продукт/дка	Горски насаждения Срещу едногодишни плевели – внося се преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			600-1000 мл/продукт/ дка	Горски насаждения Срещу многогодишни плевели – внася се преди засаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка		-	
			300 мл/продукт/ дка	Маслини Срещу едногодишни многогодишни плевели – внася се преди прибиране *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка *За улесняване прибирането на реколтата		7	
			300-1000 мл/продукт/ дка	Необработваеми площи-напоителни канали, пътища, насипи, краища на канавки и култури Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се през цялата вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка		-	
			500-1000 мл/продукт/ дка	Ливади и пасища (за регенериране) Срещу едногодишни и многогодишни плевели през целия вегетационен сезон *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка			
			300-1000 мл/продукт/ дка	Противопожарни просеки Срещу едногодишни и многогодишни плевели – внася се през цялата вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 10-40 л/дка	-	-	
60.	ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис Удостоверение №01051- ПРЗ/24.02.2010 г	Второ търговско име на ЕФАЗАТ 36 СЛ					
61.	ГЛИЙН 75 ВГ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение №0537- ПРЗ-3/12.03.2018 г. Валидно до: 09.12.2024 г.	Второ търговско име на ИГЪЛ 75 ВГ					
62.	ГРАНСТАР 75 ДФ	трибенурон-		Срещу едногодишни широколистни в т. ч.	5000	30	Непрофе

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	/ТРИМЕР 75 ДФ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 01028- ПРЗ-3/ 12.03.2018 г. Валидно до: 24.06.2025 г. Заповед №РД 11- 1113/24.06.2015 г. и Заповед №РД 11- 398/01.03.2018 г.	метил - 750 г/кг		слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:			сионална
			1-1,5 г/дка	Пшеница и ечемик – Внася се във фаза ВВСН 13- 39-от развитие на 3 лист до начало на поява флагов лист на културите и начални фази на плевели При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол. *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка			
63.	ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ ФМС Интернешънъл Швейцария Сарл Разрешение №01142- 3/12.03.2018г. Валидно до: 13.10.2021г. Заповед № РД 11- 1244/13.10.2011 г. Заповед №РД 11- 1675/10.08.2017 г. Заповед № РД 11- 391/01.03.2018 г.	250 г/кг трибенурон метил 250 г/кг тифенсулфурон метил		Срещу едногодишни широколистни, в това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида	5000	-	непрофесионална
			4 г/дка	Пшеница и ечемик - прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите разтворени две листа до флагов лист /12-39 ВВСН/ *Максимален брой приложения: 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40 л/дка			
64.	ГЪЛИВЕР 50 ВГ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение №01398 – ПРЗ-2/ 12.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2022 г. Заповед №РД 11- 687/22.04.2016 г. Заповед №РД 11- 397/01.03.2018 г.	азимсулфурон 500 г/кг		Срещу житни и широколистни плевели (от семена и от коренища) 1-ви до 4-6-ти лист, Видове просо (Echinochloa spp) 1-ви до 4-ти лист, преди начало на братене		-	втора професионална
			4 - 5 г/дка	Ориз Внася се във фаза ВВСН 12-29 на културата (две листа разтворени-видими са максималния брой братя) *Прилага се с прилепител Тренд 90- 0,1%			
65.	ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД ИСК	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					

	-Удостоверение № 01101-ПРЗ -4/ 03.08.2015 г. Валидно до: 28.11.2023 г.						
66.	ДЕВРИНОЛ 4 Ф Юнайтед Фосфоръс Удостоверение № 69/21.07.2003 г. Валидно до: *	450г/л напропамид		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	5000	45	3
			300-350 мл/дка	Фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			300-400 мл/дка	Тютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			400 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане Сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране Шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Лавандула - разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
		400-500 мл/дка	Зеле - внася се преди разсаждане Домати (безразсадни) Пипер (безразсадни) - Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури				
67.	ДЕРБИ СУПЕР Дау АгроСайънсис -Удостоверение № 01073-3/28.08.2013 г. Валидно до: *	150,2 г/кг флорасулам+ 300,5 г/кг аминопиралид- калий		Срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3
			2,5-3,3 г/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида			
68.	ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО/ ЛАНСЕЛОТ Дау АгроСайънсис Експорт SAS Разрешение № 01287-ПРЗ -2/28.12.2015г. Валидно до: 18.12.2017 г. * Заповед №РД 11-	флорасулам -150 г/кг аминопиралид - 300 г/кг		Срещу широколистни плевели при:		60	втора професионална
			2,5-3,3 г/дка	Пшеница (твърда и мека): Прилага се във фаза ВВСН 21 – 32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите			
			2,5-3,3 г/дка	Ечемик Прилага се във фаза ВВСН 21 – 32 на културата (от начало на братене до поява на втори възел) и до 6-8 лист на плевелите			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	1846/09.12.2015 г.					
69.	ДИКВА 20 СЛ/ ДИМОР 20 СЛ/ ДИМАЗО 20 СЛ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/ 15.09.2016г Валидно до: 30.06.2019 г. Заповед №РД 11- 211/08.02.2016 г. Заповед №РД 11- 615/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11- 1567/29.08.2016 г. Заповед №РД 11- 919/30.05.2018 г.	дикват – 200 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели	30 дни За картофи - 10 дни	втора професионална
			330-500 мл/дка	Лозя, овощни градини, цитрусови култури, маслини: Внася се преди активна вегетация на културата, при активна вегетация на плевелите *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка		
			200-400 мл/дка	Разсидници, зеленчукови култури, аспержи, декоративни растения -внася се 30 дни преди засаждане/засяване, при активна вегетация на плевелите *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка		
			250-330 мл/дка	Люцерна Внася се преди засяване, при активна вегетация на плевелите *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка		
			330-500 мл/дка	Царевича, тревен чим (Бермудска трева (Bermuda grass), Bluegrass, Bentgrass, Ryegrass, Quakgrass, Fescue, Zoysiagrass, St. Augustine grass, Bahiagrass, Centipedegrass, Carpetgrass, Grama grass) Внася се преди засяване, при активна вегетация на плевелите *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка		
			330-500 мл/дка	Картофи: За изсушаване – като десикант – внася се 1 месец преди прибиране *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка		
	500 мл/дка	Пасища: внася се преди засяване, при активна вегетация на плевелите *Преди създаване на пасища. Намалява се конкуренцията на плевелите, което позволява успешното създаване на пасища *Брой приложения мин/макс – 1				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				*Вода л/дка мин/макс – 30-80 л /дка			
70.	ДИКОПУР Ф/ХЕРБОКСОН ТОП Нюфарм -Удостоверение № 0202-ПРЗ-2/19.07.2011 г. Валидно до: 31.12.2011г. *	2,4 Д – 600 г/л		Срещу широколистни плевели при:		-	3
			120 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
71.	ДИМАЗО 20 СЛ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/15.09.2016 г.	Второ търговско име на ДИКВА 20 СЛ					
72.	ДИМОР 20 СЛ/ Шарда Кропкем ООД, Индия Разрешение № 01320 – ПРЗ-5/15.09.2016 г.	Второ търговско име на ДИКВА 20 СЛ					
73.	ДИФЛАНИЛ СД Глобахем НВ, Белгия Разрешение № 01421 – ПРЗ -1 / 07.06.2016 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11-935/30.05.2016 г.	дифлуфеникан–500 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	втора професионална
			25 мл/дка	Пшеница (зимна)			
			37,5 мл/дка	Пшеница (пролетна)			
			25 мл/дка	Ечемик (зимен)			
			25 мл/дка	Ръж (зимна)			
37,5 мл/дка	Ръж (пролетна)						
74.	ДЕССИКАШ 200 СЛ Шарда Уърлдайд Експорт -Удостоверение № 01259–ПРЗ / 11.08.2014г. Валидно до: 01.08.2024 г.	200 г/л дикват		Срещу едногодишни и многогодишни житни и шитколистни плевели и десикант при:		7	1
			250 мл/дка	Картофи * не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените достигат до 70% от крайното си тегло до кожицата се е оформила напълно)			
75.	ДИОВИД 60 СЛ	600 г/л		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 170/10.03.2004 г. Валидно до: *	2,4 Д ам.сол	120 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница - във фаза братене на културата			
76.	ДИФЕНДЪР СЛ /ПАСИФИК СЛ /МАГНЕТО СЛ Ню Фарм Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до: 26.04.2015г. *	360 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба		Срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1276	30	3
			80-100 мл/дка	Пшеница - внася се във фаза братене на културата			
			120 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
77.	ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ Albough ТКІ d.o.o./Албо ТКІ д.о.о Разрешение № 01218 – ПРЗ -2/ 12.03.2018г. Валидно до: 29.01.2024 г. Заповед №РД 11- 358/28.02.2018 г.	480 г/л – глифозат (като диметиламоние ва сол - 608 г/л)	300мл/дка	На стърница срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка		-	втора професионална
			900мл/дка	На стърница срещу многогодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка			
78.	ДОМИНАТОР УЛТРА Albough ТКІ d.o.o./Албо ТКІ д.о.о Разрешение № 356- ПРЗ-2/01.03.2018 г. Заповед №РД 09- 213/06.04.2006 г. Заповед №РД 11- 342/26.02.2018 г Валидно до: 06.04.2016 г. *	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	непрофесионална
			300 мл/дка с 20-30 л/дка раб.р-р	Лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане			
79.	ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК /ТЕНДЪР ЕК	960 г/л S-метолахлор		Срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:	2149	-	3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г. Валидно до: 29.12.2009 г. *		120 мл/дка	Домати (разсадни и безразсадни) Пипер (разсадни и безразсадни) Моркови Лук I, II, III година			
			150 мл/дка	Царевича Слънчоглед Соя Захарно цвекло Тютюн Памук Картофи Фасул Люцерна Сорго Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди засаждане на културите Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви Семената на соргото , предварително се третира с антидот Сопсер III			
80.	ЕВОЛИЯ Синджента Разрешение №01484 – ПРЗ1/27.06.2017г . Валидно до: 31.07.2018г.* Заповед № РД 11- 1197/07.06.2017 г.	мезотрион 500 г/кг	15 г/продукт/дка	Едногодишни широколистни плевели Сладка царевича *Прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист-разтворен девети лист)	>5000	- -	втора професио нална
			30г/продукт/дка	Едногодишни широколистни и житни плевели Царевича за фураж, зърно и семепроизводство *Прилага се във фаза ВВСН 00-19 (след сеитба, преди поникване-разтворен девети лист)			
81.	ЕКИП ОД Байер КропСайанс -Удостоверение № 01087-ПРЗ-2/ 29.07.2014г. Валидно до: 30.04.2019 г.	22,5 г/л форамсулфурон + изоксадифен- етил (антидот) – 22,5 г/л	200-250 мл/дка	Срещу кокошо просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде и Балур (Sorghum helepense) при: Царевича - Внася се във фаза разтваряне на 3-ти лист до фаза разтваряне на 6-ти лист	>5000	-	непрофес ионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Заповед РД 12-24/30.04.2009 г. Заповед №РД 11-1050/03.07.2014г.			на културата			
82.	ЕКЛИПС 70 ВДГ АДАМА АГАН Лтд Разрешение № 01095-ПРЗ-3/ 25.07.2016 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11-770/10.05.2016 г. и Заповед №РД 11-1234/07.07.2016 г.	700 г/кг метрибузин		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:	2000	домати -30; моркови – 60; люцерна – 60; соя, картофи, мека пшеница, твърда пшеница, Ечемик - не се изисква	втора професио нална
			25-40 г/дка 25-30 г/дка	Картофи: - ВВСН 00-09 Преди поникване - След ВВСН 10 След фаза първите листенца започват да нарастват (от клубени) След фаза котиледоните напълно се разтварят (от семена)			
			25-30 г/дка 25-40 г/дка	Домати: - Преди поникване (ВВСН 00-09) - След пълно разваряне на котиледоните (След ВВСН 10)			
			25-35 г/дка	Моркови: - След разтворен четвърти същински листсъщински (След ВВСН 14)			
			25-35 г/дка	Соя: - след сеитба ,преди поникване			
			50-75 г/дка	Люцерна: - Есен, след последният откос, когато културата е във вегетационен покой			
			100 г/дка	Мека пшеница, Твърда пшеница Ечемик: Разтворени две листа-край на братенето (ВВСН 12-29)			
83.	ЕКОПАРТ ТУРБО Ничино Юръп Ко Лтд Разрешение № 01387 – ПРЗ – 1 / 25.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г.* Заповед № РД 11-398/16.03.2016 г.	пирафлуфен-етил 26,5 г/л	80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лозя: внася се във фаза ВВСН 19-75 Девет и повече листа са отворени- гроздовите зърна са с размер на грахово зърно Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни		Лозя ,Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула, Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива – 30; Череша – 7; Лешник -20; Картофи -3; Свободни	втора професио нална
			80 мл/дка	Ябълка, Круша, Дюля, Мушмула, Японска мушмула: Широколистни плевели, Коренови издънки			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			25-30 мл/дка	В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Набъбване на неразцъфналите пъпки-плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни		площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки -	
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Праскова, Нектарина, Кайсия, Слива: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер (ВВСН 51-75) *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Череша: Широколистни плевели, Коренови издънки В комбинация с глифозат съдържащи хербициди – внася се във фаза (ВВСН 51-75) Цветните пъпки са затворени, - плодовете са достигнали половината от окончателния си размер			
			80 мл/дка 25-30 мл/дка	Лешник: - Широколистни плевели, Коренови издънки - В комбинация с глифозат съдържащи хербициди Внася се във фаза (ВВСН 13-76) Развитие на листата-плодовете са достигнали 60% от окончателния си размер *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 20-30 дни			
			80 мл/дка	Картофи: - Листна десикация Внася се във фаза (ВВСН 46-49) Клубените достигат до 60% от крайното си тегло-кожицата се е оформила напълно-95% от клубените са в тази фаза			

				*Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни			
			25-30 мл/дка	Свободни площи Железопът-ни линии Канални диги Сухи канавки Широколистни плевели, Коренови издънки *Самостоятелно или в комбинация с глифозат съдържащи хербициди *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията (мин) - 7-14 дни			
84.	ЕКСПЕРТ ВГ Сапек Агро С.А., Португалия / SAPEC Agro, S.A Разрешение № 01588- ПРЗ-1/05.06.2018 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11- 918/30.05.2018 г.	Трибенурон метил 750 г/кг	1.5-2 г/дка	При едногодишни широколистни плевели Пшеница ечемик, овес – внася се във фаза ВВСН 13-29 (трети лист-край на братене) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 35-70 мл/дка		-	непрофес ионална
85.	ЕКСПРЕС 50 СГ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 0567- 2/12.03.2018 г. Валидно до: 29.12.2009 г.* Заповед № РД 12- 62/29.12.2006 г. на Заповед №РД 11- 395/01.03.2018 г.	500 г/кг трибенурон- метил	4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	Срещу широколистни плевели при: Слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите	5000	30	непрофес ионална
86.	ЕЛЕКТРОН 500 СК Адама Аган ООД, Израел -Удостоверение № 01300–ПРЗ-1/ 19.03.2105 г. Валидно до: 31.07.2020 г..	квинмерак 125 г/л метазахлор 375 г/л	200 мл/дка	Срещу едногодишни житни и широколистни плевели Маслодайна рапица: * След сеитба преди поникване или вегетационно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (ВВСН 12-14)		-	първа професио нална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

87.	ЕЛУМИС ОД Удостоверение №1151-ПРЗ- 2/25.10.2013 г. Валидно до: 03.05.2022г.	75 г/л мезотрион + 30 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища:	2000	-	Непрофесионална
			130 – 200 мл/дка	Царевица: Еднократно			
			100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка	Двукратно			
88.	ЕРГОН ВГ Ротам Агрокемикал -Удостоверение № 01163/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	68 г/кг метсулфурон- метил + 682 г/кг тифенсулфурон- метил		Срещу двуседелни плевели (едногодишни широколистни плевели)	5000	-	3
			5-9 г/дка	Пшеница, тритикале и ръж			
			5-6 г/дка	Зимен ечемик			
			6 г/дка	Пролетен ечемик			
				Момент на приложение: есенно или пролетно третиране; ВВСН 13-39 (трети лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до шести лист на плевелите)			
89.	ЕСТЕРОН 600 ЕК Дау АгроСайънсис Юръп - Разрешение № 01385–ПРЗ- 1/25.03.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. * Заповед № РД 11- 397/16.03.2016 г.	2,4 Д - 600 г/л		Едногодишни широколистни плевели, паламида и поветица:		Пшеница, Ечемик - 60; Царевица – не се изисква	втора професио нална
			50-100 мл/дка	Пшеница, Ечемик: * ВВСН 21-30(начало на братене-начало на удължаване на стъблото)ВВСН 14-16 (Фаза 4-6 лист на плевелите)			
			50-100 мл/дка	Царевица: * ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти лист до разтваряне на 6-ти лист), ВВСН 14-16(Фаза 4-6 лист на плевелите) * Не се прилага при сладка царевица и при семепроизводство на царевица			
90.	ЕФАЗАТ 36 СЛ /ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис -Удостоверение № 01051- ПРЗ/24.02.2010 г. Валидно до: *	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Лозя – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
91.	ЗЕНКОР 70 ВГ Байер КропСайанс Германия	700 г/кг метрибузин		Срещу едногодишни широколистни плевели:	1.449	30	3
			50 г/дка	Домати (безразсадни) – внася се във фаза I			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	-Удостоверение № 564/29.09.2009 г. Валиден до: 29.12.2009 г. !Считано от 01.12.2017 г. Се определят 6 месеца за продажба и разпространение и още 12 месеца за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЗЕНКОР 70 ВГ			цветна китка на културата			
			60-70 г/дка	Домати (разсадни) – внася се във фаза 1 цветна китка на културата Картофи – внася се при височина 5-10 см на културата			
			70 г/дка	Домати (разсадни) – внася се преди разсаждане			
			70-80 г/дка	Картофи – внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			100 г/дка	Люцерна (стара) – внася се преди вегетацията на културата			
92.	ЗЕНКОР 600 СК Байер КропСайънс, Франция -Удостоверение №01253– ПРЗ/21.01.2016 г. Валидно до: 31.07.2019г. Заповед №РД 11- 11/07.01.2016 г.	600 г/л метрибузин		Едногодишни широколистни плевели и житни плевели при:			втора професионална (2)
			90 мл/дка	Картофи: внася се след засаждане, преди поникване на културата;		картофи – 60 ;;	
			60 мл/дка	внесен след поникване (вегетационно);			
			90 мл/дка	Аспержи: внесен (преди поникване) или след прибиране на реколтата, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза		аспержи – 7;	
			35 мл/дка	Моркови: внесен след поникване, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза		моркови – 42	
			60 мл/дка	Моркови: внесен във фаза ВВСН 12 (Разтворен втори същински лист)		моркови - 60	
			76 мл/дка	Моркови за семепроизводство Преди поникване		не се изисква	
			90 мл/дка	Люцерна за семепроизводство Преди поникване		не се изисква	
			46 мл/дка	Домати - еднократно приложение във фаза:		30	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				<p>- ВВСН 00-07 (След сеитба до преди поникване), или - ВВСН 12-14 (Втори същински лист – четвърти същински лист), след направата на лехи и тирове, или - ВВСН 13-14 (Трети-четвърти същински лист), 20 дни след разсаждане и при добро вкореняване.</p>			
			75-90 мл/дка	Картофи: еднократно приложение във фаза ВВСН 00-08 (След сеитба до 3-4 дни преди поникване: стъблата нарастват към почвената повърхност);		60	
			45-60 мл/дка	еднократно приложение във фаза ВВСН 09-15 (Поникване: стъблата излизат над почвената повърхност – разтваряне на пет листа на главното стъбло и височина на растенията 5-10 см);			
			60 + 30 мл/дка	двукратно приложение - Преди поникване + При височина на растенията 5-10 см			
			35 мл/дка	Соя: Внася се във фаза ВВСН 00-08(След сеитба-преди поникване)		60	

93.	ЗЕТРОЛА 100 ЕК Адама Куена Н.В., Кюракао Разрешение № 01546- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 30.11.2022 г. Заповед № РД 11- 136/18.01.2018 г.	пропаквизафоп - 100 г/л	● 75-120 мл/дка; ●● 150-200 мл/дка ●●● 100-150 мл/дка	Домати, лук, захарно цвекло, памук Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза След ВВСН 11 Домати – първи същински лист на основното стъбло Лук – първи лист ясно видим Захарно цвекло – видима първа двойка листа, все още неразтворени Памук – първи същински лист разтворен *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка ● срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ●● срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ●●● срещу балур, при височина на балура 10-20 см	-	Доматилук – 30 дни Захарно цвекло -45 дни Памук – 90 дни	Втора професио нална
			75-120 мл/дка	Соя Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища внася се във фаза След ВВСН 11 разтваря се първата двойка същински листа *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка *срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см		90	
			80 мл/дка	Слънчоглед Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза След ВВСН 11 котиледоните са напълно разтворени *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка срещу едногодишни житни плевели във	-	90	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото и срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см и балур - при височина на балура 10-20 см			
			<p>◆ 50 мл/дка</p> <p>◆◆ 75-120 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>Маслодайна рапица Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза След ВВСН 11 разтворен първи лист ◆ срещу самосевки от житни култури във фаза 3-5-ти лист на самосевките</p> <p>◆◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см</p> <p>◆◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>	-	90	
			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>Допълнителна употреба</p> <p>Лозя Срещу еногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза ВВСН 00-85 покой – омекване на зърната</p> <p>◆ срещу еногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p>		30	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				*Вода л/дка – 20-60 л/дка			
			<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка</p>	<p>Допълнителна употреба</p> <p>Картофи Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се след ВВСН 11 разтваряне на първите листа на главното стъбло</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>	-	40	
			<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка</p>	<p>Допълнителни употреби</p> <p>Тютюн, леща Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11</p> <p>Тютюн – първи същински лист на основното стъбло Леща – разлистен първи лист</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>	-	Тютюн – 40 дни Леща – 50 дни	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			<p>◆75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆150-200 мл/дка</p> <p>◆◆◆100-150 мл/дка</p>	<p>Минимални употреби</p> <p>Патладжан, чесън, броколи, фасул, грах, бакла нахут, лен, разсадници, декоративни горски дървесни видове Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза След ВВСН 11 Патладжан – първи същински лист на основното стъбло Чесън – първи лист ясно видим Броколи –разтворен първи същински лист Фасул – развитие на първите листа Грах – първият същински лист се разтваря или се развива първото мустаче Бакла, нахут -разлистен първи лист Лен –първи същински лист разтворен Декоративни горски дървесни видове – развитие на първите листа ◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см; ◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>		<p>Патладжан, чесън, броколи – 30 дни</p> <p>Варива (фасул, грах, бакла нахут) – 50 дни</p> <p>Пресни(фасул, грах)- 40 дни</p> <p>Лен – 90 дни</p>
			<p>◆75-120 мл/дка;</p>	<p>Минимални употреби</p> <p>Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се при Моркови, магданоз, спанак – разтворен първи същински лист ◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото ◆◆ срещу многогодишни житни плевели</p>		30

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			<p>◆◆ 150 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-150 мл/дка</p>	<p>при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>			
			<p>◆ 75-120 мл/дка;</p> <p>◆◆ 125 мл/дка</p> <p>◆◆◆ 100-125 мл/дка</p>	<p>Минимална употреба</p> <p>Копър Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се След ВВСН 11 първи същински лист разтворен</p> <p>◆ срещу едногодишни житни плевели във фаза на плевелите 2-3 –ти лист до удължаване на стъблото</p> <p>◆◆ срещу многогодишни житни плевели при височина на плевелите 15-20 см;</p> <p>◆◆◆ срещу балур, при височина на балура 10-20 см</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка – 20-60 л/дка</p>		30	
94.	<p>ИГЪЛ 75 ВГ/ГЛИЙН 75 ВГ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение №0537-ПРЗ-3/12.03.2018 г. Валидно до: 09.12.2024 г. Заповед №РД 11-1960/09.12.2014 г. Заповед №РД 11-396/01.03.2018 г.</p>	хлорсулфурон - 750 г/кг	1,5-2 г/дка	<p>Пшеница Срещу широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели – внася се във фаза внесен след сеитба преди поникване на културата ВВСН 00</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка</p>		-	втора професионална
			1,3-2 г/дка	<p>Пшеница, ечемик и овес Срещу широколистни плевели, в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди плевели и някои едногодишни житни плевели</p> <p>*Брой мин/макс приложения – 1</p> <p>*Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка</p>		-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

95.	ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600-3/04.05.2012 г.	Второ търговско име на СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ					
96.	ИНДИПЕН 40 СК Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение № 01547- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед № РД 11- 120/18.01.2018 г.	пендиметалин - 400 г/л	300-500 мл/дка	Слънчоглед, царевица Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-80 * Прилага се през пролетта.		Ограничен от фазата на приложение	втора професионална
			300-500 мл/дка	Фасул Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се След сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-80 * Прилага се през пролетта.	-	Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Соя Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-60 *Прилага се през пролетта.	-	Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Моркови, ряпа Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	

			330-500 мл/дка	Аспержи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели внася се в период на покой *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	28	
			300-500 мл/дка	Картофи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Тютюн Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Пипер Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ССПП или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Марули Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ССПП или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	75	
			250-500 мл/дка	Ендивия Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се по време ССПП или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	75	
			250-500 мл/дка	Карфиол Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	Ограничен от фазата на приложение	

			250-410 мл/дка	Цикория Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80	-	75 дни	
			200 мл/дка	Козя брада Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се ССПП *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300 мл/дка	Лупина Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се ССПП *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Памук Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се ССПП или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			230-300 мл/дка	Топола Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода на зимен покой *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Ябълки, круши Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	

			300-500 мл/дка	Кайсии, праскови,нектарини Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Овощни разсадници Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди или след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм,мандарини, грейпфрут, помело) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Фъстъци Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ССПП *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-600 мл/дка	Декоративни растения и разсадници Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза преди или след разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80		Ограничен от фазата на приложение	
			170-330 мл/дка	Трeви за семена AGSTE ALOPR ARRAL CYXCR DECCA, LOLSS PHLPR POASS FESSS		Ограничен от фазата на приложение	

				AGSST Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 25-80 * Да не се прилага при треви за храна на животните			
97.	КАБАДЕКС ЕКСТРА Дау АгроСайънсис LLC, САЩ Разрешение № 01495/30.08.2017 г. Заповед №РД 11 – 1710/16.08.2017 г. Валидно до: 31.07.2018 г. *	мезотрион – 267 г/л флорасулам – 16.7 г/л	45 мл/дка	Широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж): внася се във фаза ССПП ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване (колеоптилът пробива земната повърхност))			втора професионална
			30 мл/дка	Широколистни плевели Царевича (за зърно и силаж): внася се вегетационно третиране в ВВСН 12-16 (разтваряне на втори лист – разтваряне на шести лист) *Да се прилага в резервоарна смес с адювант – Дасоил 26-2N с доза 50 мл/дка за по-добра ефикасност			
98.	КАЛАМ БАСФ СЕ -Разрешение № 0588 –ПРЗ - 2/21.01.2016 г. Валидно до: 30.11.2019 г. Заповед №РД 11-09/07.01.2016 г.	125 г/кг тритосулфурон + 600 г/кг дикамба		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели:	5000 2000 калам 2200 деш	-	втора професионална
			20 г-40 г/дка +100 мл/дка ДЕШ	Царевича- внася се във фаза ВВСН 13-16 (разтваряне на 3-ти до 6-ти лист)			
99.	КАЛИН ФЛО Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 347-2/18.11.2013 г. !Гратисен период от 6 месеца за продажба и разпространение до	425 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при: внася се след сеитба, преди поникване на културите		60	2
			150-200 мл/дка	Моркови Кориандър			
			200-250 мл/дка	Картофи			
			250-300 мл/дка	Слънчоглед			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	07.12.2017 г.и срок за съхранение и употреба на съществващи наличности до 03.06.2018 г. Заповед №РД 11-1194/07.06.2017 г.						
100.	КАЛИФ 480 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение №01185-ПРЗ /22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	480 г/л кломазон		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:	-	-	2
			20 мл/дка (200 мл/ха)	Маслодайна рапица			
101.	КАЛИФ МЕГА ЗК Аган Кемикъл Манюфакчърърс -Удостоверение №01248-ПРЗ/27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2024г.	33 г/л – кломазон 250 г/л – метазахлор		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:		-	1
			250 мл/дка	Маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
			300 мл/дка;	Маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
102.	КАЛИСТО 480 СК Синджента -Удостоверение № 01053-ПРЗ-1/ 02.03.2010 г. *	480 г/л мезотрион		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	-	Непрофесионална
			20 мл/дка+ Атплиос (прилепител)-0,5 %	Царевича – внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите			
			30-40 мл/дка	Царевича – внася се след сеитба, преди поникване на културата			
103.	КАЛИСТО ПЛЮС Синджента Кроп Протектшън АГ Разрешение №01487 – ПРЗ-1/27.06.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. * Заповед № РД 11-	мезотрион – 50 г/л дикамба – 120г/л	200 мл продукт/дка	Едногодиш ни и многогодишни широколистни плевели Царевича: прилага се във фаза ВВСН 12-19 (разтворен втори лист- девети лист)	>2000	-	втора професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	1201/07.06.2017 г.						
104.	КАМБИО СЛ БАСФ СЕ -Удостоверение № 240/25.02.2005 г. Валидно до: 28.12.2012 г. * Заповед №РД 09- 790/28.12.2002 г.	320 г/л бентазон+ 90 г/л дикамба		Срещу широколистни плевели при:	2219	-	3
			125 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
			200 мл/дка	Царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите			
105.	КАМИКС 560 СЕ Синджента Удостоверение № 01155-ПРЗ- 1/01.08.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	60 г/л мезотрион + 500 г/л S- метолахлор		Срещу едногодишни житни плевели и едногодишни широколистни плевели;	2000	-	Втора професионална
			200 и 250 мл/дка	Царевича			
106.	КАОС Сапек Агро С.А. Разрешение №01470 – ПРЗ- 1/16.02.2017г. Валидно до:30.06.2018г. * Заповед № РД 11- 238/03.02.2017 г.	бентазон 480 г/л	250 - 300 мл/дка	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели Царевича *Прилага се във фаза ВВСН 15-16 /Разтворен пети – шести лист/		-	втора професионална
			300 - 400 мл/дка	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели и плевели от род <i>Cyperaceous</i> Ориз *Прилага се във фаза ВВСН 13-34/ 3 листа разтворени – удължаване на междувъзлията или фаза на съединяване; междувъзлията започват да се удължават, метлицата е дълга повече от 2 мм		-	
107.	КАПРЕНО СК Байер С.А.С., Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 01341 – ПРЗ- 2/10.05.2016г. Валидно до: 30.04.2025 г. Заповед №РД 11- 1681/10.11.2015 г. и Заповед №РД 11-	темботрион – 345 г/л тиенкарбазон- метил – 68 г/л изоксадифен- етил (антидот) – 134 г/л		Едногодишни и многогодишни широколистни и едногодишни житни плевели при		-	втора професионална
			22-29 мл/дка	Царевича: От фаза разтваряне на втори лист до фаза разтваряне на шести лист на културата ВВСН 12-16 Фаза на развитие на плевелите: втори-шести лист на широколистните и втори-четвърти лист на едногодишните житни плевели * Прилага се с прилепител Меро 200 мл/дка			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	678/22.04.2016 г.						
108.	КАСПЪР 55 ВГ Синджента Удостоверение № 01089-ПРЗ-2/ 02.11.2010 г. Валидно до: 26.04.2020 г.	50 г/кг просулфурон+ 500 г/кг дикамба	30 г/дка	Царевича за зърно и силаж – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см на поветицата (до цъфтеж)	2000	- 14 -царевича за силаж	Непрофесионална
109.	КЕЛВИН ОД/ВИКТУС ОД ДюПон ИО САРЛ, Швейцария Разрешение № 0577 – ПРЗ-3/ 14.12.2016. Валидно до: 31.12.2019 г.	никосулфурон – 40 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели, в т.ч. балур от коренища		-	непрофесионална
			100 мл/дка 125 мл/дка 150 мл/дка	Царевича: от 2ри до 8ми лист на културата (ВВСН 12-18) *дозите на приложение са в зависимост от степента на заплевеляване *Да не се прилага при сладка царевича			
110.	КЕЛВИН УЛТРА ИСК Биосайансис Юръп С.А.,Белгия Разрешение №01548- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 11.11.2023 г. Заповед № РД 11- 135/18.01.2018 г.		100 до 150 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели – внася се при разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (ВВСН12-18) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20 - 40 литра вода/дка	-	-	Втора професионална
			първо третиране 100 мл/дка (7-10 дни по- късно) второто третиране 50 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели - разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (ВВСН12-18) *Брой мин/макс приложения – 2 *Вода л/дка - 20 - 40 литра вода/дка			
111.	КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0577/14.10.2008 г.	Второ търговско име на ВИКТУС 4 СК					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

112.	КИДЕКА Нюфарм САС, Франция Разрешение №01509 – ПРЗ-1/ 01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед № РД 11- 2129/19.10.2017 г.	мезотрион - 100 г/л	75 – 150 мл продукт /дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Царевича Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист) * Брой мин/макс - 1 *Вода л/дка мин/макс - 15 – 50 л/дка	-	-	втора професио нална
113.	КЛЕРАВО БАСФ Агрокемикъл Продуктс Б.В., Пуерто Рико. Разрешение №01485 – ПРЗ- 1/27.06.2017г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед № РД 11- 1199/07.06.2017 г.	имазамокс 35 г/л квинмерак 250 г/л	0,1л/дка	Едногодишни широколистни и житни плевели Зимна маслодайна рапица Клиърфийлд толерантни хибриди *Прилага се във фаза ВВСН 10-18(напълно оформени котиледони-разтворен 8 лист) * Да не се прилага повече от един път на три години.	> 2.000	-	втора професио нална
114.	КЛЕРАНДА + ДЕШ БАСФ Агрикулчърал продуктс де Пуерто Рико, САЩ / BASF Agricultural Products de Puerto Rico, USA Разрешение №01130- ПРЗ- 6/05.02.2018 г. Валидно до: 27.07.2021 г. Заповед №РД 11- 877/27.07.2011 г.; Заповед №РД 11- 522/03.05.2012 г.; Заповед №РД 11- 847/05.08.2013 г. и Заповед №РД 11- 142/18.01.2018 г.	375 г/л 375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс		Срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури при:	-	-	първа професио нална
			150 мл/дка – 200 мл/ в зависи мост от степенга на заплевеляване	Зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд хибриди) – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ. *Вода л/дка - 15-40 л/дка			

115.	КЛИК ДУО Оксон Италия СпА Разрешение № 01518 – ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2124/19.10.2017 г.	тербутилазин - 125 г/л пендиметалин – 250 г/л	400 мл/продукт / дка	Срещу едногодишни широколистни и житни плевели Царевича – внася се след сеитба преди поникване на културата ВВСН 01-03 – начало на набъбването - край на набъбването на семето *Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка	-	-	Втора професионална
116.	КЛИНИК 36 СЛ /КРЕДИТ 36 СЛ Нюфарм С.А.С. Франция Разрешение № 01208 – ПРЗ -2/.04.07.2016 г. Валидно до: 29.01.2024 г. Заповед №РД 11- 104/29.01.2014 г. и Заповед №РД 11- 1051/14.06.2016 г.	360 г/л глифозат	400мл/дка	Ябълки и лозя: Срещу едногодишни житни плевели		ябълки, лозя - 21 дни; заплевяване в обработваемите площи – 30 дни; пшеница и ечемик -7 дни	непрофесионална (3)
			600мл/дка	Срещу широколистни плевели			
			800мл/дка	Срещу многогодишни плевели (насочено с протрктор)			
			300мл/дка	Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта: Срещу едногодишни житни плевели			
			600 мл/дка	Широколистни плевели			
			700 мл/дка	Многогодишни плевели			
			600 мл/дка	Пшеница (без хлебна и за производство на семена) - преди жътва Едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели			
			600мл/дка	Ечемик (без пивоварен и за производство на семена) - преди жътва Едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели			
			117.	КЛИОФАР 600 СЛ Ариста ЛайфСайънс Бенелокс Спрл, Белгия Разрешение №01441 – ПРЗ*-1/ 15.09.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11-			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	1561/29.08.2016 г.			покриват 30% от повърхността			
			25 мл/дка	Зеле, карфиол: внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори същински лист – 9 или повече същински листа разтворени			
			17 мл/дка	Царевича за зърно: внася се във фаза ВВСН 13-16 разтваряне на трети лист – растежа продължава до шести лист			
			25 мл/дка	Маслодайна рапица: внася се във фаза ВВСН 12-19 разтворен втори лист – 9 или повече листа оформени			
			25 г/дка	Лук: внася се във фаза ВВСН 11-14 Котиледона като „кукичка” е със зелен цвят – растежа продължава до четвърти лист			
			25 мл/дка	Ряпа: внася се във фаза ВВСН 12-19 Разтворен същински лист – 9 или повече същински листа разтворени			
118.	КОКТЕЛ Лаинко С.А., Испания Разрешение №01555-1/12.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11-364/28.02.2018 г.	Глифозат – 180 г/л МЦПА – 180 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели			втора професионална
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши и цитрусови култури – внася се в начални фази и активен растеж на плевелите пролет-лято *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията – 90 дни *Вода л/дка мин/макс - 30-50 л/дка		15	
			400-600 мл/дка	Маслини – внася се във фаза Начални фази и активен растеж на плевелите пролет-есен *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията – 180 дни *Вода л/дка мин/макс - 30-50 л/дка		15	
119.	КОЛАЖ 64 ОД ДюПон И О С.а.р.л, Швейцария Разрешение №01351 – ПРЗ-1/ 28.12.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г. *	тифенсулфурон -метил - 4 г/л никосулфурон - 60 г/л	75 - 100 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели и някои широколистни плевели: Царевича (за зърно и за силаж) * Да не се прилага при сладка царевича. При пропадане на културата може да се засява само царевича след 30 дни		-	втора професионална
120.	КОЛЗОР ТРИО ЕК	диметахлор		Едногодишни житни и широколистни	>2000	-	втора

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Синджента Съплай АГ, Швейцария Разрешение № 01380 – ПРЗ-3/01.11.2017 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11- 299/01.03.2016 г. Заповед №РД 11- 938/30.05.2016 г. Заповед №РД 11- 2133/19.10.2017 г.	187,5 г/л + напропамид 187,5 г/л + кломазон 30 г/л	400 мл/дка	плевели: Рапица – внася се във фаза ВВСН 00-09 (след сеитба – поникване: показване на котиледоните на почвената повърхност) * да не се прилага този продукт и всички други продукти, съдържащи диметаклор, кломазон и напропамид повече от веднъж на 3 години на една и съща площ.			професио нална
121.	КОРУМ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01305 – ПРЗ- 2/14.02.2017г. Валидно до: 31.12.2018г. Заповед № РД 11- 416/10.03.2015 г. и Заповед №РД 11- 170/24.01.2017 г. Разрешение № 01305 – ПРЗ-1/ 08.04.2015 Валидно до : 31.12.2016 г.	бентазон – 480 г/л имазамокс – 22,4 г/л		Срещу едногодишни житни и широко- листни плевели:	>300 - <2000	фасул, грах – 35; соя – 60; Люцерна - 40	Непрофе сионална
			125 мл/дка	Фасул (обикновен и градински): Еднократно приложение (ВВСН 13-25 (3- ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда)) Двукратно приложение ВВСН 12-25 (непосредствено преди 2 развити листа – 5- то странично разклонение се вижда) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			62,5+62,5 мл/дка	Обикновен и фуражен грах (зимни и пролетни форми) Еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)) Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
	190 мл/дка	Соя: Еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см))					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			95 + 95 мл/дка	Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			125 мл/дка 62,5+62,5 мл/дка	Люцерна - стара: Еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)) Двукратно приложение (Първо третиране – непосредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
122.	КОРЕЛО ДУО Дау Агросайансис Експорт С.А.С -Удостоверение № 01251–ПРЗ / 29.07.2014 г. Валидно до: 30.04.2025г	14,2г/кг флорасулам 70,8г/кг пироксулам 70.8 г/кг Клоквинтоцет мексил - антидот		Широколистни и житни плевели при:		-	2
			26,5 г/дка	Пшеница (мека и твърда)			
123.	КОРИДА 75 ВДГ /ПИТОН 75 ВДГ Зенит Кроп сайансис България ЕООД Разрешение №01078- 4/20.09.2016 г. Валидно до: 13.10.2021 г. Заповед №РД 11- 1705/14.09.2016 г.	750 г/кг трибенурон- метил		Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:	2000	-	непрофесионална (3)
			1,5 г/дка	Пшеница – внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата(13-29 ВВСН) и фази на плевелите 2-4 лист Максимален брой приложения: 1 Техника на приложение: наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка			
124.	КОСМИК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 323/09.01.2006 г.	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	Лозя Овощни градини			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Валидно до: *		1200 мл/дка	Ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
125.	КРЕДИТ 36 СЛ Нюфарм С.А.С. Франция Разрешение № 01208 – ПРЗ -2/.04.07.2016 г. Валидно до: 29.01.2024г	Второ търговско име на КЛИНИК 36 СЛ					
126.	КРЮ 4 СК НюФарм САС -Разрешение № 01055-ПРЗ-3/04.07.2016г. Заповед №РД 11-1049/14.06.2016 г.	Второ търговско име на СИРИО 4 СК					
127.	ЛАНСЕЛОТ Дау АгроСайънсис Експорт SAS Разрешение № 01287-ПРЗ -2/28.12.2015г. Валедно до: 18.12.2017 г. Заповед №РД 11-1846/09.12.2015 г.	Второ търговско име на ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО					
128.	ЛАУДИС ОД Байер КропСайанс -Удостоверение № 0581-ПРЗ -1/31.07.2012 г. Валидно до: 09.01.2012 г. * Заповед №РД 12-1/09.01.2009 г	44 г/л темботрион+ 22 г/л изоксадифен-етил (антидот)		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при: Царевница – внася се във фаза 2-8 лист на културата (ВВСН 12-18); от котиледони до 6-ти лист на едногодишните житни и широколистни плевели и при височина на балура и семе от коренища15-25 см Максимален брой приложения: 2 Интервал между третиранията: 14 дни Количество на работния разтвор: 200 – 400 л/ха	>= 5.000	100	3
			200 мл/дка (2 л/ха)				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

129.	ЛАУДИС ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение №01177-1/05.03.2013 г. Валидно до: 31.05.2014 г. * Заповед №РД 11-177/18.02.2013 г	200 г/кг темботрион+ 100 г/л изоксадифен-етил (антидот)		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища:	5000	100- за зърно; 80 – за силаж и фураж; 47 – сладка царевица	2
			50 г/дка	Царевица (за зърно, силаж и фураж) и сладка царевица): внася се от фаза 2-ри до 8-ти лист на царевицата, от котиледони до 6-ти лист на широколистни плевели и до 2-ри – 3-ти лист на едногодишните житни плевели, и при височина на балура от семе и коренища 15-25 см			
130.	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън – Белгия -Удостоверение № 01141-1/21.10.2011г. Валидно до: 13.10.2021г.	450 г/кг пиридат		Срещу едногодишни широколистни и плевели:	2230	42 дни – <i>Brassica</i> ; 28 дни праз	2
			200 г/дка (2 кг/ха)	Зеленчуци от род <i>Brassica</i> , вид <i>Brassica oleraceae</i> (главесто зеле (бяло, червено, савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле карфиол, броколи) – прилага се еднократно през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (4-6-ти лист на културата), в доза 2 кг/ха Праз лук-прилага се еднократно през пролетта, след засаждане, когато трети лист е ясно видим (>3 см), в доза 2 кг /ха Максимален брой приложение:1 Количество на работния разтвор:15-40 л/дка при зеленчуци от род <i>Brassica</i> ; 15-40 л/дка при праз.			
131.	ЛЕОПАРД 5 ЕК/ НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г. *	50 г/л квизалафоп-П-етил		Срещу едногодишни житни плевели при:	1210	90 дни за рапица; 60 дни за всички останали култури	3
			150 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Тютюн Соя Домати Картофи			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			

			200 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Тютюн Домати Картофи Соя Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
			120 мл/дка	Срещу самосевки от житни култури при: -зимна маслодайна рапица			
132.	ЛИНУРЕКС 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 142/22.12.2004 г. !Считано от 07.06.2017 г., се определят 6 месеца за продажба и разпространение и срок за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЛИНУРЕКС 45 СК до 03.06.2018г.	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			200 мл/дка	Кориандър			
			300 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите			
133.	ЛИНУРЕКС 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 174/10.03.2004 г. ! Считано от 07.06.2017 г. Се определят 6 месеца за продажба и разпространение и срок за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за	500 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			150-200 мл/дка	Кориандър			
			200-250 мл/дка	Картофи			
			250-300 мл/дка	Слънчоглед Соя Внася се след сеитба, преди поникване на културите			

	растителна защита ЛИНУРЕКС 50 СК до 03.06.2018г.						
134.	ЛИНУРОН 45 СК И Пи Чи -Удостоверение № 161/06.01.2005 г. !Считано от 07.06.2017 г., се определят 6 месеца за продажба и разпространение и срок за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита ЛИНУРОН 45 СК до 03.06.2018г.	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	90	2
			200 мл/дка	Кориандър			
			250-300 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите			
135.	ЛИСТЕГО 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Заповед №РД 11- 607/19.04.2016 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40					
136.	ЛОГОС 4 СК Сапек Агро -Удостоверение № 01097-ПРЗ/ 16.06.2010 г. Валидно до: *	40 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни житни, някои широколистни плевели и балур от коренища и при:	5000	-	3
			125 мл/дка	Царевица – внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата			
137.	ЛОГРАН 20 ВГ Синджента Кроп Протекшън АГ Удостоверение №01252–ПРЗ- 1/29.07.2014г. Валидно до: 31.12.2016 г.*	200 г/кг триасулфурон		Срещу широколистни плевели при:	>2000		3
			3,75 г/дка	Пшеница (мека и твърда) Ечемик *Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

138.	ЛОНТРЕЛ 72 СГ Дау АгроСайансис, САЩ Разрешение № 01235-ПРЗ-2/ / 01.03.2018г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11- 456/28.03.2014 г. и Заповед №РД 11- 335/23.02.2018 г.	клопиралид - 720 г/кг		Срещу широколистни плевели при:		Не се изисква	3
			17-21 г/дка	Маслодайна рапица, лук, чесън, дребен лук Шалот - внася се във фаза (ВВСН 12-19) Втори лист- 9 или повече листа са оформени *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка			
			17-21 г/дка	Брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле - внася се във фаза (ВВСН 12-19) Втори същински лист- 9 или повече листа са оформени *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка			
			11-14 г/дка	Царевича (за зърно и фураж) - внася се във фаза (ВВСН 13-16) Разтваряне на трети лист - шести лист *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка			
				Пшеница, ечемик, овес и ръж - внася се във фаза (ВВСН 21-39) Начало на братене - напълно разтворен флагов лист *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 15-40 л/дка			
			11-21 г/дка	Захарно и фуражно цвекло - внася се във фаза (ВВСН 11-33) Видима първа двойка листа- листата покриват 30% от повърхността			
139.	ЛОНТРЕЛ 300 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0245-4/05.03.2013 г. Валидно до: *	300 г/л клопиралид		Срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:	4300	-	3
			30-40 мл/дка	Ягоди - внася се след беритба на плодовете			
			30-50 мл/дка	Цвекло Лен Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите			
			40-50 мл/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата Лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата			
	35-40 мл/дка 35-40 мл/дка	Зимна маслодайна рапица Пролетна маслодайна рапица					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

140.	ЛУМАКС 312 Синджента Кроп Протекшън АГ, Швейцария Разрешение № 01514- ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2127/19.10.2017 г.	s-метолахлор 312.5 г/л тербутилазин 187.5 г/л мезотрион 37,5 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	-	-	втора професио нална
			300 -400 мл/продукт/ дка	Царевича Внася се във фаза ВВСН 00-14 (след сеитба- разтворен 4-ти лист) *Вода л/дка Мин/макс - 30-40 л/дка * Брой мин/макс приложения *Да не се прилага върху сладка царевича			
141.	ЛУМАКС 375 Синджента Кроп Протекшън А.Г., Швейцария Разрешение №01029- ПРЗ-3/05.02.2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед № РД 11- 128/18.01.2018 г.	s-метолахлор 375 г/л тербутилазин 125 г/л мезотрион 37,5 г/л	300 - 400 мл продукт/дка	Царевича Срещу едногодишни широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-14 (сухо семе-четвърти разтворен лист) *Вода л/дка Мин/макс - 20-30 л/дка * Брой мин/макс приложения - 1	-	-	втора професио нална
142.	МАГНЕТО СЛ Ню Фарм Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до:26.04.2015г. *	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ					
143.	МАЗА 4 СЛ Шарда Кропкем Лтд / Sharda Cropchem Ltd Разрешение № 01523- ПРЗ-2/01.03.2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11- 2543/29.11.2017 г. Заповед №РД 11- 333/23.02.2018 г.	имазамокс 40 г/л	125 мл/дка	Хибриди слънчоглед, толерантни на хербициди съдържащи имидазолинони/ имазамокс Срещу широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (първа двойка листа- осми лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	-	-	втора професио нална
144.	МАТОН 600 ЕК НюФарм -Удостоверение №	600 г/л 2,4 Д естер		Срещу широколистни плевели при:	375		3
			110 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	0546/30.01.2009 г. Валидно до: *		120-150 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
145.	МЕЗМЕР 48 СК Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01378 – ПРЗ-1/ 15.02.2016г. Валидно до: 31.07.2017 г. * Заповед №РД 11- 182/03.02.2016 г.	мезотрион 480 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, вкл. кокоше и кръвно просо (<i>Echinochloa crus-galii</i> и <i>Digitaria sanguinalis</i>)		-	втора професионална
			20-30 мл/дка	Царевича за зърно и силаж * Не се прилага при сладка царевича и при семепроизводство на царевича * Да не се прилага чрез въздушно пръскане.			
146.	МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК Байер България ЕООД Удостоверение № 01127/18.05.2011 г. Валидно до:09.05.2021г. Заповед № РД 11 – 365/09.05.2011 г	240 г/л изоксафлугол	42 мл/дка	Царевича за зърно и силаж – прилага се след сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата, Срещу едногодишни житни и широколистни плевели.	>5000	-	2
147.	МЕТСУРАМ 200 ВГ /РИКОРСО Ротам Агрокемикъл -Удостоверение №01076-ПРЗ/ 16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон-метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист			
148.	МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД /САМСОН ЕКСТРА 6 ОД /ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД /НИШИН ЕКСТРА 6 ОД/ / ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД/ ДАИЧИ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-ПРЗ -4/	60 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, включително балур от семена и коренища и някои широколистни плевели при:	>5000	-	2
			65-75 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Царевича – внася се във фаза 1-8 лист на културата, 2-4 лист на плевелите или височина на балура 15-25 см. Максимален брой приложения: 1			

	03.08.2015 г. Валидно до: 28.11.2023 г.						
149.	МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148/12.07.2013г. Валидно до: 27.02.2022 г.	Второ търговско име на . ХЕМНИКО 24 СК					
150.	МОДАОН 4 Ф Фейнхими Швевда -Удостоверение № 176-2/28.08.2013 г. Валидно до : *	480 г/л бифенокс		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	>5000	-	3
			150 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата			
			100 мл/дка	Рапица – внася във фенофаза 4-8 лист на културата			
151.	МОНСУН АКТИВ ОД Байер КропСайанс АД - Удостоверение №01255–ПРЗ-2/16.06.2015г. Валидно до: 30.06.2025 г. Заповед №РД 11-1058/03.07.2014г.	31,5 г/л форамсулфурон - натрий 10 г/л тиенкарбазон-метил 15 г/л ципросулфамид (антидот)		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	> 5.000	-	1
			150 мл/дка	Царевича: Приложение разтваряне на втори-осми лист (ВВСН 12-18)			
			75 мл/дка	Царевича: брой приложения -2 1) втори лист-трети лист (ВВСН 12-13); 2)пети-осми лист (ВВСН 15-18)			
				Срещу балур от коренища (<i>Sorghum halepense</i>) при			
			200 мл/дка	Царевича: Приложение - разтваряне на втори- осми лист (ВВСН 12-18)			
152.	МУСТАНГ 306,25 СК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 156/05.01.2005 г. Валидно до:*	6,25 г/л флорасулам+ 300 г/л 2,4 Д естер		Срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1593	65	3
			40 мл/дка или 60 мл/дка	Царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)			
			60-80 мл/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата			
153.	МИШЪН 200 СЛ Агри Кем Б.В.,	дикват 200 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		Картофи -10; ябълка,	втора професия

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Холандия Разрешение № 01416 – ПРЗ- 1/07.06.2016г. Валидно до: 30.06.2018 г. Заповед №РД 11- 952/31.05.2016 г.		330-500 мл/дка 200-250 мл/дка 400 мл/дка 300-350 мл/дка	Ябълка, Круша, дюля, Праскова, Кайсия, череша, вишна, Слива, Бадем, Лешник, Фисташка, Кестен, Орех, Маслини (за зехтин), Лозя Срещу кускута (<i>Cuscuta</i> spp.) Люцерна, Детелина За десикация Картофи Люцерна (семепроизводство)		круша, дюля, праскова, кайсия, череша, вишна, Слива, Бадем, Лешник, Фисташка, Кестен, Орех, Маслини (за зехтин), Лозя -30; останалите не се изисква	нална
154.	НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г.	Второ търговско име на ЛЕОПАРД 5 ЕК					
155.	НАСА 360 СЛ Агрива С.А. България Разрешение №0031 – ПРЗ- 4/06.03.2017г. Валидно до: 28.12.2012г. * Заповед № РД 09- 791/28.12.2002 г. Заповед №РД 11- 287/08.02.2017 г. Гратисен период 6 месеца за продажба и разпространение и още 1 година за съхранение и употреба, считано от 08.02.2017г. на ПРЗ НАСА 360 СЛ разрешен за пускане на пазара и употреба и <u>етикетиран</u> в съответствие с	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: Овощни градини Лозя Свободни площи (стърница) Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели	5600	30	3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Удостоверение № 0031-ПРЗ-3/04.05.2012 г.						
156.	НEMACОЛ 510 Таминко -Удостоверение № 363/08.06.2006 г. Валидно до:*	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	Галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилиум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена – за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилено	896	-	1
157.	HEPO EK Хеминова А/С, Дания Разрешение№ 01496 – ПРЗ-1/07.09.2017 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед № РД 11-1668/10.08.2017 г.	петоксамид 400 г/л кломазон 24 г/л	300 мл/дка	Зимна маслодайна рапица При едногодишни широколистни и житни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 След сеитба преди поникване на културата Приложение до 5 дни след сеитба.	-	-	втора професионална
158.	НИКОГАН 4 СК АДАМА Агрикълчър БВ Разрешение № 01129-ПРЗ-2/31.10.2017 г. Валидно до: 09.05.2021г. Заповед № РД 11-2035/17.10.2017 г.	40 г/л - никосулфурон		Срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде)	>2000	-	Втора професионална
			125 мл/дка	Царевница – прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели			
	НИКОГАН 4 СК Аган Кемикъл -Удостоверение № 01129-ПРЗ/18.05.2011 г. Валидно до:	40 г/л никосулфурон	125 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и черно куче грозде) Царевница – прилага се по време на			3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	09.05.2021г.			вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели			
159.	НИКО Сапек агро С. А Разрешение № 01329 – ПРЗ- 2/11.01.2017г. Валидно до: 31.12.2019 г.	Второ търговско име на НИКОЗЕА ОД					
160.	НИКОЗЕА ОД/НИКО Сапек агро С. А Разрешение № 01329 – ПРЗ- 2/11.01.2017г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11-1106/24.06.2015 г. и Заповед №РД 11-2496/15.12.2016 г.	никосулфурон - 40 г/л	100 -150 мл/дка 1) 100 мл/дка 2) 50 мл/дка Да не се прилага при сладка царевица и при семе-производство. В случай на продължителен период на никнене на плевелите максималната доза може да бъде достигната чрез две приложения Първото - с доза 100 мл продукт/дка, а второто - с 50 мл .продукт	Едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели Царевица (за зърно и силаж) *Прилага се във фаза ВВСН 12 – 18 (разтваряне на 2-ри лист – разтваряне на 8-ми лист)			непрофесионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			/дка и интервал между третиранията 7-10 дни.				
				Срещу едногодишни и многогодишни житни и някои широколистни плевели		-	непрофесионална
			100-150 мл/дка	Царевича (за зърно и силаж) :еднократно прилагане			
			1) 100 мл/дка + 2) 50 мл/дка	Царевича (за зърно и силаж) еднократно прилагане Двукратно прилагане през 7-10 дни			
161.	НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД					
162.	НИШИН ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
163.	НОМИНЕ 400 СК Кумий кемикъл -Разрешение № 392 – ПРЗ -2/ 15.02.2016г. Валидно до: 31.07.2022 г. Заповед №РД 11-180/03.02.2016 г.	408 г/л биспирибак-содиум		Срещу Кокошо просо (<i>Echinochloa crus – galli</i>), Кокошо просо оризово (<i>Echinochloa phyllopogon</i>), Морски болбосхъонус (<i>Bolboschoenus maritimus</i>), Живовлековидна лаваница (<i>Alisma plantago-aquatica</i>), (<i>Heterantheria reniformis</i>), (<i>Lindernia Diffusa</i>) (<i>Limnophila sessilifolia</i>), (<i>Murdannia keisak</i>), (<i>Schoenoplectus mucronatus</i>)	>5000	-	втора професионална
			6 - 7,5 мл./дка	Ориз * Прилага се с 100 мл/дка адювант Биобауър			
164.	НУФЛОН СК Белхим Кроп	450 г/л линурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:		-	1

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Протекшън -Удостоверение № 01197-ПРЗ/ 19.11.2103г. !Считано от 07.06.2017 г., се определят 6 месеца за продажба и разпространение и срок за съхранение и употреба на съществуващи наличности от продукта за растителна защита НУФЛОН СК до 03.06.2018г.		100 - 200 мл/дка	Фасул и грах			
			100 - 160 мл/дка	Картофи			
165.	ОКСИГАН 240 ЕК Аган Кемикъл Удостоверение № 278-ПРЗ-2/31.07.2012 г.	Второ търговско име на ГАЛИГАН 240 ЕК					
166.	ОКСО 337 ЕК Байер КропСайънс, Франция Разрешение № 01456 – ПРЗ-1/ 17.11.2016 г. Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед №РД 11- 2016/20.10.2016 г.	бромксинил - октаноат – 262 г/л темботрион – 50 г/л изоксадифен- етил – 25 г/л (антидот)		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професио нална
			100 мл/дка	Царевича, сладка царевича –еднократно приложение *ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист; Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист + 100 мл/дка прилепите Мера			
			2 x 75 мл/дка (общо 150 мл/дка)	Царевича, сладка царевича - двукратно приложение (дозата не трябва да надвишава 150 мл/дка) * ВВСН 12-18 Разтваряне на втори лист – разтваряне на осми лист;Фаза на плевелите – за житните плевели:2-3-ти лист; за широколистните: 2-4-ти лист Интервал между третиранията 7-14 дни			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

167.	ОМНЕРА ОД ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 01502-ПРЗ- 2/12.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2022 г. Заповед № РД 11- 1842/05.09.2017 г. Заповед №РД 11- 379/01.03.2018 г.	флуроксипир - 135 г/л метсулфурон- метил - 5 г/л тифеенсулфу- ро-метил – 30 г/л	75-100 мл/дка	Зимни житни култури (пшеница, ечемик, ръж, тритикале, овес, твърда пшеница) ▪ При широколистни плевели се внася във фаза ВВСН 20-39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) * Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	-	-	втора професионална
			75-100 мл/дка	Пролетни житни култури (пшеница, ечемик, овес, твърда пшеница) ▪ При широколистни плевели се внася във фаза ВВСН 12-39 (два листа разтворени - фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) * Дозата от 75 мл/дка е приложима само за силно чувствителните плевели *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка	-	-	
168.	ОНИКС Ширм Гмбх Дивижън Сидеко, Германия / Schirm GmbH Division Sideco, Germany Разрешение № 01585- ПРЗ-1/05.06.2018 г. Валидно до: 31.12.2031 г. Заповед № РД 11- 913/30.05.2018 г.	пиридат - 600 г/л		Срещу едногодишни широколистни плевели	-	-	втора професионална
			150мл/продукт/ дка	Царевича Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	-	-	
			75 мл/дка	Царевича Внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен 2-ри лист-разтворен 8-ми лист) на културата *Брой мин/макс приложения – 2 *Интервал между приложенията – 7 дни *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка	-	-	
169.	ОПТИКА ТРИО НюФарм -Удостоверение № 0548/30.01.2009 г. Валидно до:28.12.2012г. *	130 г/л мекопроп-П 310 г/л дихлорпроп-П 160 г/л МЦПА		Срещу: широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1083	-	2
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите	-	-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

170.	ОРДАГО СК Адама Аган ООД, Израел Разрешение № 01517 –ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до : 31.07.2019 г. Заповед № РД 11- 2123/19.10.2017 г.	Пендиметалин 400 г/л	Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели				втора професио нална.	
			300-500 мл/дка	Пшеница, ечемик Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			300-500 мл/дка	Царевица Внася се преди поникване или скоро след поникване на културата (1-3 лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Артишок Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Домати Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Зеле Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Броколи Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Карфиол Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-
			250-400 мл/дка	Лук (директна сеитба) Внася се преди поникване или скоро след поникване (ВВСН 12-14) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40				-

			250-400 мл/дка	Лук (от арпаджик) Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Чесън Внася се преди поникване или скоро след поникване (ВВСН 10-13) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Фасул и грах Внася се преди сеитба или преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			250-400 мл/дка	Целина Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Слънчоглед Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Соя Внася се преди сеитба *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Картофи Внася се преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Пипер Внася се преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Тютюн Внася се преди разсаждане или след разсаждане между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300 мл/дка	Тютюн Внася сепри поява на първите цветове		21	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			300-500 мл/дка	*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури През цялата вегетация *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Памук Внася се преди сеитба или преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
			300-500 мл/дка	Ягоди Внася се преди засаждане или след засаждане до края на зимния покой *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-40		-	
171.	ОСОРНО СК Глобахем Н. В., Белгия Разрешение № 01549- ПРЗ-1/05.02.2018 г Валидно до: 31.07.2018 г. Заповед № РД 11- 126/18.01.2018 г.	мезотрион - 100 г/л	75 - 150 мл/дка	Царевича за фураж и зърно Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 11-40	-	-	
172.	ПАМПА ПРЕМИУМ 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-ПРЗ -4/ 03.08.2015 г. Валидно до: 28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
173.	ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Заповед №РД 11- 607/19.04.2016 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40					
174.	ПАЛАС 75 ВГ Дау Агросайънсис експорт –Франция Удостоверение № 01118-3/28.08.2013 г.	75 г/кг пироксулам		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	-	3
			20 г/дка; 25 г/дка	Пшеница – внася се във фаза братене на културата (ВВСН 23-29), 3-5 лист (начало			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Валидно до: *			на братене на житните плевели) и 2-4 до 6-8 лист на широколистните плевели			
175.	ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК					
176.	ПАНТЕРА 40 ЕК /РАНГО 40 ЕК /ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г. Валидно до:*	40 г/л квизалофоп-П- тефурил	80 мл/дка	Срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик при: Рапица – внася се във фаза 1-3 лист на самосевките и 3-5 лист на плевелите	1140	60	3
			150 мл/дка	Срещу едногодишни житни плевели при: Слънчоглед Соя Захарно цвекло Домати			
			175 мл/дка	Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: Слънчоглед Домати Тютюн (ориенталски и едрolistен)			
			250 мл/дка	Соя Захарно цвекло Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
177.	ПАСИФИК СЛ Ню Фарм Удостоверение № 01066-ПРЗ- 2/26.05.2011 г. Валидно до: 26.04.2015г. *	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ					
178.	ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР Байер България ЕООД Удостоверение № 578-2/19.03.2012 г. Валидо до:	30 г/кг мезосулфурон+ 10 г/кг йодосулфурон+ 90 г/кг антидот (мефемпир- диетил)		Срещу едногодишни житни и широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>2000	-	3
			35 г/дка+ 70 мл/дка Биопауър	Пшеница – внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	13.04.2009 г. * Заповед №РД 09-231/13.04.2006 г.						
179.	ПАСИФИКА ЕКСПЕРТ Байер С.А.С Разрешение № 01401 – ПРЗ-1/10.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2017 г. * Заповед №РД 11-688/22.04.2016 г.	амидосулфурон – 50 г/кг йодосулфурон-метил-натрий – 10 г/кг мезосулфурон-метил – 30 г/кг + Мефенпир-диетил (антидот) – 90 г/кг		Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална
			50 г/дка	Зимна пшеница (твърда и мека) Ръж Тритикале: внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел			
			30 г/дка	Пролетна пшеница (твърда и мека): внася се във фаза ВВСН 13 – 32 - 3 листа разтворени до вторият възел е най-малко на 2 см над първия възел			
180.	ПЕЛИКАН ДЕЛТА Хеминова А/С, Дания Разрешение № 01417 – ПРЗ-1/07.06.2016 г. Валидно до: 30.06.2017 г. * Заповед №РД 11-947/31.05.2016 г.	дифлуфеникан - 600 г/л метсулфурон-метил – 60 г/л		Едногодишни и многогодишни широколистни плевели		-	втора професионална
			10 г/дка	Обикновена и твърда пшеница			
			10 г/дка	Зимен ечемик			
			10 г/дка	Пролетен ечемик			
			10 г/дка	Ръж Тритикале			
181.	ПЕНДИНОВА Ширм ГмбХ, Германия Разрешение № 01510 – ПРЗ-1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед №РД 11-2130/19.10.2017г.		400-600 мл/продукт/дка	Пшеница, ечемик,ръж, ориз (сеитба на сухо) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13) *Вода л/дка Мин/макс 20-60 л/дка		-	втора професионална
			При ориз 400-510 мл/продукт/дка				
			400-600 мл/продукт/дка	Царевича Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-12) *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			300-500 мл/продукт/дка	Аспержи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди прорастване на културата, по време на покой *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		28	
			300-500 мл/продукт/дка	Артишок Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - внася се преди засаждане/ разсаждане *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			300-600 мл/продукт/дка	Пипер, домати, патладжан Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване или преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			300-600 мл/продукт/дка	Зеле, карфиол, броколи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		90	
			400-600 мл/продукт/дка	Моркови Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		140	
			300-500 мл/продукт/дка	Лук Срещу едногодишни житни и широколистни плевели- внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13)		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Чесън Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата (ВВСН 00-09) или веднага след поникване (ВВСН 10-13) *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			400-600 мл/продукт/дка	Грах, фасул Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Бакла, грах, нахут Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка			
			300-500 мл/продукт/дка	Марули, цикория, ендивия Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди разсаждане на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		75	
			400-600 мл/продукт/дка	Слънчоглед, соя, фъстъци Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Картофи Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - преди поникване на културата *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Тютюн Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди или след разсаждане на културата между редовете *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

			300-400 мл/продукт/дка	Декоративни култури: разсадник, дървета (топола) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди разсаждане-третиране цяла площ; след разсаждане насочено третиране *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			300 мл/продукт/дка	Житни треви за семена Срещу едногодишни житни и широколистни плевели - След поникване само при създаване на пасище, при 6 братя/растение *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Лозя Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Семкови: ябълки, круши Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Костилкови: праскова, нектарина, кайсия Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внасят се в периода на покой (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
			400-600 мл/продукт/дка	Цитрусови култури (портокал, лимон, лайм, грейфрут и всички други цитрусови хибриди) Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се през пролет/есен (преди поникване на плевелите) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			400-600 мл/продукт/дка	Памук Срещу едногодишни житни и широколистни плевели – внася се преди поникване или преди разсаждане *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-60 л/дка		-	
182.	ПЕНДИСТАР 40 СК/ПЕНКОТ 40 СК/ПЕНДИ 40 СК/БУЛПЕН 40 СК Шарда Кропчем Лимитед , Индия Разрешение №01280 –ПРЗ-5/05.02.2018 .г Валидно до: 31.07.2019 г. Заповед № РД 11- 1983/10.12.2014 г., Заповед № РД 11- 1660/06.11.2015 г., Заповед № РД 11- 2505/16.12.2016 г. и Заповед № РД 11- 850/24.04.2017 г. Заповед № РД 11- 119/18.01.2018 г.	пендиметалин – 400 г/л	300-500 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Слънчоглед, царевица- Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	втора професионална -
			300-500 мл/дка	Фасул- *След сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Соя Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Моркови, ряпа Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Аспержи *След сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		28	
			300-500 мл/дка	Картофи Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			300-500 мл/дка	Тютюн Внася се преди разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Пипер Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-500 мл/дка	Марули *След сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		75 дни	
			250-500 мл/дка	Ендивия Внася се ССПП или преди разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		75 дни	
			250-500 мл/дка	Карфиол Внася се преди разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-410 мл/дка	Цикория Внася се преди разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		75 дни	
			200 мл/дка	Козя брада Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300 мл/дка	Лупина Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Памук Внася се ССПП или преди разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			230-300 мл/дка	Топола Внася се след разсаждане		Ограничен от фазата на	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				*Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		приложение	
			330-500 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) Внася се в периода на зимен покой *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Ябълки, круши Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Кайсии, праскови,нектарини Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Овощни разсадници Внася се преди или след разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) Внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			330-500 мл/дка	Фъстъци Внася се след сеитба, преди поникване (ССПП) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			250-600 мл/дка	Декоративни растения и разсадници Внася се преди или след разсаждане *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80		Ограничен от фазата на приложение	
			170-330 мл/дка	Трeви за семена AGSTE ALOPR ARRAL CYXCR		Ограничен от фазата на приложение	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				DECCA, LOLSS PHLPR POASS FESSS AGSST Да не се прилага при треви за храна на животните Внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя /растение) *Брой приложения мин/макс – 1 *Вода л/дка – 20-80			
183.	ПЕНДИ 33 ЕК/ Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279–ПРЗ-3/14.02.2017г.	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК					
184.	ПЕНДИ 40 СК Шарда Кропчем Лимитед, Индия Разрешение№01280 – ПРЗ-5/2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г.	Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК					
185.	ПЕНДИГАН 330 ЕК Аган Кемикъл-Удостоверение №01074-2/06.12.2012г** Валидно до: 05.03.2020 г. Заповед №РД 12-21/05.03.2010г. Заповед №РД 11-1446/03.12.2012г.	330 г/л пендиметалин		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	1050	Ориз-90	непрофесионална
400 мл/дка	Царевича , след сеитба преди поникване;						
400-600 мл/дка	Царевича , след поникване във фаза ВВСН 10 – 14, приложен с 20-40 л/вода/дка;						
400-600 мл/дка	Слънчоглед , след сеитба преди поникване, приложен с 20-40 л/вода/дка;						
400 мл/дка	Тютюн , след сеитба преди поникване;						
400-600 мл/дка	Тютюн - преди разсаждане или след разсаждане, междуредово във фаза ВВСН 17, приложен с 20-40 л/вода/дка;						
450 мл/дка	Ориз (суха почва) - преди разсаждане, приложен с 20-50 л/вода/дка;						
400 - 600 мл/дка	Овощни градини - след поникване (Преди цъфтеж) приложен с 20-40 л/вода/дка;						

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			300-500 мл/дка	Домати – преди разсаждане или след разсаждане, междуредово, до фаза ВВСН 20, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400- 600 мл/дка	Картофи - преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			300- 500 мл/дка	Лук I, II година - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400 – 600 мл/дка	Чесън - внася се след сеитба, преди поникване или във фенофаза ВВСН 11 – 13, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
186.	ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ /АКТИВУС Адама Аган, Израел Разрешение №01288 – ПРЗ-3/04.05.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД11-2037/18.12.2014 г., Заповед №РД 11-1658/06.11.2015 г. и Заповед №РД 11-827/24.04.2017 г. Разрешение № 01288 – ПРЗ-2/18.11.2015 Валидно до : 31.07.2017г. *	пендиметалин - 330 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		90	втора професионална
			0,4 л/дка	Пшеница - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,4 л/дка	Ечемик - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,4 л/дка	Ръж - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата		90	
			0,53 л/дка	Царевича - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата		Не се прилага	
			0,53 л/дка	Слънчоглед - Преди поникване на културата		75	
			0,4 л/дка	Чесън - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата		Не се прилага	
			0,53 л/дка	Граха - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,53 л/дка	Картофи - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,3 л/дка	Соя - Преди сеитба или преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,4 л/дка	Лук - Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза ВВСН 10-13 на културата		Не се прилага	
			0,530 л/дка	Тютюн - Преди разсаждане на културата		Не се прилага	
			0,400 л/дка	Тревни площи - След поникване на		Не се прилага	

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				културата. Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона			
			0,450 л/дка	Объл артишок - Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието		60	
			0,275 л/дка	Карфиол - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Броколи - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Главесто зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Брюкселско зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,360 л/дка	Нахут - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Фасул - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Копър - Преди или след поникване на културата		75	
			0,275 л/дка	Патладжан - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Пипер (зеленчукова култура) - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Домати - Преди разсаждане на културата		75	
			0,450 л/дка	Ориз (засят в суха почва) - Преди засяване на културата		90	
			0,450 л/дка	Топола - След засаждане		Не се прилага	
			0,275 л/дка	Украсни (декоративни) култури (включително разсадници)		Не се прилага	
187.	ПЕНКОТ 33 ЕК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279-ПРЗ- 3/14.02.2017г.	Второ търговско име на ШАРПЕН 33 ЕК					
188.	ПЕНКОТ 40 СК Шарда Кропчем Лимитед Шарда Кропчем Лимитед , Индия	Второ търговско име на ПЕНДИСТАР 40 СК					

	Разрешение № 01280 – ПРЗ-5/05.02.2018 г. Валидно до: 31.07.2019 г.						
189.	ПИК 75 ВГ Синджента -Удостоверение № 01031-ПРЗ-1/ 18.02.2010 г. Валидно до: *	750 г/кг просулфурон		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	1000-2000	Зърно -не се Изисква; 60 -фураж	Първа професионална
			1,5 г/дка+ 0,2 % Атиплюс с 20 л/дка работен разтвор	Царевича – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите			
190.	ПИТОН 75 ВДГ ГАТ Макроенкапсютлейшън АГ -Удостоверение № 01078-3/21.10.2011 г. Валидно до : 13.10.2021г.	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ					
191.	ПЛЕДЖ 50 ВП Сумитомо Кемикъл Агро Юръп -Удостоверение № 543/18.10.2007 г. Валидно до: *	500 г/кг флумиоксазин		Срещу широколистни и някои житни плевели при:	5000	-	3
			8 г/дка	Слънчоглед Царевича Внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата			
192.	ПОЙНТЕР УЛТРА ДюПонт Ю ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 01058-ПРЗ-3/12.03.2018 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	Второ търговско име на АЛАЙ МАКС					
193.	ПОЛИМЕР ВГ Ню Фарм С.А.С. -Разрешение № 1186-ПРЗ/04.07.2016 г.. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11-	Второ търговско име на АЛИАНС ВГ					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	1050/14.06.2016 г.						
194.	ПРИНЦИПАЛ ДюПонт ИО -Удостоверение № 01109- ПРЗ/02.11.2010 г. Валидно до: 19.10.2020 г.	429 г/кг никосулфурон+ 107 г/кг римсулфурон		Срещу едногодишни житни и много- годишни житни (в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни плевели при:	5000	-	3
			9 г/дка+ Тренд 90 – 0,1 %	Царевича за зърно и силаж (фураж), внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15- 25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели			
195.	ПРЕМАЗОР СД Глобахем НВ, Белгия Разрешение № 01550- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед № РД 11- 139/18.01.2018 г.	дифлуфеникан - 500 г/л	25 мл/дка	Пшеница (зимна) Срещу едногодишни широколистни плевели- внася се до до ВВСН 29 Край на братенето *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	втора професио нална
			37,5 мл/дка	Пшеница (пролетна) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се във фаза До ВВСН 29 Край на братенето *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	
			25 мл/дка	Ечемик (зимен) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се до ВВСН 29 Край на братенето *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	
			25 мл/дка	Ръж (зимна) Срещу едногодишни широколистни плевели – внася се до ВВСН 29 Край на братенето *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	
			37,5 мл/дка	Ръж (пролетна) Срещу едногодишни широколистни плевели - се до ВВСН 29 Край на братенето *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка - 20-40 л/дка	-	-	
196.	ПРЕМАЗОР ТУРБО Глобахем НВ, Белгия Разрешение № 1566-	глифозат 250 г/л дифлуфеникан 40 г/л	700 мл/дка	Неселскостопански приложения - пътни артерии и индустриални площи – срещу плевели – внася се във фаза преди или след поникване на плевелите	-	-	Втора професио нална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	ПРЗ-1/14.03.2018 г. Валидно до: 15.12.2018 г. Заповед № РД 11-427/09.03.2018 г.			*Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс - 20-100 л/дка			
197.	ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ ДюПонт ИО - Удостоверение № 01170/05.03.2013г. Валидно до: 18.02.2023г.	92 г/кг никосулфурон + 23 г/кг римсулфурон + 552 г/кг дикамба	44 г/дка.+ 0,1 % Тренд 90	Срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и широколистни плевели, при: Царевича за зърно и силаж (не –при захарна царевича и за пуканки и за семепроизводство– от 2ри до 6ти лист на културата (5000	-	3
198.	ПРОЛ АКВА БАСФ Агро Б.В., Швейцария Разрешение №01554-ПРЗ-1/12.03.2018 г. Валидно до: 14.08.2019 г. Заповед № РД 11-365/28.02.2018 г.	пендиметалин – 455 г/л		Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели		60	втора професионална
			350 мл/дка	Царевича – внася се във фаза началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка			
			350 мл/дка	Слънчоглед – внася началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка			
			350 мл/дка	Памук – внася се след сеитба/засаждане, преди поникване *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка			
			350 мл/дка	Лук (от арпаджик) - началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка			
			350 мл/дка	Нахут – внася се след сеитба/засаждане, преди поникване *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка			

			350 мл/дка	Тютюн – преди разсаждане на разсада на полето – внася се след сеитба/засаждане, преди поникване *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка		-	
			350 мл/дка	Кориандър – внася се след сеитба/засаждане, преди поникване *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка		75	
			350 мл/дка	Картофи - внася се след сеитба/засаждане, преди поникване *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 30 – 40 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Ръж - внася се след сеитба, преди поникване на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			300-350 мл/дка	Слънчоглед, Царевица – внася се във фаза След сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка Забележка: В зависимост от съдържанието на органично в-во впочвата		60	
			250-300 мл/дка	Фасул, Грах (полски и градински) – внася се след сеитба, преди поникване на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Соя - след сеитба, преди поникване на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	

			250-300 мл/дка	Ябълки Круши Праскови Нектарини Кайсии – внася се през зимата. насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Портокали Лимони Мандарини Помело Грейпфрут – внася се През пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
				Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета - насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Лозя – внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата (преди началото на вегетация) *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка Забележка: Да не се използват лозови листа за храна		-	
			250-300 мл/дка	Ягоди – внася се преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Домати - внася се преди разсаждане на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Маруля Салати - внася се преди поникване на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	

			250-300 мл/дка	Зеле, Броколи, Карфиол - внася се преди разсаждане на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			250-300 мл/дка	Чесън - внася се след засаждане на културата, преди появата на стъблото *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			200-250 мл/дка	Моркови - внася се преди поникване на културата *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		-	
			200-250 мл/дка	Артишок - внася се преди разсаждане или при засети насаждения преди начало на вегетация *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка			
			260 мл/дка	Минимални употреби Сорго – внася се преди или рано след поникване, до ВВСН 16 на културата (шест разтворени листа) *Брой макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20 – 60 л/ дка		120 дни (зърно); 90 дни (силаж и зелен фураж)	
199.	ПРОМАН / СОЛЕТО Фитюръп С.А., Франция Разрешение № 01362–ПРЗ-3/03.08.2016 Валидно до: 31.12.2025 г Заповед № РД 11-1934/30.12.2015 г. Заповед №РД 11-625/19.04.2016 г. и Заповед №РД 11-1300/19.07.2016 г.	метобромурон – 500 г/л	400 мл/дка	Срещу широколистни и някои едногодишни житни плевели: Картофи		-	втора професионална
200.	ПУЛСАР 40 /ЛИСТЕГО 40	40 г/л имазамокс		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5000	слънчоглед , люцерна	втора професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	/ ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Разрешение № 0210 – ПРЗ-5/ 09.05.2016 г. Валидно до: * Заповед №РД 11- 607/19.04.2016 г.		120 мл/дка	Слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) – внася се във фаза 2-6 лист на културата; Люцерна млада – внася се един месец след засяване		млада - 90; Ориз – не се изисква	нална
			120 мл/дка + 230 мл/дка Стомп нов 330 ЕК	Слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) внесени едновременно във фаза 2-6 лист на културата			
			125 мл/ дка	Ориз –(Clearfield/Клиърфийлд толерантни хибриди) ВВСН 12-22 (2 листа разтворени до забележими 2 братя)			
			87,5 мл/ дка	Ориз (Clearfield/ Клиърфийлд толерантни хибриди)- ВВСН 13-14 (3-4 разтворени листа)			
201.	ПУЛСАР ПЛЮС БАСФ Агро Б.В. Разрешение №01458 –ПРЗ- 1/08.02.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. * Заповед № РД 11- 144/23.01.2017 г.	имазамокс 25 г/л	120-200 мл/ дка	Слънчоглед (Клиърфийлд плюсхибриди)- Срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка (<i>Orrobanche spp.</i>) *При силно нападение, срещу по- развити или трудно унищожими плевели да се прилага по високата доза 200 мл/дка. *Не се разрешава сеитба на рапица и други култури от сем. Кръстоцветни и захарно цвекло 12 месеца след третиране с продукта		-	втора професио нална
202.	ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ Байер КропСайънс АГ, Германия - Разрешение № 0565 – ПРЗ -2/ 08.02.2016г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11-	69 г/л феноксапроп- П-етил + 75 г/л мефенпир- диетил (антидот)		Срещу Лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Див овес (<i>Avena fatua</i>), тръстичина/двуцветно сорго (<i>Phalaris spp.</i>), Обикновена метлица (<i>Poa trivialis</i>), Ветрушка (<i>Apera spica venti</i>)	> 5.000	-	втора професио нална
			100 мл/дка	Пшеница и ечемик: прилага се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени – Край на братенето. Видими са максимален брой братя (есен).Прилага се във фенофаза втори лист-братене на плевелите:			

	160/29.01.2016 г.		120 мл/дка	Пшеница и ечемик: прилага се във фаза ВВСН 13-31 3 листа разтворени –първият възел е поне на 1 см над възела на братене(пролет).Прилага се във фенофаза втори лист-братене на плевелите:			
203.	РАНГО 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК					
204.	РАУНДЪП ЕНЕРДЖИ Разрешение № 01357–ПРЗ- 1/ 04.01.2016г. 2/20.09.2016 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11- 1869/11.12.2015 г. Заповед №РД 11- 1706/14.09.2016 г.	глифозат 450 г/л (под формата на калиева сол 551 г/л)	80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Корено/клубеноплодни (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, царевица: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране преди сеитба/разсаждане. Третране – минимум 6 часа преди разсаждане. При зеленчукови култури и доза над 320 мл продукт/дка третиране минимум 7 дни преди сеитба		корено/клубеноплодни (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, царевица	непрофесионална
			80-470 мл/дка	Аспержи, зърнени култури, царевица, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели * Третиране след засаждане преди поникване. При зърнени култури, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици за цветя да се прилага до 3 дни след засяване/ засаждане.При аспержи да се прилага преди поникване на пъпките			
				Кореноплодни/ грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови култури (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевица, рози:			

			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране след за-саждане (в културите), Между-редово прило-жение/ Само селективно оборудване с ограничители. Да се избягва контакт с културата		(моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови култури (грах, боб, бакла зелен фасул), листно- стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевича, рози, лозя, орехи, лешници - 28; бадем, Цитрусови култури, Маслини, Киви, Семкови и костилкови овощни видове – 7; Ориз, Фуражни култури- люцерна, ливади, Пасища, поляни, Незасети земи, Угари, Промислени и градски площи, автомагистра	
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Кореноплодни и грудкови зеленчуци (моркови, картофи захарно цвекло), зеленчуци домати, патладжан, зърнени култури, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Третиране след при-биране на реколтата. При стърнища да се използва веднъж на сезон			
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Лозя (по-стари от 4 години); Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Орехоплодни култури над 4 годишна възраст –Орехи, Лешници, Бадеми Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Насочено пръскане. При бадеми риск от чувствителност дори и при добре развит ствол			
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Цитрусови култури, Маслини, Киви: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Маслини за зехтин: макс. 480 мл /дка. При киви риск от чувствителност дори при добре развит ствол			
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Семкови и костилкови овощни видове: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				* При костилкови овощни риск от чувствителност дори и при добре развит ствол		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Разсадници (цветя, храсти, декоративни растения, топола): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Риск от чувст-вителност дори при добре развит ствол		ли и пътища, ж.п. линни, летищни полоси, тротоари, Употреба в дома и градината, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали - не се изисква
			80 мл./дка	Ориз: - Червен ориз (плевел) (<i>Oryza punctata</i>), Оризов тросък (<i>Leesia oryzoides</i>) *Само със селективно оборудване. Да се избягва контакт с културата. Третиране с неразреден продукт.		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Фуражни култури- люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели *Плевели, по-високи от културата. Да се избягва контакт с културата.		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите		
			80-300 мл/дка 300-500 млдка 500-800 мл/дка	Незасети земи, угари: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели		

			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Промислени и градски площи, автомагистрала и пътища, ж.п. линии, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Оточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			80-300 мл/дка 300-500 мл/дка 500-800 мл/дка	Употреба в дома и градината: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
205.	РАУНДЪП КЛАСИК ПРО Монсанто Европа С.А./Н.В., Белгия Разрешение № 01340 – ПРЗ- 1/19.10.2015 г. 2/20.09.2016 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед №РД 11- 1514/02.10.2015 г. Заповед №РД 11- 1707/14.09.2016 г.	глифозат 360 г/л (под форма на калиева сол 441 г/л)	0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Кореноплодни/грудкови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), ягоди, зеленчуци, зърнени култури, царевича, лен, памук, синап, слънчоглед, соя, маслодайна рапица: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране преди сеитба/разсаждане		При третиране след поникване/разсаждане на кореноплодни /грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок),	непрофесионална
			0,1-1,0 л/дка	Аспержи, зърнени култури, царевича, захарно цвекло, картофи, лук, лен, синап, бобови култури, луковици на цветя: Едногодишни, двугодишни и многогодишни плевели * Третиране след засяване/засаждане, преди поникване на културата			
				Кореноплодни/грудкови зеленчуци (моркови, картофи, захарно цвекло), домати, патладжан, бобови зеленчуци (грах, боб, бакла зелен фасул), листно-стъблени зеленчуци (артишок), соя, царевича, рози:			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			<p>0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка</p>	<p>Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Третиране след поникване/разсаждане на културата *Техника за намазване, навлажняване, пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата</p>		<p>соя, царевица, рози – 28; Лозя – 28; Орех, лешник, бадем, Цитрусуви култури, Семкови и костилкови овощни култури, Маслини – 7; *Третираната растителност да не се използва за храна на животни.</p>	
			<p>0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка</p>	<p>Кореноплодни и грудкови зеленчукови култури (моркови, картофи, захарно цвекло), зеленчукови култури, ягоди, зърнени култури, слънчоглед, соя, лен, памук, синап, разсадници, синап, маслодайна рапица, стърнища: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели</p>			
			<p>0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка</p>	<p>Лозя (по-стари от 4 години): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.</p>			
			<p>0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка</p>	<p>Орех, лешник, бадем: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване при бадем има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол</p>			
			<p>0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка</p>	<p>Цитрусуви култури: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на</p>			

				растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Семкови и костилкови овощни култури: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Маслини: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията.			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Киви: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Разсаждащи се култури (цветя, храсти, декоративни растения, горска топола): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Да не се допуска попадане на продукта върху зелените части и ствола на растенията. *При случайно напръскване има риск от чувствителност дори и при добре развит ствол			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Люцерна; ливади: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			

				* Техника за намазване и навлажняване/ пръскачки с протектор за насочено третиране. Да се избягва контакт с културата			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Пасища, поляни, ливади (обновяване и селективен контрол на инвазивни плевели): Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели * Преди засяване или след прибиране, съобразно стадия на развитие на плевелите			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Незасети земи, Угари: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			0,1-0,4 л/дка 0,4-0,6 л/дка 0,6- 1 л/дка	Помишлени и градски площи, автомагистрала и пътища, ж.п. линии, летищни полоси, тротоари, пешеходни и паркови алеи и други неземеделски площи, отточни и напоителни канали без воден поток: Едногодишни плевели (под 20 см) Двугодишни плевели Многогодишни плевели			
			*Третираната растителност да не се използва за храна на животни.				
206.	РАУНДЪП МАКС СЛ Монсанто Европа СА Удостоверение № 01261-ПРЗ /11.08.2014 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л глифозат – (глифозат под формата на калиева сол-588 г/л)		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:		овощни градини, лозя-7 дни; пшеница, ечемик -14 дни	3
			300-450 мл/дка	Овощни градини (над 3 годишни дървета) Лозя (над 2 години)			
			300 мл/дка	Пшеница и ечемик *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна зрялост на пшеницата			
			450 мл/дка	Ж.П. линии			
			300-450 мл/дка	Напоителни, дренажни канали и стърнища			

207.	РЕГЛОН ФОРТЕ Синджента -Удостоверение № 01032-ПРЗ- 2/05.03..2013 г. Валидно до: *	150 г/л дикват		Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	876	10-картофи; 7-10-маслодайна рапица; 30 за всички останали култури	Първа професионална
			300 мл/дка	Лозя Овощни градини			
			100 мл/дка 150-200 мл/дка 250 мл/дка 250-300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 250 мл/дка 250 мл/дка	Дефолиант/десикант при: Памук Кориандър Слънчоглед Люцерна за семепроизводство Соя Ориз Маслодайна рапица Картофи			
208.	РЕФАЙН ЕКСТРА ФМС Интернешънъл Швейцария Сарл Разрешение № 0538- ПРЗ-4/12.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2016 г.*	Второ търговско име на ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ					
209.	РИКОРСО /МЕТСУРАМ 200 ВГ Ротам Агрокемикъл Удостоверение №01076-ПРЗ/ 16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон- метил		Срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:	>5000	-	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист			
210.	РИНИДИ ВГ Шарда Кропхем Лтд, Индия / Sharda Cropchem Ltd. India Разрешение № 01584- ПРЗ-1/05.06.2018 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 927/30.05.2018 г.	дикамба - 550 г/кг никосулфурон - 92 г/кг римсулфурон - 23 г/кг	44 г продукт/дка	Срещу широколистни и житни плевели Царевича – внася се във след поникване ВВСН 13-19 (разтворен 3-ти лист-разтворен 9-ти лист) *Брой мин/макс приложения -1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка * Да се използва не-йонен адювант 0.1% <u>Продуктът да не се прилага при сладка царевича и при царевича за семепроизводство.</u>	-	-	втора професионална

211.	РОТЕР ВГ Стоктон Кемикъл -Удостоверение №01184- ПРЗ/22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	600 г/кг метсулфурон метил	10 г/ха (1г/дка)	Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: Пшеница	>1200	-	2
212.	САМСОН 4 ОД /ФОРНЕТ 4 ОД /НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	40 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели при :		-	2
			100 - 150 мл/дка	Царевица във фаза разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (ВВСН 12-18)			
			100 мл/дка 50 мл/дка	Двукратно прилагане срещу балур: Прърво третиране Второ третиране 7-10 дни по-късно			
213.	САМСОН ЕКСТРА 6 ОД -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до: 28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
214.	САНАФЕН Дау Агросайънсис -Удостоверение № 215/20.10.2004 г. Валидно до: *	600 г/л 2,4 Д ам.сол		Срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	Царевица – внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	Пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
215.	САТЕЛИТ 360 СЛ Индустриас Афрази -Удостоверение №01162/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	360 г/л глифозат	0.600-1.000 л/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели при овощни видове на повече от 3-4 години –семкови (ябълка и круша) и костилкови (кайсии, праскови, нектарини, череша и сливи) Изчистване на свободни площи (преди засяване)	>2000	-	3
		0.150-0.600 л/дка	Срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели, за пътища, ливади, напоителни канали и противопожарни защитни пояси.				
216.	СИЛБА СК Синджента Разрешение № 01001 – ПРЗ-	Второ търговско име на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	4/16.02.2017г. Валидно до: 31.07.2019г.						
217.	СИРИО 4 СК /КРЮ 4 СК/ АСТРАЛ 4 СК НюФарм САС Разрешение № 01055- ПРЗ-3/04.07.2016г. Заповед №РД 11- 1049/14.06.2016 г. Валидно до:*	40 г/л никосулфурон		Срещу едногодишни житни, балур от коренища и някои широколистни плевели при:	5000	-	непрофес ионална (3)
			125 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата			
218.	СИРТАКИ Оксон Италия С.п.А Разрешение № 01449 – ПРЗ- 1/20.09.2016 г. Валидно до: 31.10.2019 г. Заповед №РД 11- 1712/14.09.2016 г.	кломазон 360 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели:		-	втора професио нална
			25-30 мл/дка	Картофи:			
			30-50 мл/дка	Ориз (засят на сухо)			
			30-50 мл/дка	Ориз (засят във вода)			
			40-50 мл/дка	Тютюн * Трети-рането да се лока-лизира в редовете на культу-рата			
30-40 мл/дка	Соя: След сеитба преди поникване - до ВВСН 01-08 Начало на набъбване на семето до хипокотила достига повърхността на почвата; вижда се извивката на хипокотила; -Рано след поникване – до ВВСН 10-14 Котиледоните са напълно разтворени до разтваряне на трилистник на 4-ти възел						
30 мл/дка							
219.	СУОРД 240 ЕК Адама Аган ООД, Израел - Разрешение№ 01211 – ПРЗ -2/ 12.03.2018г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11- 108/29.01.2014 г. Заповед №РД 11- 381/01.03.2018 г.	240 г/л клодинафоп- пропаргил		При пшеница (във фенофаза ВВСН 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс- 20-40 л/дка		-	втора професио нална
			17мл/дка	Срещу полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) и див овес (<i>Avena spp.</i>)			
			20мл/дка	Срещу тръстичина (<i>Phalaris spp.</i>), пролетно просо (<i>Milium vernale</i>)			
			25мл/дка	Срещу райграс и житна пиявица (<i>Lolium spp.</i>)			
220.	СЕКАТОР ОД	100 г/л амидо-		Срещу Широколистни, включително	>5000	-	втора

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Байер Байер КропСайанс Разрешение № 371-3/07.12.2017 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед № РД 09- 213/06.04.2006 г. Заповед №РД 11- 2559/29.11.2017 г.	сулфурон+ 25 г/л йодосулфурон + 250 г/л антидот (мефемпир- диетил)		устойчиви на хормоноподобни хербициди (2,4-Д, МЦПА) плевели			професио нална
			10 -15 мл/дка	Пшеница Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист - флаговият лист е напълно разтворен)			
			10 мл/дка	Ечемик Внася се във фаза ВВСН 13-39 (3-ти разтворен лист - флаговият лист е напълно разтворен)			
221.	СЕЛЕКТ 240 ЕК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 01122-ПРЗ/01.02.2011 г. Валидно до:*	240 г/л клетодим		Срещу едногодишни житни плевели при:	1630		3
			40 мл/дка	Домати Захарно цвекло Слънчоглед Соя Картофи Фасул			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			80 мл/дка	Домати Захарно цвекло Слънчоглед Соя Картофи Фасул Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10- 20 см височина на балура) Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин, Масло РЗ)			
222.	СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК / ЦЕНТУРИОН СУПЕР/ШАДОУ Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ- 3/16.02.2017г. Валидно до: 26.04.2015г. * Заповед № РД 12- 20/26.04.2005 г.	120 г/л клетодим		Срещу едногодишни житни плевели при:	1360	100	3
			80 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Фасул Картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балура от коренища при:			
			160 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Фасул			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Заповед № РД 11-157/29.01.2016 г. и Заповед №РД 11-276/07.02.2017 г.			Картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
223.	СОЛЕТО Фитюръп С.А., Франция Разрешение № 01362-ПРЗ- 3/03.08.2016 Валидно до: 31.12.2025 г	Второ търговско име на ПРОМАН					
224.	СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ /ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600-3/04.05.2012 г.	69 г/л феноксапроп- П- етил+антидот		Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при: Пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес	>5000	60	3
			100 мл/дка				
225.	СМЕРЧ 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 374/28.08.2006 г Валидно до:*	240 г/л оксифлуорфен		Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при: Слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие Лозя - внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане	5000	45	3
			80 мл/дка				
			80-100 мл/дка				
			150 мл/дка				
226.	СПЕКТРУМ БАСФ СЕ -Удостоверение № 360/26.04.2006 г Валидно до: *	720 г/л диметенамид-П		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: Царевича Слънчоглед Захарно цвекло Соя Картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите	1480	-	3
			80-140 мл/дка				

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

227.	СПРИНГБОК БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01366 – ПРЗ-1/ 08.01.2016 г. Валидно до: 31.10.2017 г. * Заповед № РД 11- 1938/30.12.2015 г.	диметенамид – П - 200 г/л метазахлор – 200 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели, самосевки от житни култури	> 500 < 2000	70	първа професионална
			250 мл/дка	Зимна маслодайна рапица: * На една и съща площ еднократно третиране на 2 години. Еднократно приложение във фенофази ВВСН 00-09 (<i>сухо семе – показване на котиледоните на почвената повърхност</i>) или във фенофази ВВСН 10-18 (<i>напълно оформени котиледони - 9 листа оформени</i>)			
228.	СТАРАНЕ ГОЛД Дау АгроСайънсис С.А.С., Франция -Удостоверение № 01294 – ПРЗ-1/ 19.03.2015 г. Валидно до: 31.12.2016 г. *	флуроксипир – 100,0 г/л флорасулам – 1,0 г/л		Срещу широколистни плевели:		Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), рж (зимна и пролетна), тритикале	втора професионална
			180 мл/дка	Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), рж (зимна и пролетна), тритикале			
			120 мл/дка	Царевича за зърно и силаж * Да не се прилага при сладка царевича и царевича за семепроизводство			
229.	СТОМП® АКВА БАСФ Агро Б.В. -Разрешение № 01011-ПРЗ-4/ 10.05.2016 г. Валидно до:	455 г/л пендиметалин		Едногодишни житни и широколистни плевели:	>5000	Царевича, лук, слънчоглед -60; кориандър 75; нахут 40;	втора професионална
			350 мл/дка	Царевича: внася се в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите			
			350 мл/дка	Слънчоглед: внася се в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

14.08.2019 г. Заповед №РД 12-54/14.08.2009 г. Заповед №РД 11-1982/10.12.2014 г. и Заповед №РД 11-703/22.04.2016 г.			350 мл/дка	Памук: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване	*Сорго-120 дни (зърно); 90 дни (силаж и зелен фураж); останалите култури – неприложим	
			350 мл/дка	Лук (от арпаджик): внася се в начало на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите		
			350 мл/дка	Нахут: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване		
			350 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане на разсада на полето		
			350 мл/дка	Кориандър: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване		
			350 мл/дка	Картофи: внася се след сеитба/засаждане, преди поникване		
			250-300 мл/дка	Пшеница Ечемик Тритикале Ръж внася се след сеитба, преди поникване на културата		
			300-350 мл/дка	Слънчоглед Царевица: внася се след сеитба, преди поникване или в началото на вегетация на културата и до 2-ри лист на плевелите		
			250-300 мл/дка	Фасул, Грах (полски и градински): След сеитба, преди поникване на културата		
			250-300 мл/дка	Соя: внася се след сеитба, преди поникване на културата		
			250-300 мл/дка	Ябълки Круши Праскови Нектарини Кайсии: внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата преди началото на вегетация.		
			250-300 мл/дка	Портокали Лимони Мандарини Помело Грейпфрут: внася се през пролетта и есента. Насочено пръскане между редовете на културата, без да се засягат зелените части на дърветата		
			200-300 мл/дка	Разсадници за дървесни видове, Площи с декоративни дървета: Насочено пръскане между редовете след засаждане и при вкоренени насаждения		
			250-300 мл/дка	Лозя: внася се през зимата. Насочено пръскане между редовете на културата (преди началото на вегетация)		

			250-300 мл/дка	Ягоди: внася се преди разсаждане на открито или преди началото на вегетацията през пролетта			
			250-300 мл/дка	Домати: внася се преди разсаждане на културата			
			250-300 мл/дка	Маруля Салати: внася се преди поникване на културата			
			250-300 мл/дка	Зеле, Броколи, Карфиол: внася се преди разсаждане на културата			
			250-300 мл/дка	Чесън: внася се след засаждане на културата, преди появата на стъблото			
			200-250 мл/дка	Моркови: внася се преди поникване на културата			
			200-250 мл/дка	Артишок: внася се преди разсаждане или при засети насаждения преди начало на вегетация			
			260 мл/дка	* Минимална употреба Сорго: внася се преди или рано след поникване, до ВВСН 16 на културата (шест разтворени листа)			
230.	СТОМП НОВ 330 ЕК БАСФ Агро Б.В. Удостоверение № 01007/06.10.2009 г. Заповед № РД 12-27/30.04.2009 г. <u>Заповед № РД 11-670/17.04.2018 г.</u>	330 г/л пендиметалин		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	>500 <2000	40-нахут, фасул, соя, фъстъци; 60-лук, ягоди, малини, царевица, слънчоглед;; пшеница, ечемик и ориз - 90 дни; кориандър - 75 дни; мента - 75 дни; домати и пипер (разсадни) - 75 дни; царевица и слънчоглед - 60 дни; ягоди и	3
			230 мл/дка+ 40-120 мл/дка Пулсар 40	◆ слънчоглед (клиърфийлд толерантни хибриди) – срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата			
			300-400 мл/дка	◆ гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			400 мл/дка	◆ царевица, слънчоглед, памук, фасул, соя, фъстъци, кориандър - внася се след сеитба, преди поникване на културите			
			400 мл/дка	◆ тютюн - внася се преди разсаждане в доза 400 мл/дка			
			400 мл/дка	◆ menta - преди или след разсаждане			
			400 мл/дка	◆ ягоди - внася се рано на пролет, след първата обработка на почвата			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	наличности от продукта за растителна защита СТОМП НОВ 330 ЕК.		400 -500 мл/дка	◆картофи, лук I, II год. - след сеитба (засаждане), преди поникване на културите в доза		малини - 60 дни; лук - 60 дни; соя, фъстъци, нахут и фасул - 10 дни; картофи, памук, тютюн, гладиоли и овощни градини не е приложим.	
			400-500 мл/дка	◆домати, пипер (разсадни) - преди разсаждане на културите в доза			
			450 мл/дка	◆ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			500 мл/дка	Пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			450 мл/дка	◆царевица, слънчоглед - в началото на вегетация на културата и до 2 лист на плевелите в доза			
			500 мл/дка	◆пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата в доза			
			600 мл/дка	◆малини, овощни градини - рано на пролет, след първата обработка на почвата			
			450 мл/дка	◆нахут - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			600 мл/дка	◆ориз - внася се преди поникване или след поникване на културата (фаза 2-3 лист)			
231.	СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ Удостоверение№ 1006ПРЗ/06.10.2009г.	Второ търговско име на ФОКУС УЛТРА					
232.	СУВЕРЕН ОД САПЕК АГРО С.А. Португалия Разрешение №01556- ПРЗ-1/12.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 363/28.02.2018 г.	никосулфурон - 20 г/л сулкотрион-150 г/л		Срещу Едногодишни житни и широколистни плевели		-	втора професионална
			200 мл продукт /дка	Царевица – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист - разтваряне на девети лист). *Брой приложения мин/макс 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка			
			100 мл продукт /дка	Царевица – внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист - разтваряне на девети лист). *Брой приложения мин/макс 2 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка		-	
233.	СУЛКОГАН 300 СК	сулкотрион –		Срещу едногодишни житни и широколистни		не се изисква	1

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД, Израел -Удостоверение №01228 – ПРЗ/ 17.04.2014г. * Валидно до: 28.03.2024г.	300 г/л		плевели			
			100 -150 мл/дка	Царевица			
234.	СУЛКОТРЕК АДАМА АГАН Лтд, Израел Разрешение № 01574- ПРЗ-1/19.03.2018 г. Валидно до: 31.12.2022 г. Заповед №РД 11- 459/15.03.2018 г.	сулкотрион - 173 г/л тербутилазин - 327 г/л	200-260 мл/дка	Царевица Срещу Житни и широколистни плевели – внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе - поникване (колеоптилът пробива земната повърхност)) или ВВСН 10-16 (поява на първи лист - разтваряне на шести лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка Забележка : Да не се използва при сладка царевица	-	-	втора професио нална
235.	СУЛТАН 500 СК /БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г. Валидно до: *	500 г/л метазахлор		Срещу едногодишни широколистни плевели при:	2150	70	1
			200 мл/дка	Маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
236.	СЪКСЕСЪР ТХ Хеминова А/С, Дания Разрешение №01537- ПРЗ-1/05.02.2018 г. Валидно до: 31.01.2019 г. Заповед №РД 11- 137/18.01.2018 г.	петоксамид 300 г/л тербутилазин 187,5 г/л	300-400 мл/дка	Царевица Срещу едногодишни житни и широколистни плевели Внася се във фаза ВВСН 00-09 (сухо семе- поникване (колеоптилът пробива земната повърхност) Внася се във фаза ВВСН 10-14 (поява на първи лист-растежа продължава до разтваряне на 4-ти лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка – 20-50 л/дка *Прилага се еднократно на сезон -почвено или вегетационно в зависимост от възможността за третиране в полето * Да не се използва за сладка царевица и царевица за производство на семена за	-	-	втора професио нална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				посев.			
237.	ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК /ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г. Валидно до: *	50 г/л квизалофоп-П-етил		Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:	>2000	60	3
			200 мл/дка	Слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
238.	ТАЙФУН СЛ Файнкеми Швебда, Аган Кемикъл, Монсанто Юръп Разрешение №01174 – ПРЗ- 2/01.02.2017г. Валидно до: 18.02.2023г. Заповед № РД 11-195/18.02.2013 г	360 г/л глифозат	300 мл/дка	Срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели при: Слънчоглед * преди сеитба на културите		30	непрофесионална
			300 мл/дка	Царевича * преди сеитба на културите		30 дни	
			400 мл/дка	Като десикант Слънчоглед *Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, ВВСН 87		30 дни	
			400-1200 мл/дка	Овощни градини * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж);		-	
			400-1200 мл/дка	Стърнища * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж)		-	
			400-1200 мл/дка	Свободни площи * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж)		-	
			400-1200 мл/дка	Лозя * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж), фаза на развитие на културата ВВСН 19-65		-	
			1200 мл/дка	ЖП линии * Бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)		-	
			400 мл/дка	Зимна пшеница * ранна восьчна зрялост ВВСН 83 – 85, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж)		14 дни	
	ТАЛИСМАН	никосулфурон -	112,5-150	Царевича		-	втора

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Галеника Фитофармация а.д., Сърбия Разрешение № 01582 – ПРЗ-1/15.05.2018 г. Валидно до: 31.12.2019 г. Заповед №РД 11- 730/24.04.2018 г.	40 г/л	мл/продукт/дка	Срещу едногодиш ни и многогодишни житни и широколист ни плевели – внася се във фаза ВВСН 12-18 (разтворен втори лист-разтворен девети лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка			професио нална
239.	ТАРГА СУПЕР 5 ЕК /АЧИБА 5 ЕК Нисан кемикъл Разрешение № 01054-ПРЗ-2 /17.11.2016 г. Заповед №РД 11.- 2020/20.10.2016 г Валидно до: *	50 г/л квизалофоп-П- етил	120 мл/дка	Маслодайна рапица - срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите	2550	90 рапица; 60 останалите	непрофес ионална (3)
				Срещу едногодишни житни плевели при:			
			150 мл/дка	Слънчоглед Соя Захарно цвекло Памук Лук Тютюн Фасул Картофи Домати Ягоди Малини			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			175 мл/дка	Домати			
			200 мл/дка	Слънчоглед			
			200-250 мл/дка	Соя Захарно цвекло Памук Тютюн Фасул			
			250-300 мл/дка	Картофи Домати Лук Ягода			
			300 мл/дка	Малини			
			300-600 мл/дка	Лозя			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
240.	ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД ДюПонт ИО -Разрешение № 01065-4/01.07.2015г Валидно до: 18.02.2023 г. Заповед №РД 11-1015/17.06.2015 г.	3,26 % римсулфурон + 60,87 % дикамба		Срещу широколистни и житни плевели (вкл. срещу балур от семе) при:			втора професионална
			30,7 г/дка+ 1 % Тренд 90	Царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16)			
			38,4 г/дка+ 1 % Тренд 90	Царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16) *По-високата разрешена доза се използва при по-силно заплевеляване и при прераснали плевели			
241.	ТАРИКА Лаинко, С.А., Испания Разрешение № 01407 – ПРЗ-1/09.05.2016 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11-610/19.04.2016 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг		Едногодишни широколистни плевели:		-	непрофесионална
			2 г/дка	Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж			
242.	ТЕМЗА СК Глобахем Н.В., Белгия Разрешение № 01494 – ПРЗ-2/01.03.2018 г. Валидно до: 31.07.2018 г. * Заповед №РД 11 – 1709/16.08.2017 г. Заповед №РД 11-336/23.02.2018 г.	мезотрион – 100 г/л	75 - 150 мл/дка	Едногодишни житни и широколистни плевели Царевича за фураж и зърно: внася се във фаза ВВСН 12-19 (разтваряне на втори лист – разтваряне на девети лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 11-40 л/дка	-	-	втора професионална
243.	ТЕНДЪР ЕК Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г.	Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК					
244.	ТЕНУРОН 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	– ПРЗ-4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г.						
245.	ТЕРИДОКС 500 ЕК Синджента Удостоверение № 01096-ПРЗ-1/16.06.2010 г. Валидно до: *	500 г/л диметахлор		Срещу кокоше просо, кръвно просо, сива кощрява, зелена кощрява, прешленеста кощрява, балур от семе, видове щир, татул, видове лайка, врабчови чревца, бръшлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчар-ска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, самосевки от пшеница, полско подрумче, полски синап, войничича, лечебен росопас при:	2000	-	Втора професионална
			200 мл/дка с 40 л/дка работен разтвор	Зимна маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване и ранни фази на плевелите			
246.	ТЕРМИНАТОР 4 СК Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд -Удостоверение за № 0598-2/06.08.2012 г. Валидно до:*	40 г/л никосулфурон		Срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кощрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви при:	5000	-	3
			125 мл/дка	Царевича - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.			
247.	ТИТУС 25 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0543/20.10.2008 г. Валидно до: *	250 г/кг римсулфурон		Срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при:	5000	30	3
			4-6 г/дка	Царевича Картофи			
			5 г/дка	Домати Внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевичата *При царевича може да се комбинира с 2,4 Д ам.сол. Прилага се с прилепитель Тренд - 0,1 %, а при царевича и с прилепитель Елект 90 ЕК - 0,15%. *Да не се използва при картофи сорт Бинте			
248.	ТОЛУРЕКС 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 503/18.06.2007 г.	500 г/л хлортолурун		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	10000	30	3
			350-400 мл/дка	Пшеница и счемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Валидно до: *			и ранни фази на плевелите			
249.	ТОПИК 080 ЕК Синджента -Удостоверение № 01033-ПРЗ-2/ 18.05.2011 г. Валидно до: *	80 г/л клодинафоп пропаргил +антидот		Срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	3000		Непрофесионална
			30-40 мл/дка	Пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес			
250.	ТОРИНКА /ФР – 888 Монсанто Юръп -Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат	200 мл./дка	прилага се при: Памук, тютюн. , внесен преди сеитба (разсаждане) на културите - при 5-10 см височина на плевелите;	5000	14 дни – пшеница, ечемик 10 дни- пасища; 7 дни- за всички останали култури	2
			400 мл./дка	Пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант);			
			400-1000 мл./дка.	Овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели);			
			500 мл./дка	Топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели;			
			1000 мл./дка	ЖП линии (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели);			
			1000 мл./дка	Пасища (срещу орлова папрат <i>Pteridium aquilinum</i> – при пълно развитие на плевела, локално третиране);			
251.	ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г.	Второ търговско име на ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК					
252.	ТОСКАНА Проплан Планта Протекшън Компани -Разрешение № 01375 – ПРЗ-1/08.02.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11-155/29.01.2016 г.	трибенурон-метил – 750 г/кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:	-	-	непрофесионална
			1-2 г/дка	Пшеница Ечемик *ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до края на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29			
253.	ТРАКСОС 50 ЕК Синджента Кроп	25 г/л пиноксаден		Срещу едногодишни житни плевели (в т.ч. и див овес):	>2000	-	втора професионална

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Протекшън Разрешение № 01216-ПРЗ-2/ 09.08.2016 г. Валидно до: 31.12.2017 г. * Заповед № РД 11- 1369/25.07.2016 г.	25 г/л клодинафоп пропаргил 6,25 г/л клоквинтоцет- мексил (антидот)	120 мл./дка	Пшеница: Момент на приложение (фаза на приложение): от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели			нална (2)
254.	ТРЕЙЛЪР Индъстриас Афрази С. А., Испания Разрешение № 01408 – ПРЗ- 1/09.05.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед №РД 11- 609/19.04.2016 г	трибенурон- метил – 750 г/кг	2 г/дка	Срещу Едногодишни широколистни плевели Пшеница, Ечемик, Тритикале, Овес, Ръж		-	непрофес ионална
255.	ТРИБЕ 75 ВГ/ТЕНУРОН 75 ВГ/ТРИНУ 75 ВГ /ТРИРОН 75 ВГ/ТРИША 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г. Заповед № РД 11- 414/10.03.2015 г., Заповед №РД 11- 183/03.02.2016 г., Заповед №РД 11- 2402/05.12.2016 г.и Заповед №РД 11- 831/24.04.2017 г.	трибенурон – метил - 750 г/кг	2 гр./дка	Срещу едногодишни широколистни плевели: Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес (пролетен и зимен), Ръж, Тритикале * ВВСН 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима * Да не се прилага след фаза ВВСН 39 на културата. Да не се прилага преди края на февруари в годината на реколти-ране.		-	втора професио нална
256.	ТРИНУ 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Разрешение №01307 – ПРЗ-4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г.						
257.	ТРИМЕР 75 ДФ ДюПонт ИО Разрешение № 01028-ПРЗ-3/ 12.03.2018 г. Валидно до: 24.06.2025 г.	Второ търговско име на ГРАНСТАР 75 ДФ					
258.	ТРИМУР Ексклузивас Сарабия, С.А -Разрешение № 01386–ПРЗ-1/ 25.03.2016г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед № РД 11-396/16.03.2016 г.	трибенурон-метил 750 г/кг		Срещу едногодишни широколистни плевели:		-	непрофесионална
			1- 2 г/дка	Пшеница Ечемик Внася се във фаза ВВСН 13-29 (3 листа разтворени до край на братенето) *Да не се прилага след ВВСН 29			
259.	ТРИПАЛИ ВГ ФМС Интернешънъл Швейцария САРЛ Разрешение № 01504–ПРЗ-2/12.03.2018 г. Валидно до: 31.10.2018 г. Заповед № РД 11-2040/17.10.2017 г. Заповед № РД 11-380/01.03.2018 г.	трибенурон-метил 83 г/кг метсулфурон-метил 83 г/кг флорасулам 105 г/кг	5 г/дка	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели Житни култури (пшеница, ечемик, овес, ръж) Внася във фаза ВВСН 20 – 39 (братене: само главното стъбло – фаза на флаговият лист: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима) *Брой приложения мин/макс - 1 *Вода л/дка мин/макс - 10 – 40 *Да не се прилага през есента		-	втора професионална

260.	ТРИРОН 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					
261.	ТРИША 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение №01307 – ПРЗ- 4/04.05.2017г. Валидно до: 31.10.2018г.	Второ търговско име на ТРИБЕ 75 ВГ					
262.	ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ Синджента -Удостоверение № 01015-ПРЗ/ 14.10.2009 г. Валидно до:*	360 г/л глифозат		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	30	Непрофесионална (3)
			150 мл/дка	Стърнища			
			200 мл/дка	Лозя Овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели			
				Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:			
			300 мл/дка	Пшеница и ечемик внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %			
				Срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:			
			400 мл/дка	Стърнища			
			600 мл/дка	Лозя Овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели			
263.	У 46 М ФЛУИД Ню фарм Валидно до: *	500 г/л МЦПА		Срещу широколистни плевели при:	700	-	2
			200 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
264.	УИНГ-П	212,5 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни	>500	30	3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	БАСФ -Удостоверение № 530/12.07.2007 г. Валидно до: 10.07.2010 г. * Заповед № РД 12- 27/30.04.2009 г.	диметенамид- П+ 250 г/л пендиметалин	300-400 мл/дка	плевели при: Царевича Слънчоглед Внася се след сеитба, преди поникване на културите	<2000		
265.	УИШ ТОП Шарда Кропкем Лтд, Индия Разрешение № 01515 – ПРЗ -1/01.11.2017 г. Валидно до: 30.11.2020 г. Заповед № РД 11- 2126/19.10.2017 г.			Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели		35	втора професионална
			83-125 мл/продукт/ дка	Овощни култури (ябълки, круши, праскови) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-59 (първи развити листа-повечето цветове с венчелистчета са оформени като топчици) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за едногодишни, а по-високата е за многогодишни те плевели			
			125 мл/продукт/ дка	Лоза Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-57 (отворени втори листа-съцветията са напълно развити) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка		35	
			83-125 мл/продукт/ дка	Боровинки, малини, френско грозде Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен втори лист-леторастите са достигнали 90% от дължината си) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за едногодишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		42	

			83-125 мл/продукт/ дка	Картофи Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтваряне на втори листа на главно стъбло-посева се съгъстява:около 90% от растенията в редовете се допират) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		56	
			83-125 мл/продукт/ дка	Захарно цвекло Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първи чифт листата покриват 90% от повърхността) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		60	
			83-125 мл/продукт/ дка	Слънчоглед Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първа двойка листа-поява на 9-то удължено междувъзлие) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		84	
			83-125 мл/продукт/ дка	Тютюн Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-повече от 90% от м/у-редията са покрити) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		30	
			83-125 мл/продукт/ дка	Кръмно цвекло Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (първи чифт листата покриват 90% от повърхността) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка		60	

			83-125 мл/продукт/ дка	Люцерна, детелина Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка * По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		21	
			83-125 мл/продукт/ дка	Домати, патладжан Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (втори същински лист- формиране на странични разклонения) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка		15	
			83-125 мл/продукт/ дка	Листни зеленчуци (маруля, спанак, подправки маруля, скарола, радичио спанак, подправки – див керевиз, див лук, листа от целина, магданоз, градински чай, розмарин, мащерка, босилек, дафинови листа, естрагон Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (разтворен 2-ри същински лист-листна розетка напълно формирана) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		28	
			83-125 мл/продукт/ дка	Грах, фасул, леща, нахут Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 (2 развити листа-край на удължаване на стъблото) *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		23	

			83-125 мл/продукт/ дка	Маслодайни (рапица,лен, соя,памук) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		84	
			83-125 мл/продукт/ дка	Декоративни растения Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		-	
			83-125 мл/продукт/дка	Горско стопанство (изчистване разсадници, засадени иглолистни дървета, засадени широколистни дървета) Внася се във фаза 3-4 лист на плевелите, култура ВВСН 12-39 *Брой Мин/макс приложения - 1 *Вода л/дка мин/макс - 30-40 л/дка *По-ниската доза е за одного-дишните, а по-високата е за многогодишни те плевели		-	
266.	ФЕН 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 367-3/21.05.2012 г. Валидно до:*	240 г/л оксифлуорфен		Срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3
			80 мл/дка	Слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите			
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие			
			150 мл/дка	Лозя - внася се вегетационно (април- май) с насочено пръскане			
			80-100 мл/дка	Слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
267.	ФИНИ ВГ	метсулфурон-		Срещу едногодишни широколистни		пшеница,	3

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Брабант Кеми Б.В., Холандия -Удостоверение № 1237-ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 20.06.2024 г.	метил–200 г/кг	3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	Пшеница, ечемик, овес, тритикале и внося се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12-14 (2-4 лист) Свободни площи внося се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14)		ечемик, овес, тритикале -90 дни	
268.	ФЛУРОСТАР 200 Глобахем н.в., Белгия Разрешение № 1317 – ПРЗ-1/ 01.07.2015 г. Валидно до: 31.12.2022 г	флуроксипир – 200 г/л		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели		Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес, Царевица -60 дни	втора професио нална
			90 мл/дка	Пшеница (мека и твърда) Ечемик Ръж , Овес. * Когато се смесва с други вегетационни хербициди (за контрол на широколистни плевели) дозата трябва да бъде намалена на 70 мл/дка			
			50-70 мл/дка	Царевица * Да не се прилага след 6-ти лист при царевица. * За контрол на многогодишни плевели дозата може да бъде завишена до 100 мл/дка, като се раздели на две трети			
269.	ФОКСТРОТ 69 ЕВ Хеминова -Удостоверение № 518/12.07.2007 г.	69 г/л феноксапроп-П- Етил + Антидот		Срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:	>5000	60	1
			100 мл/дка	Пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)			
270.	ФОКУС УЛТРА /СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение за № 1006-ПРЗ- 1/06.10.2009 г. Валидно до: 30.06.2010 г. * Заповеди № РД 09- 541/10.08.2007 г. Заповеди №РД 09- 457/10.07.2007 г. Заповеди №РД 12- 26/30.04.2009 г.	100 г/л циклоксимид+ тензит		Срещу едногодишни житни плевели при:	3940	60	3
			100 мл/дка	Захарно цвекло Соя Фасул Грах Люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) Маслодайна рапица - срещу едногодиш- ни житни плевели и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките			
				Срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Заповеди №РД РД 12-16/16.03.2009 г.		200 мл/дка	Слънчоглед Захарно цвекло Соя Фасул Грах Люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
				Срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при:			
			200 мл/дка с 30-40 л/дка работен	Царевича - циклоксидим толерантна (СТМ) - внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите. Забележка: трескот-умерено чувствителен			
271.	ФОРНЕТ 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД					
272.	ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/ 18.12.2013 г. Валидно до: 28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
273.	ФРОНТИЕР СУПЕР БАСФ СЕ -Удостоверение № 184/10.03.2004 г. Валидно до:*	720 г/л диметенами д-П		Срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1480	-	3
			80-140 мл/дка	Царевича Слънчоглед Захарно цвекло Соя Картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
274.	ФУЗИЛАД ФОРТЕ 150 ЕК Синджента Разрешение №01016-	150 г/л флуазифоп- П-бутил	80 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балури от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)		90	непрофес ионалн

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

ПРЗ-2/25.09.2017 г. Валидно до: 28.12.2012г. * Заповед № 09- 790/28.12.2002г. Заповед № 11- 1846/07.09.2017 г.	130 мл/дка	Слънчоглед Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	90 мл/дка	Картофи Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	130 мл/дка	Картофи Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	90 мл/дка	Памук Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	-
	100-130 мл/дка	Памук Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	-
	130 мл/дка	Соя Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	75
	90мл/дка	Соя Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	75
	90мл/дка	Фасул в група варива Срещу едногодишни житни плевели, в т.ч. балур от семе - 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90
	100 – 130 мл/дка	Фасул в група варива Срещу многогодишни житни плевели, в т.ч. балур от коренища – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (15-20 см височина на балура)	90

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

			50 – 250 мл/дка	Фасул с шушулки Срещу едногодишни плевели - листно пръскане преди ВВСН 50		28	
			50 – 250 мл/дка	Фасул с шушулки Срещу многогодишни плевели - листно пръскане преди ВВСН 50		28	
			50 мл/дка	Маслодайна рапица Срещу самосевки от житни култури – внася се във фаза фаза 3-5 лист на самосевките		90	
			90 мл/дка			-	
275.	ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ/ РЕФАЙН ЕКСТРА ФМС Интернешънъл Швейцария Сарл Разрешение № 0538-ПРЗ-4/12.03.2018г. Валидно до: 31.12.2016* Заповед №РД 11-392/01.03.2018 г.	тифенсулфурон-метил - 333 г/кг трибенурон-метил - 167 г/кг	6,0 г/дка	Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при: Мека и твърда зимна пшеница Мека и твърда пролетна пшеница Зимен и пролетен ечемик, Зимен и пролетен овес, Зимна ръж, Тритикале - внася се във фаза Не по-късно от ВВСН 39: флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима в ранни фази на плевелите *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка Забележка: Върху алкална почва, периода на приложение да се ограничи в края на зимата и през пролетта		-	непрофесионален
276.	ХЕМНИКО 24 СК / МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148-2/12.07.2013г. Валидно до: 27.02.2022г.	240 г/л никосулфурон		Срещу: многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур); едногодишни житни плевели (лисича опашка, едногодишна метлица, райграс и кощрява); едногодишни широколистни плевели (обикн.звездича, абутилон, щир, лепка, пача трева, и див синап)	>2000	-	2
			21 мл/дка	Царевница			

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

277.	ХЕМТРИБЕ 75 ВГ Хеминова -Удостоверение №01160/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	750 г/кг трибенурон метил		Срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди при:	>2000	30	3
			1,5 г/дка	Пшеница Ечемик			
278.	ХЕРБОКСОН ТОП Нюфарм -Удостоверение № 0202-ПРЗ- 2/19.07.2011 г. Валидно до: 31.12.2011г.	Второ търговско име на ДИКОПУР Ф					
279.	ХУСАР МАКС ОД Байер България ЕООД Удостоверение № 523-2/19.03.2012 г. Валидно до: 10.07.2010 г. * Заповед №РД 09- 456/10.07.2007 г.	7,5 г/л мезосулфуру н+ 7,5 г/л йодосулфуру н+ 22,5 г/л антидот (мефенпир- диетил)		Срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес при:	> 5.000	-	3
			100 мл/дка	Пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата			
280.	ЦЕЛИО ВГ Синджента Кроп Протекшън АГ Разрешение № 01454 – ПРЗ-1/ 17.11.2016 г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11- 2014/20.10.2016 г.	клодинафоп -пропаргил – 200 г/кг пироксулам – 75 г/кг клоквинтоце т-мексил (антидот)- 75 г/кг		Едногодишни житни и широколистни плевели	>5000	-	втора професио нална
				Пшеница (твърда и мека); ръж; тритикале *Да се прилага в комбинация с адювант на маслена основа			
281.	ЦЕНТУРИОН СУПЕР Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ- 3/16.02.2017г.	Второ търговско име на СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК					
282.	ЦИКЛОП	клодинафоп		Срещу едногодишни житни плевели:		-	втора

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	Индустриас Афрза С.А.Испания Разрешение №01450 – ПРЗ- 1/20.09.2016г. Валидно до: 30.04.2019 г. Заповед №РД 11- 1709/14.09.2016 г.	-пропаргил – 95 г/л клоквинтоце т-мексил (антидот) – 25 г/л	63 мл/дка	Пшеница (мека; твърда)			професио нална	
283.	ЧЕЛИНДЖ 600 СК Байер САС, Франция, Байер Кроп Сайанс, Франция Разрешение № 01575- ПРЗ-1/19.03.2018 г. Валидно до: 31.07.2023 г. Заповед №РД 11- 458/15.03.2018 г.	аклонифен - 600 г/л	Срещу Едногодиш ни житни и широколист ни плевели					втора професио нална
			400 мл/продукт/ дка	Слънчоглед – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	Картофи *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			250 мл/продукт/ дка	Ориенталски тютюн, едрolistен тютюн Виржиния – внася се след сеитба преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	Граха (обикновен и фуражен), зимна бакла, зимен нахут, глушина – внася се във фаза след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			400 мл/продукт/ дка	Зелен фасул, пролетна бакла, пролетен нахут, лупина – внася се След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-		
			50 мл/продукт/ дка	Граха (обикновен и фуражен), зимен нахут – внася се във фаза Само вегетационно във ВВСН 12-18 (2-ри – 8-ми разтворен лист) *Брой мин/макс приложения – 1		-		

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

				*Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка			
			400 мл/продукт/ дка	Грах, нахут, бакла (за семе- производство) - внася се във фаза След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (ноември-март) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка			
			250 мл/продукт/ дка	Зелен грах (за консервиране) – внася се във фаза След сеитба преди поникване ВВСН 00-08 (февруари-май) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка			
			400 мл/продукт/ дка	Леща Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-	
			300 мл/продукт/ дка 100 мл/продукт/ дка	Леща Двукратно третиране: 1-во- ВВСН 00-08 (до поникване); 2-ро-ВВСН 13-17 (от трети до седми трилистник) *Брой мин/макс приложения – 1/2 *Интервал между приложенията мин/макс- 3 седмици *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка			
			250 мл/продукт/ дка	Лук (директна сеитба) Еднократно третиране- след сеитба преди поникване ВВСН 00-07 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	

			150 мл/продукт/ дка	Лук (директна сеитба) Двукратно третиране 1-во до фаза поникване ВВСН 00 2-ро ВВСН 15 (5 лист ясно видим) *Брой мин/макс приложения – 1/2 *Интервал между приложенията мин/макс- 3 седмици *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
			100 мл/продукт/ дка			90	
			250 мл/продукт/ дка	Лук (шалот) – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-	
			400 мл/продукт/ дка	Праз лук (за семе-производство) – внася се след сеитба преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			400 мл/продукт/ дка	Чесън – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-	
			250 мл/продукт/ дка	Земна ябълка (Йерусалимски артишок)- внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-08 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
			400 мл/продукт/ дка	Моркови (за семе-производство) – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка	-	70	
			250 мл/продукт/ дка	Пащърнак (вкл. и за семе-производство)- внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-03 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка	-	70	

			250 мл/продукт/ дка	Целина за глави – внася се След разсаждане ВВСН 14-15 (от 4 до 5 разтворен същински лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
			250 мл/продукт/ дка	Целина за семепроизводство (включително целина за глави) – внася се след разсаждане ВВСН 14-18 (от 4 до 5 разтворен същински лист) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
			400 мл/продукт/ дка	Магданоз (за семе-производство) -внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00- 03 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			250 мл/продукт/ дка	Копър (за семепроизводство) – внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-07 *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
			200 мл/продукт/ дка	Люцерна (за семе-производство) – внася се след коситба на съществуващ посев *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-	
			30 мл/продукт/ дка	Люцерна (за семе-производство) – внася се във фаза ВВСН 13-15 (от фаза трети-до пети трилистник) *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		-	
			300 мл/продукт/ дка	Фий (за семе-производство) – внася се след сеитба преди поникване *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 10-30 л/дка		-	
			250 мл/продукт/ дка	Ароматни и лечебни билки, подправки и ароматни растения* за семепроизводство – внася се след сеитба преди поникване; февруари-март, септември-ноември *Брой мин/макс приложения – 1 *Вода л/дка мин/макс – 15-40 л/дка		90	
284.	ЧИКАРА ДУО ИСК	флазасулфу рон 6,7 г/кг		Срещу едногодишни житни и едногодишни/ двугодишни широколистни плевели		Лозя – винени и десертни	втора професио

*Срокът на разрешението се продължава до приключване на процедурата по подновяване

	БИОСАЙЪНСИС ЮРЪП Разрешение № 01377 – ПРЗ-2/17.11.2016 г. Валидно до: 31.01.2018 г. * Заповед №РД 11- 181/03.02.2016 г. Заповед №РД 11- 2013/20.10.2016 г.	+ глифозат 288 г/кг	300 гр/дка	Лозя – винени и десертни сортове: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)		сортове – 75; Маслини**, Цитрусови култури – 45; ** С изключение на маслини, опадали на земята	нална
			300 гр/дка	Маслини: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)			
			300 гр/дка	Цитрусови култури: * Пролет или есен- след прибиране на реколтата. Преди или след поникване на плевелите (височина до 10 см)			
285.	ШАДОУ Ариста Лайфсайънс Разрешение №0348 – ПРЗ- 3/16.02.2017г.	Второ търговско име на СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК					
286.	ШАРПЕН 33 ЕК ПЕНДИ 33 ЕК/ ПЕНКОТ 33 ЕК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение №01279 – ПРЗ- 3/14.02.2017г. Валидно до: 31.07.2018г. Заповед № РД 11- 1981/10.12.2014 г., Заповед №.РД 11- 193/03.02.2015 г., Заповед №РД 11- 1661/06.11.2015 г. и Заповед № РД 11- 87/16.01.2017 г	пендиметали н - 330 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		Аспержи -28; Марули, Ендивия, Цикория - 75; Слънчоглед, царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни	Втора професио нална
			360-600 мл/дка	Слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Царевица - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Фасул - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-600 мл/дка	Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-600 мл/дка	Моркови, ряпа - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			400-600 мл/дка	Аспержи - внася се период на покой			
			360-600 мл/дка	Картофи - внася се след сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Тютюн - внася се преди разсаждане			
			400-600 мл/дка	Пипер - внася се ССПП или преди разсаждане			

			300-600 мл/дка	Марули - внася се ССПП или преди разсаждане	сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,нект арини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Триви за семена(AGST E, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение	
			300-600 мл/дка	Ендивия - внася се ССПП или преди разсаждане		
			300-600 мл/дка	Карфиол - внася се преди разсаждане		
			300-500 мл/дка	Цикория - внася се преди разсаждане		
			240 мл/дка	Козя брада - внася се ССПП		
			360 мл/дка	Лупина - внася се ССПП		
			400-600 мл/дка	Памук - внася се ССПП или преди разсаждане		
			280-360 мл/дка	Топола - внася се след разсаждане		
			400-600 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) - В периода на зимен покой		
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши, дюли - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		
			400-600 мл/дка	Кайсии, праскови, нектарини - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		
			400-600 мл/дка	Овощни разсадници - внася се преди или след разсаждане		
			400-600 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - внася се в периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза		
			400-600 мл/дка	Фъстъци - внася се ССПП		
			300-730 мл/дка	Декоративни растения и разсадници - внася се преди или след разсаждане		
			210-400 мл/дка	Триви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) - внася се след поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)		

287.	ШОГУН 100 ЕК АДАМА КУЕНА Н.В., Кюракао Разрешение №01093 – ПРЗ- 4/05.02.2018 г. Валидно до: 30.11.2022 г.	Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК					
288.	ЯСТРЕБ ПЛЮС Монсанто Европа С.А./Н.В, Белгия Разрешение №01511 – ПРЗ – 1/01.11.2017 г. Валидно до: 31.12.2018 г. Заповед № РД 11- 2120/19.10.2017 г.	Глифозат 360 г/л	300 мл/дка	Слънчоглед Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба на културите *Вода л/дка – 10 л /дка	-	30	Непрофесионална
300 мл/дка	Царевича Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се преди сеитба на културите *Вода л/дка – 10-20 л /дка		30				
400 мл/дка	Слънчоглед Като десикант – внася се във фаза ВВСН 87 (физиологична зрялост: външната страна на питата е жълта, прилистниците кафяви, семената с около 75-80 сухо вещество) Преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %, *Вода л/дка – 10 л /дка		30				
400-1200 мл/дка	Овощни градини, стърнища Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15-20 л /дка		-				

			400-1200 мл/дка	<p>Лозя Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внасят се във фаза ВВСН 19-65 (девет и повече листа отворени до масов цъфтеж: 50% отпадане на ресите). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка</p>		-	
			400-1200 мл/дка	<p>Свободни площи Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка</p>		-	
			1200 мл/дка	<p>ЖП линии Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели – внася се При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж) *Вода л/дка - 15 л/дка</p>		-	
			440 мл/дка	<p>Зимна пшеница Срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели- внася се във фаза ВВСН 83-85 (ранна восьчна зрялост до восьчна зрелост: меко тесто). При бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели (плевели в активен растеж)</p>		-	