

Х Е Р Б И Ц И Д И

№	Продукт, Производител	Активно вещество	Доза/дка (концентрация)	Култура, вредител и моменти на приложение на продукта	ЛД 50 орал но за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за упот-реба
1.	АГРОКСОН /СЕРИДОР МЦПА НюФарм -Удостоверение № 0551/30.05.2011 г.	500 г/л МЦПА		срещу широколистни плевели при:	700	-	2
			200 мл/дка	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
2.	АДЕНГО 465 СК Байер КропСайанс -Удостоверение № 01171-2/28.08.2013 г.	225 г/л изоксафлутол + 90 г/л тиенкарбазон – метил + 150 г/л ципросулфами д (антидот)	35 и 44 мл/дка (преди поникване) 35 мл/дка (ранно вегетационно)	срещу едногодишни житни и широколистни плевели, вкл. балур от семена при: -царевича (зърно и силаж)	2000	-	1
3.	АЖИЛ 100 ЕК /ШОГУН 100 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01093-ПРЗ/ 12.05.2010 г.	100 г/л пропаквизафоп + сърфактант		срещу едногодишни житни плевели при:	>5000	60	2
			50 мл/дка	-маслодайна рапица - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на плевелите и самосевките			
			80 мл/дка	-соя -памук -слънчоглед -захарно цвекло -домати -пипер -лук			
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			80 мл/дка	-слънчоглед -захарно цвекло -тикви -пъпеша			
			100 мл/дка	-соя			
150 мл/дка	-памук -домати -пипер -лук						

			150-200 мл/дка	-ягоди -малини Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
4.	АКСИАЛ 050 ЕК Синджента -Разрешение № 01075-4/ 13.08.2014 г. Валидно до: 31.05.2016 г.	50 г/л пиноксаден		срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес при:	5000	-	2
			60-90 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и от фаза 2-3 лист до фаза братене на плевелите			
5.	АКСИАЛ ЕДНО ЕК Синджента -Разрешение № 01121-4 / 13.08.2014 г. Валидно до: 31.05.2016 г.	45 г/л пиноксаден+ 5 г/л флорасулам		срещу едногодишни житни плевели в т. ч. див овес и широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоно-подобните хербициди плевели при:	2000	-	3
			100 мл/дка с 20-40 л/дка работен разтвор	-пшеница и ечемик - внася се във фаза 3 лист до 2-ри възел на културите, 3-5 лист на житните плевели (3 лист до края на братене на дивия овес) и 2-4 лист на широколистните плевели			
6.	АКУРАТ 60 ВГ Хеминова Удостоверение № 0359/26.04.2006г.	600 г/кг метсулфурон - метил		срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:	5000	-	3
			1 г/дка	-пшеница и ечемик - внася се след 3 лист до края на братене на културата. Забележка: В предложената доза продуктът не контролира лепка и паламида			
7.	АКУРАТ ЕКСТРА ВГ Хеминова Агро Франция С.А.С -Удостоверение № 1243 –ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 31.12.2016 г.	680 г/кг тифенсулфурон метил 70 г/кг метсулфурон метил		Едногодишни широколистни плевели:		-	2
			5 г/дка	-Пшеница -Ечемик * да не се прилага при хлебна пшеница, както и при пивоварен ечемик и ечемик за семе			
8.	АКЦЕНТ 75 РХ ДюПон Де Немур САС Разрешение № 01220-	750 г/кг никосулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур и пирей) и някои широколистни плевели		-	непрофес ионална (3)

	ПРЗ-2 /19.03.2015 г. Валидно до: 29.01.2024 г.		7 г/дка + 0,1% Тренд 90	-Царевица: *Гратисен период за предлагане на пазара и употреба на АКЦЕНТ 75 ВГ разрешени в Удостоверение № 01220 /29.01.201 4г до 13.07.2015			
9.	АЛАЙ МАКС/ ПОЙНТЕР УЛТРА ДюПонт ИО -Удостоверение № 01056-ПРЗ-2/ 25.04.202013 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	143 г/кг метсулфурон- метил+ 143 г/кг трибенурон- метил		срещу широколистни плевели при:	5000	-	3
			3,5 г/дка с 30-40 л/дка работен разтвор	-пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-3 лист най-късно до началото на вретенене на културите			
10.	АЛИАНС ВГ Ню Фарм С.А.С. -Удостоверение № 1186/28.08.2013 г.. Валидно до: 31.12.2018 г.	дифлуфеникан 600 г/кг + метсулфурон метил 60 г/кг	7,5 г/дка	Срещу широколистни плевели при: -ечемик -твърда пшеница -мека пшеница -ръж -тритикале Момент на приложение(фаза на приложение):ВВСН 32 (до втори възел)		-	2
11.	АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ Мактешим Аган Агро Полша -Удостоверение № 01019-ПРЗ-2/ 10.08.2010 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
12.	АРАТ БАСФ СЕ -Удостоверение № 332/25.01.2006 г.	500 г/л дикамба+ 250 г/л тритосулфурон		срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5000 1700	-	3
			10-20 г/дка	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
			10-20 г/дка+ 50 мл/дка ДЕШ	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите и 3-5 лист на плевелите Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 50 мл/дка			
			20 г/дка+ 100 мл/дка	-царевица - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите			

			ДЕШ	Забележка: прилага се с аджувант ДЕШ ХЦ - 100 мл/дка			
13.	АРКАДА 880 ЕК Синджента Съплай, Швейцария Баркли Кемикалс -Удостоверение №01257–ПРЗ /29.07.2014г. Валидно до: 03.07.2024 г.	800 г/л просулфокараб 80 г/л метрибузин		Едногодишни житни и широколистни плевели при:		Не се изисква	3
			500 мл/дка	Картофи: Приложение: след засаждане, преди поникване на културата (ВВСН 00),			
14.	АФАЛОН 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 241/22.12.2004 г.	450 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			100-150 мл/дка	-лук - внася се във фаза 3 лист на културата и ранни фази на плевелите			
			300 мл/дка	-слънчоглед			
			300-400 мл/дка	-соя Внася се след сеитба, преди поникване при соя и слънчоглед			
15.	БАЗАГРАН 480 СЛ БАСФ СЕ -Разрешение № 512-4/13.08.2014 г.	480 г/л бентазон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	>1000	56дни за картофи и 30 дни за всички останали култури	3
			100-150 мл/дка	-градински грах за семепроизводство			
			180 мл/дка	-копър -резене -хизоп			
			200 мл/дка	-лук -чесън -картофи			
			200 мл/дка	-фасул и грах - полско производство -соя -лен			
16.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт -Удостоверение № 144/05.02.2004 г.	980 г/кг дазOMET		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:	520	-	1
			10-20 г/кв.м.	-тютюн (разсад) - внася се 10-15 дни преди засяване с инкорпориране, след което се покрива с полиетилен			

17.	БАЗИС 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0531/20.10.2008 г.	500 г/кг римсулфурон+ 250 г /кг тифенсулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни и едногодишни широколистни плевели при:	>5000	30	3
			2-2,5 г/дка+ Тренд - 0,1 %	-царевича - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите, 20-25 см височина на балура и до 6-ти лист на културата. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %.			
18.	БАСТА 15 СЛ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 563 - 2/29.01.2014 г	150 г/л глюфозинат амониум		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	2000	14	3
			500 мл/дка	-овощни градини и лозя - внася се само редово в активна вегетация на плевелите			
19.	БАРКЛИ ГАЛЪП 360 /БАРКЛИ ВАРВАРИН 360 Баркли Кемикалс -Удостоверение №1156/01.08.2012г. Валидно до: 30.07.2022 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели през вегетацията	2000	30	2
			400 - 1200мл/дка	-лозя и овощни градини			
			1200 мл/дка	- стърнища и ж.п. линии			
20.	БЕЛВЕДЕРЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01297–ПРЗ-1 /19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	десмедифам – 160 г/л фенмедифам – 160 г/л		Срещу широколистни плевели		90	непрофес ионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло * Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение: 1. ВВСН 10 (видими първи листа) 2. ВВСН 12 (първи чифт листа) 3. ВВСН 14 (втори чифт листа) Максимална доза – 300 мл/дка за година			
21.	БЕЛВЕДЕРЕ ФОРТЕ АДАМА Германия ГмбХ -Удостоверение №01296–ПРЗ-1 / 19.03.2105 г. Валидно до: 11.02.2025 г.	фенмедифам – 100 г/л десмедифам – 100 г/л етофумезат – 200 г/л		Срещу широколистни плевели		90	непрофес ионална
			100 мл/дка	Захарно цвекло *Брой приложения: 1 – 3; фаза на приложение ВВСН 10 -14 (котиледоните са хоризонтално разтворени – втори чифт листа); Максимална доза – 300 мл/дка за година			

22.	БИТЪП КОМПАКТ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 71/21.07.2003 г.	82,5 г/л фенмедифам+ 82,5 г/л десмедифам		срещу едногодишни широколистни плевели при:	>2000	30	3	
			600 мл/дка	-захарно цвекло - внася се след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите				
			300+300 мл/дка	-захарно цвекло - внася се двукратно: I-во трети-ране след 1-ви чифт същински листа на културата и от котиледони до 2-4 лист на плевелите; II-ро 7-10 дни след първото				
23.	БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г.	Второ търговско име на СУЛТАН 500 СК						
24.	БУТИЗАН 400 СК БАСФ СЕ -Удостоверение № 01068-2/04.09.2013 г.	400 г/л метазахлор		срещу едногодишни широколистни и житни плевели	2150	70	1	
			250 мл/дка	-зеле - внася се след разсаждане на зелето до 2 лист на плевелите -зелев разсад (лехи) - внася се след сеитба, преди поникване -рапица - внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно до 2 лист на плевелите Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ				
25.	БУТИЗАН S БАСФ СЕ -Удостоверение № 01069-2/04.09.2013 г.	500 г/л метазахлор		срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:	2150	70	1	
			150 мл/дка	-гютюн - внася се след вкореняване на растенията				
			200 мл/дка	-праз - внася се във фаза 2-4 лист на - плевелите -зеле - внася се 8-10 дни след разсаждане -фуражна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ				

26.	БУТИЗАН МАКС БАСФ СЕ -Удостоверение № 01258-ПРЗ/ 29.07.2014 г. Валидно до: 03.07.2024 г.	200 г/л метазахлор 200 г/л диметенамид- П 100 г/л квинмерак		Едногодишни житни и широколистни плевели при	70	1
			200-250 мл/дка	маслодайна рапица: приложение: след сеитба, преди поникване на културата - ВВСН 00-06		
			250 мл/дка	маслодайна рапица: приложение вегетационно – на есен: до 2-ри – 4-ти лист на културата и до 2-ри лист на плевелите(ВВСН 10-14)		
27.	БУКТРИЛ УНИВЕРСАЛ Байер КропСайънс АГ, Германия -Удостоверение № 01221 – ПРЗ/28.01.2014г. Валидно до: 31.12.2016	бромоксинил октаноат /хептаноат - 400,8 г/л (бромоксинил - 280 г/л)+ 2,4-Д етилхексилес тер - 422,1г/л (2,4-Д-80г/л)		срещу широколистни плевели:	-	2
			100мл/дка	- пшеница, ечемик, овес, ръж: Прилага се във фенофаза на културата ВВСН 21 -32 (Начало на братене-втори възел е най - малко на 2см над първия възел)		
			80мл/дка	-царевича, сорго: Прилага се във фенофаза ВВСН 14-16 (Разтваряне на четвърти лист- разтваряне на шести лист)		
28.	ВАЛСАГЛИФ Стоктон Кемикул -Удостоверение № 153/04.01.2005 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	>2000	30
			600 мл/дка	-лозя - внася се в активна вегетация на плевелите (20-30 см височина) *Заб.: прилага се с 10-20 л/дка работен разтвор		
29.	ВАЛСАМИН Стоктон Кемикул -Удостоверение № 154/04.01.2005 г.	600 г/л 2,4 Д ам. сол		срещу широколистни плевели при:	1200	-
			150 мл/дка	пшеница - внася се във фаза братене на културата		
30.	ВЕНТУМ ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение № 01023-ПРЗ/ 05.02.2010 г.	300 г/кг форамсулфурон + 10 г/кг йодосулфурон- метил-натрий+ антидот		срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели в т. ч. балур от семе и коренища и други многогодишни (паламида, пирей) при:	>5000	-
			10-15 г/дка+ 200 мл/дка Метро (прилепител)	-царевича - внася се от 2-6 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколиствни плевели и 15-25 см височина на балура		

31.	ВИКТУС 4 СК /КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0574/14.10.2008 г.	43 г/л никосулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от коренища и някои широколистни плевели (щир, синап, просфорник) при:	>5000	-	3
			125 мл/дка	-царевича - внася се във фаза до 8 лист на културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели			
32.	ГАЛАКСИЯ СЛ Индустриас Афраза” С.А., Испания Разрешение № 01282 – ПРЗ-1 / 30.01.2015г. Валидно до: 31.12.2016 г.	МЦПА – 180 г/л глифозат – 180 г/л		Едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели		ябълки, круши и цитрусови култури, маслини - 15 дни	втора професионална
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши и цитрусови култури: Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-лято			
			400-600 мл/дка	Маслини: Начални фази и активен растеж на плевелите Пролет-есен			
33.	ГАЛЕРА СУПЕР Дау Агросайансис С.А.С. -Удостоверение № 1246-ПРЗ /27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2017г.	240 г/л – клопиралид + + 80 г/л – пиклорам + 40 г/л аминокипиралид		Срещу широколистни плевели при:		-	3
			20 мл/дка	-Зимна маслодайна рапица; - Пролетна маслодайна рапица; Внася се във фаза ВВСН 12-39 на културата * На една и съща площ да се използва веднъж на 3 години			
34.	ГАЛИГАН 240 ЕК / ОКСИГАН 240 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение № 278-ПРЗ-2/31.07.2012 г.	240 г/л оксифлуорфен		срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	-	3
			80-100 мл/дка	-слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			150 мл/дка	-лук II-ра год. - внася се трикратно			
				(50+50+50 мл/дка), през 7 дни като: I-во третиране - се във фаза 3-4 лист на културата и ранни фази от развитето на плевелите Забележка: възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
35.	ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК /СИЛБА СК Синджента	312,5 г/л S-метолахлор+ 187,5 г/л тербутилазин		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>2000	60-царевича за фураж; царевича за зърно не се	Втора професионална (2)
			350 мл/дка	-слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване			
			400-450 мл/дка	-царевича - внася се след сеитба, преди			

	-Удостоверение № 01001-ПРЗ-2 /19.11.2013г. Валидно до: 08.07.2015г.			поникване или след поникване на културата до 1-2 лист на житните плевели		налага		
36.	ГЛИН 75 ВГ ДюПонт ИО 537-ПРЗ -2/18.12.2014 г. Валидно до: 09.12.2024 г.	750 г/кг хлорсулфурон		срещу широколистни в т. ч. слабоувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5545	-	Втора професионална	
			1,3-2 г/дка	- пшеница, ечемик и овес момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (ВВСН 11-30)				
			1,5-2 г/дка	-пшеница – внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури *Гратисен период за предлагане на пазара и употреба на продукта с етикет изготвен на база Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. на министъра на земеделието и горите – 6 месеца, считано от 09.12.2014г				
37.	ГЛИФОГАН 480 СЛ /ГЛИФОГОЛД 480 СЛ Монсанто Юръп -Удостоверение № 01098-3/05.03.2013 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5000	7 дни	2	
			400-1000 мл/дка	-овощни градини -лозя -свободни площи (стърница)				
			1000 мл/дка 300 мл/дка	-ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели -при тютюн за премахване на цв.китка и ограничаване на филизообразуването				
38.	ГЛИФОГОЛД 480 СЛ Монсанто Юръп -Удостоверение № 01098-3/ 05.03.2013 г.	Второ търговско име на ГЛИФОГАН 480 СЛ						
39.	ГЛИФОЗАТ 360 - С Синон Удостоверение № 557/16.04.2009 г.	360 г/л глифозат	400-1200 мл/дка	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: -овощни градини -лозя	5600	30	3	

				-свободни площи (стърнища) Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				
40.	ГЛИФОС 36 СЛ Хеминова -Удостоверение № 531/14.01.2007 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3	
			400-1200 мл/дка	-овощни градини -лозя -свободни площи (стърнища)				
			1200 мл/дка	-ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				
41.	ГЛИФОС СУПЕР 45 СЛ Хеминова -Удостоверение № 532/14.01.2007 г.	450 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3	
			320-960 мл/дка	-свободни площи (стърнища)				
			960 мл/дка	-ж.п.линии - внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				
42.	ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис -Удостоверение № 01051-ПРЗ/24.02.2010 г.	Второ търговско име на ЕФАЗАТ 36 СЛ						
43.	ГОАЛ 2 Е Дау Агросайънсис -Удостоверение № 244/04.01.2005 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 20.12.2014 -Краен срок за употреба на наличните количества: 20.12.2015	240 г/л оксифлуорфен		срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3	
			80 мл/дка	-слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите				
			80-100 мл/дка	-слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване				
			100 мл/дка	-соя -фъстъци -памук Внася се след сеитба, преди поникване на културите -домати и пипер (разсадни) -тютюн Внася се преди разсаждане -ориз (срещу кандри) - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите				
100-150 мл/дка	-лук I-ва год. - внася се след сеитба, преди поникване на културата							

				-лук (едногодишен за глави) - внася се след фаза 3-4 лист на културата			
			100-200 мл/дка	-бор (бял и черен) и смърч (семенилища I-ва год.) - внася се 6 седмици след поникването			
			150 мл/дка	-лук II год. - внася се след засаждане, преди поникване на културата -зеле - внася се преди засаждане			
			150-200 мл/дка	-овощни градини -лозя Внася се вегетационно (април-май)			
			200 мл/дка	розмарин - внася се през невегетационния период на културата			
			200-300 мл/дка	-овощни разсадници - внася се рано напролет, преди поникване на плевелите			
			200-400 мл/дка	бор (бял и черен) и смърч (II, III годишни семенилища и школи) - внася се преди или по време на вегетацията (юни-юли) -малини - внася се рано напролет, преди вегетацията на културата и непоникнали плевели			
			350 мл/дка	-градински чай - внася се рано напролет, преди вегетацията Забележка: при слънчоглед и памук е възможна проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
44.	ГОАЛ 4 Ф Дау Агросайънсис -Удостоверение № 364/29.06.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 20.12.2014 -Краен срок за употреба на наличните количества: 20.12.2015	480 г/л оксифлуорфен		срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни при:	5000	45	3
			40 мл/дка	-слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			40-50 мл/дка	-слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите Забележка: При вегетационно третиране се наблюдава фитотоксичност, която се преодолява			
			75 мл/дка	-лук I, II год. - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културата			

45.	ГРАНСТАР 75 ДФ /ТРИМЕР 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 01028-ПРЗ/14.10.2008 г.	750 г/кг трибенурон		срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5000	30	3
			1-1,5 г/дка	-пшеница и ечемик - внася се във фаза 2-4 лист на плевелите При необходимост се комбинира с 2,4 Д ам.сол			
46.	ГРАНСТАР СУПЕР 50 СГ ДюПон Интернешънъл Оперейшънс- Швейцария -Удостоверение №01142-1/21.10.2011г. Валидно до: 13.10.2021г.	250 г/кг трибенурон метил 250 г/кг тифенсулфуру н метил		срещу едногодишни широколистни, в това число слабо чувствителни на хормоноподобни хербициди (2,4 Д, МЦПА), плевели и паламида.	5000	-	3
			4 г/дка	-пшеница и ечемик - прилага се по време на вегетацията във фенофаза на културите братене /23-29 ВВСН/, фенофаза на едногодишните широколистни плевели 2-4 лист и фаза розетка на паламидата в доза 4 г/дка.			
				Максимален брой приложения: 1 Техника на приложение: наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка			
47.	ДЕВРИНОЛ 4 Ф Юнайтед Фосфоръс Удостоверение № 69/21.07.2003 г.	450г/л напропамид		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	5000	45	3
			300-350 мл/дка	-фуражна рапица - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			300-400 мл/дка	-гютюн (лехи) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране			
			400 мл/дка	-гютюн - внася се преди разсаждане -сливи - внася се преди вегетацията с инкорпориране -шипки (разсад) - внася се преди сеитба с плитко инкорпориране -лавандула - разсад - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
400-500 мл/дка	-зеле - внася се преди разсаждане -домати (безразсадни) -пипер (безразсадни) -						

				Внася се преди сеитба с плитко инкорпориране Забележка: третираните с Девринол площи да не се засяват с житни култури			
48.	ДЕРБИ СУПЕР Дау АгроСайънсис -Удостоверение № 01073-3/28.08.2013 г.	150,2 г/кг флорасулам+ 300,5 г/кг аминопиралид- калий		срещу широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при:	>5000	-	3
			2,5-3,3 г/дка	-пшеница - внася се във фаза братене на културата Забележка: високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида			
49.	ДЕРБИ СУПЕР ЕДНО Дау АгроСайънсис Експорт SAS Разрешение № 01287- ПРЗ -1/30.01.2015г Валедно до: 18.12.2017 г.	флорасулам - 150 г/кг аминопиралид -300 г/кг		срещу широколистни плевели при:		60	втора професио нална
			2,5-3,3 г/дка	-Пшеница (твърда и мека):			
			2,5-3,3 г/дка	Ечемик			
50.	ДИКОПУР Ф/ ХЕРБОКСОН ТОП Нюфарм -Удостоверение № 0202-2/19.07.2011 г.	2,4 Д – 600 г/л		срещу широколистни плевели при:		-	3
			120 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
51.	ДЕССИКАШ 200 СЛ Шарда Уърлдуайд Експорт -Удостоверение № 01259–ПРЗ / 11.08.2014г. Валидно до: 01.08.2024 г.	200 г/л дикват		срещу едногодишни и многогодишни житни и шитоколистни плевели и десикант при:		7	1
			250 мл/дка	- картофи * не по-рано от ВВСН 47-49 (клубените достигат до 70% от крайното си тегло до кожицата се е оформила напълно)			
52.	ДИОВИД 60 СЛ Юнайтед Фосфоръс -Удостоверение № 170/10.03.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	-пшеница - във фаза братене на културата			

53.	ДИФЕНДЪР СЛ /ПАСИФИК СЛ /МАГНЕТО СЛ Ню Фарм -Удостоверение № 01066-2/26.05.2011 г.	360 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба		срещу широколистни в т. ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1276	30	3
			80-100 мл/дка	-пшеница - внася се във фаза братене на културата			
			120 мл/дка	-царевица - внася се във фаза 3-5 лист на културата			
54.	ДОМИНАТОР 360 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0214-2/29.11.2012 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	-овощни градини, лозя			
			1200 мл/дка	-ж.п.линии			
55.	ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ Дау АгроСайансис СА, Франция -Удостоверение № 01218 – ПРЗ / 29.01.2014 г. Валидно до: 29.01.2024 г.	480 г/л – глифозат (като диметиламони ева сол - 608 г/л)	300мл/дка	На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели		-	2
			900мл/дка	На стърнища срещу многогодишни житни и широколистни плевели			
56.	ДОМИНАТОР УЛТРА Дау Агросайънсис -Удостоверение № 356/20.04.2006 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			300 мл/дка с 20-30 л/дка раб.р-р	-лозя - внася се по време на вегетация с насочено пръскане			
57.	ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК /ТЕНДЪР ЕК Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г.	960 г/л S-метолахлор		срещу едногодишни житни в т. ч. балур от семе и някои широколистни плевели при:	2080	-	3
			120 мл/дка	-домати (разсадни и безразсадни) -пипер (разсадни и безразсадни) -моркови -лук I, II, III година			
			150 мл/дка	-царевица -слънчоглед -соя -захарно цвекло -тютюн -памук -картофи -фасул			

				-люцерна -сорго Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване или преди разсаждане на културите Забележка: при лук I-ва година да се прилага само на средно тежки и тежки почви Семената на соргото, предварително се третира с антидот Консер Ш			
58.	ЕКИП ОД Байер Кропсайнс -Удостоверение № 01087-ПРЗ-2/ 29.04.2014 г. Валидно до: 30.04.2019 г.	22,5 г/л форамсулфурон + 22,5 г/л антидот		срещу кокошо просо, разстлан щир, обикновен щир, овчарска торбичка, бяла куча лобода, татул, пача трева, обикновено пипериче, черно куче грозде и балур ((Sorghum helepense) при:	>5000	-	3
			200-250 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 3-6 лист на чувствителните плевели			
59.	ЕКИП СК Байер Кропсайнс -Удостоверение № 39/05.01.2003 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 11.08.215 -Краен срок за употреба на наличните количества: 11.02.2016	22,5 г/л форамсулфурон + 22,5 г/л антидот		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели в т.ч. балур от семе и коренища при:	>5000	-	3
			200-250 мл	-царевича - внася се във фаза 2-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните широколистни плевели и 15-25 см височина на балура			
60.	ЕКЛИПС 70 ВДГ Файнкеми Швебда -Удостоверение № 01095-ПРЗ-2/ 11.05.2012 г.	700 г/кг метрибузин		срещу едногодишни широколистни плевели при:	2000	50 – картофи, 30 – домати, 60-люцерна (стара)	3
			50 г/дка	-домати (безразсадни) - внася се в 1-ва цветна китка на културата			
			60 г/дка	-картофи - внася се при височина 5-10 см на културата -домати (разсадни) - внася се в 1-ва цветна китка на културата			
			70 г/дка	-домати (разсадни) - внася се преди засаждане на културата -картофи - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			75 г/дка	- люцерна (стара) фаза на приложение преди вегетация на люцерната			
61.	ЕКОПАРТ 2 СК Нихон Нояку -Удостоверение № 218/25.10.2004 г.	20 г/л пирафлуфен-етил		срещу едногодишни широколистни плевели при:	>5000	60	3
			45-60 мл/дка	-пшеница - внася се след 3 лист на			

				културата и 2-4 лист на плевелите			
62.	ЕКСПРЕС 50 СГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0508/15.06.2007 г.	500 г/кг трибенурон- метил		срещу широколистни плевели при:	5000	30	3
			4 г/дка с 20-30 л/дка раб. р-р	-слънчоглед - хибриди на Пионер (устойчиви на Експрес 50 СГ) - внася се във фаза 2-6 лист на плевелите			
63.	ЕЛЕКТРОН 500 СК Адама Аган ООД, Израел -Удостоверение № 01300-ПР3-1/ 19.03.2105 г. Валидно до: 31.07.2020 г..	квинмерак 125 г/л метазахлор 375 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели		-	първа професи онална
			200 мл/дка	Маслодайна рапица * След сеитба преди поникване или вегетационно от фено фаза „разтворен втори лист“ до „разтворен четвърти лист“ на културата (ВВСН 12-14)			
64.	ЕЛУМИС ОД Синджента -Удостоверение №1151- 2/25.10.2013 г.	75 г/л мезотрион + 30 г/л никосулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, както и балур от семена и коренища:	2000	-	3
			130 – 200 мл/дка 100 + 70 мл/дка или 130 + 70 мл/дка	царевича: -еднократно -двукратно			
65.	ЕРГОН ВГ Рогам Агрокемикал -Удостоверение № 01163/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	68 г/кг метсулфурон- метил + 682 г/кг тифенсулфурон -метил		срещу двусемеделни плевели (едногодишни широколистни плевели)	5000	-	3
			5-9 г/дка	-пшеница, тритикале и ръж			
			5-6 г/дка	-зимен ечемик			
			6 г/дка	-пролетен ечемик			
				Момент на приложение: есенно или пролетно третиране; ВВСН 13-39 (трети лист до флагов лист на житните култури и от котиледони до шести лист на плевелите)			

66.	ЕФАЗАТ 36 СЛ /ГЛИФЪП 36 СЛ К+Н Ефтимиадис -Удостоверение № 01051-ПРЗ/24.02.2010 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	- лозя – внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			
67.	ЗЕНКОР 70 ВГ Байер Кропсайнс -Удостоверение № 564/29.09.2009 г.	700 г/кг метрибузин		срещу едногодишни широколистни плевели при:	2000	30	3
			50 г/дка	- домати (безразсадни) – внася се във фаза I цветна китка на културата			
			60-70 г/дка	- домати (разсадни) – внася се във фаза I цветна китка на културата - картофи – внася се при височина 5-10 см на културата			
			70 г/дка	- домати (разсадни) – внася се преди засаждане			
			70-80 г/дка	- картофи – внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			100 г/дка	- люцерна (стара) – внася се преди вегетацията на културата			
68.	ЗЕНКОР 600 СК Байер КропСайънс, Франция -Удостоверение №01253– ПРЗ/29.07.2014г. Валидно до: 30.09.2018 г.	600 г/л метрибузин		Едногодишни широколистни плевели и житни плевели при:		картофи – 60 ; аспержи – 7; моркови – 42; моркови и люцерна за семе производство – не се изисква	2
			90 мл/дка	Картофи: - внася се след засаждане, преди поникване на културата;			
			60 мл/дка	- вносен след поникване (вегетационно);			
			90 мл/дка	Аспержи: -вносен (преди поникване) или след прибиране на реколтата, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза			
			35 мл/дка	Моркови: -вносен след поникване, 1 третиране с максималната доза или 2 (две) без да се надвишава максималната доза			
	Моркови за семянопроизводство						

			76 мл/дка	-след поникване			
			90 мл/дка	Люцерна за семепроизводство -внесен след поникване			
69.	ИГЪЛ 75 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 537-ПРЗ -2/18.12.2014 г. Валидно до: 09.12.2024 г.	750 г/кг хлорсулфурон		срещу широколистни в т. ч. слабо- чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	5545	-	Втора професи онална
			1,3-2 г/дка	- пшеница, ечемик и овес момент на приложение: разтворен първи лист- начало на удължаване на стъблото (ВВСН 11-30)			
			1,5-2 г/дка	-пшеница – внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: да се прилага на площи за монокултурно отглеждане на зимни житни култури *Гратисен период за предлагане на пазара и употреба на продукта с етикет изготвен на база Заповед № РД 09-457/10.07.2007 г. на министъра на земеделието и горите – 6 месеца, считано от 09.12.2014 г.			
70.	ИЗОР 500 СК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 349/01.12.2005 г.	500 г/л изопротурон		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	3600	45	3
			350 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културите			
			400-500 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се след сеитба, преди поникване на културите			
71.	ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600- 3/04.05.2012 г.	Второ търговско име на СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ					
72.	КАЛАМ+ДЕШ БАСФ СЕ -Удостоверение № 0588/27.03.2009 г.	125 г/кг тритосулфурон + 600 г/кг дикамба		срещу широколистни плевели при:	5000 1700	-	3
			20 г+100 мл/дка ДЕШ	-царевича – внася се във фаза 2-6 лист на плевелите. Дозата се избира според фазата на			

			(аджувант) 30 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант) 40 г+100 мл/дка ДЕШ (аджувант)	развитие на плевелите, като най-високата се препъръчва в по-напреднали фази и преобладаващо заплевеляване от разстлан щир и черно куче грозде			
73.	КАЛИН ФЛО Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 347-2/18.11.2013 г.	425 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:		60	2
			150-200 мл/дка	-моркови			
			200-250 мл/дка	-кориандър			
			250-300 мл/дка	-картофи			
	-слънчоглед	Внася се след сеитба, преди поникване на културите					
74.	КАЛИФ 480 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение №01185-ПРЗ /22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	480 г/л кломазон		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:	-	-	2
			20 мл/дка (200 мл/ха)	-маслодайна рапица			
75.	КАЛИФ МЕГА ЗК Аган Кемикъл Манюфакчърърс -Удостоверение №01248- ПРЗ/27.06.2014г. Валидно до: 20.06.2024г.	33 г/л – кломазон 250 г/л – метазахлор		Срещу едногодишни широколистни плевели и самосевки от житне култури при:		-	1
			250 мл/дка	-маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
			300 мл/дка;	-маслодайна рапица момент на приложение: след сеитба преди поникване на културата			
76.	КАЛИСТО 480 СК Синджента -Удостоверение № 01053-ПРЗ/ 02.03.2010 г.	480 г/л мезотрион		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:	4000	-	3
			20 мл/дка+ Атплос (прилепител)-0,5 %	-царевича – внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите			
			30-40 мл/дка	-царевича – внася се след сеитба, преди поникване на културата			

77.	КАМБИО СЛ БАСФ СЕ -Удостоверение № 240/25.02.2005 г.	320 г/л бентазон+ 90 г/л дикамба		срещу широколистни плевели при:	1700	-	3
			125 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
			200 мл/дка	-царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата и плевелите			
78.	КАМИКС 560 СЕ Синджента -Удостоверение № 1155/01.08.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	60 г/л мезотрион + 500 г/л S- метолахлор		срещу едногодишни житни плевели и едногодишни широколистни плевели;	5000	-	2
			200 и 250 мл/дка	-царевича			
79.	КАСПЪР 55 ВГ Синджента -Удостоверение № 01089-ПРЗ/ 12.05.2010 г. Валидно до: 26.04.2020 г.	50 г/кг просулфурон+ 500 г/кг дикамба	30 г/дка	-царевича за зърно и силаж – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на едногодишните плевели, 4-6 лист (розетка) при многогодишните плевели и 15 см на поветицата (до цъфтеж)	986 1707	- 14 -царевича за силаж	3
80.	КЕЛВИН ТОП ДюПонт ИО -Удостоверение № 0574/14.10.2008 г.	Второ търговско име на ВИКТУС 4 СК					
81.	КЛЕРАНДА + ДЕШ БАСФ СЕ-Германия -Удостоверение №01130-ПРЗ 5/20.03.2014г. Валидно до: 27.07.2021 г. Използва се самостоятелно или в комбинация с адванта Деш.	375 г/л метазахлор 17, 5 г/л имазамокс 17, 5 г/л		срещу едногодишни широколистни и житни плевели и самосевки от житни култури при:	2000	-	1
			150 мл/дка – 200 мл/дка	-зимна маслодайна рапица (Клиърфийлд хибриди) – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури. Максимален брой на приложение: <u>единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.</u>			
82.	КЛИК 50 СК Оксон -Удостоверение № 362/18.05.2006 г. Краен срок за предлагане на пазара: 29.07.2014 г.	500 г/л тербутилазин		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:	2000	-	2
			200-250 мл/дка	-царевича – след сеитба, преди поникване на културата			

	Краен срок за употреба на наличните количества: 29.07.2015 г. Заповед №РД 11-96 от 29.01.2014г						
83.	КЛИНИК 36 СЛ Нюфарм С.А.С. Франция -Удостоверение № 01208 – ПРЗ/ 9.01.2014г. Валидно до: 29.01.2024г	360 г/л глифозат	400мл/дка	Ябълки и лозя: срещу едногодишни житни плевели		ябълки, лозя - 21 дни; заплевяване в обработваемите площи– 30 дни; пшеница и ечемик 7 дни	3
			600мл/дка	срещу широколистни плевели			
			800мл/дка	срещу многогодишни плевели (насочено с протрктор)			
			300мл/дка	Заплевеляване в обработваемите площи преди сеитба/засаждане или след прибиране на реколта: - срещу едногодишни житни плевели			
			600 мл/дка	-широколистни плевели			
			700 мл/дка	-многогодишни плевели			
			600 мл/дка	Пшеница (без хлебна и за производство на семена) - преди жътва едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели			
			600мл/дка	Ечемик (без пивоварен и за производство на семена) - преди жътва едногодишни житни, широколистни и многогодишни плевели			
			84.	КЛИО БАСФ СЕ, -Удостоверение № 01274–ПРЗ /18.12.2014 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 30.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 30.09.2016			
15 мл/дка	Царевича момент на приложение: втори - пети лист на културата (ВВСН 11-15) *може да се използва и в комбинация с адюванта Деш в доза 100 мл/дка						
85.	КОРДУС 75 ВГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 565/14.10.2008 г. Краен срок за	500 г/кг никосулфурон+ 250 г/кг римсулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни плевели вкл. Балур от коренища и някои широколистни плевели (абутилон, обикновен щир и синап) при:	>5000	30	3
			4 г/дка+	-царевича – внася се във фаза до 8 лист на			

	предлагане на пазара: 10.09.2014г. Краен срок за употреба на наличните количества: 10.09.2015г.		0,1% Тренд с 20-30 л/дка работен разтвор	културата, 15 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели			
86.	КОРУМ БАСФ СЕ, Германия Разрешение № 01305 – ПРЗ-1/ 08.04.2015 Валидно до : 31.12.2016 г.	бентазон – 480 г/л имазамокс – 22,4 г/л		Срещу едногодишни житни и широко- листни плевели:	фасул, грах – 35; соя – 60; Люцерна - 40	Непрофес ионална	
			125 мл/дка 62,5+62,5 мл/дка	Фасул (обикновен и градински): - еднократно приложение (ВВСН 13-25 (3-ти същински лист разтворен – 5-то странично разклонение се вижда)) - Двукратно приложение ВВСН 12-25 (непосредствено преди 2 развити листа – 5- то странично разклонение се вижда) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			125 мл/дка 62,5+62,5 мл/дка	- обикновен и фуражен (зимни и пролетни форми): - еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда)) - Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			190 мл/дка 95 + 95 мл/дка	Соя: - еднократно приложение (При височина на културата 5-6 см)) -Двукратно приложение (ВВСН 11-25 (непосредствено преди първият същински лист с прилистниците да се разтвори или да се развие първото мустаче - 5-то странично разклонение се вижда)) * Да се използва в комбинация с адюванта			

				ДЕШ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
			190 мл/дка	Люцерна - стара: - еднократно приложение (ВВСН 12-25 (2 листа с прилистниците се разтварят или се развиват 2 мустачета - 5-то странично разклонение се вижда))			
			95 + 95 мл/дка	-Двукратно приложение (Първо третиране – непосредствено преди височина на културата 4 -5 см, втори след 7-14 дни) * Да се използва в комбинация с адюванта ДЕСХ ХЦ (DACH HC) в концентрация 0,25 – 0,3%			
87.	КОРЕЛО ДУО Дау Агросайансис Експорт С.А.С -Удостоверение № 01251 – ПРЗ / 29.07.2014 г. Валидно до: 30.04.2025г	14,2г/кг флорасулам 70,8г/кг пироксулам 70.8 г/кг Клоквинтоцет мексил антидот		Широколистни и житни плевели при:		-	2
			26,5 г/дка	пшеница (мека и твърда)			
88.	КОРИДА 75 ВДГ /ПИТОН 75 ВДГ ГАТ Макроенкапсю- лейшън АГ -Удостоверение № 01078-3/ 21.10.2011 г. Валидно до: 13.10.2021 г.	750 г/кг трибенурон- метил		срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормо-нопоподобните хербициди плевели при:	2000	-	3
			1,5 г/дка	-пшеница – внася се след фаза 3 лист до края на братене на културата(13-29 ВВСН) и фази на плевелите 2-4 лист Максимален брой приложения: 1 Техника на приложение: наземна техника Количество на работния разтвор: 20-40 л/дка			
89.	КОСМИК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 323/09.01.2006 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3
			400-1200 мл/дка	-лозя -овощни градини			
			1200 мл/дка	-ж.п.линии Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели			

90.	КОТОНЕКС 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 354/06.01.2006 г. - Срок за предлагане на пазара до:14.03.2014г. -Срок за употреба на наличните количества до:14.03.2015 г .	500 г/л флуометурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	5000	-	3
			400 мл/дка	-памук – внася се след сеитба, преди поникване на културата			
91.	КРЮ 4 СК НюФарм САС -Удостоверение № 01055-2/28.02.2012 г.	Второ търговско име на СИРИО 4 СК					
92.	ЛАРЕН 20 СГ ДюПонт ИО -Удостоверение № 570/14.10.2008 г.	200 г/кг метсулфурон-метил		срещу едногодишни широколистни в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели вкл. Лепка при:	>5000	-	3
			3 г/дка	-пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културата и ранни фази на плевелите			
93.	ЛАУДИС ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 0581-4/31.07.2012 г.	44 г/л темботрион+ 22 г/л изоксадифен-етил (антидот)		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели вкл. балур от семе и коренища при:	>5000	100	3
			200 мл/дка (2 л/ха)	-царевича – внася се във фаза 2-8 лист на културата (ВВСН 12-18); от котиледони до 6-ти лист на едногодишните житни и широколистни плевели и при височина на балура и семе от коренища 15-25 см Максимален брой приложения: 2 Интервал между третиранията: 14 дни Количество на работния разтвор: 200 – 400 л/ха			
94.	ЛАУДИС ВГ Байер КропСайанс -Удостоверение №01177-1/05.03.2013 г.	200 г/кг темботрион+ 100 г/л изоксадифен-етил (антидот)		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително балур от семе и коренища:	5000	100- за зърно; 80 – за силаж и фураж; 47 – сладка царевича	2
			50 г/дка	- царевича (за зърно, силаж и фураж) и сладка царевича			

95.	ЛЕГАТО ПЛЮС 600 СК Аган Кемикъл Манюфакчърърс -Удостоверение № 01204 – ПРЗ / 29.01.2014г. Валидно до: 29.01.2024 г.	100 г/л дифлуфеникан 500 г/л изопротурон		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели		-	1
			125 мл./дка	-пшеница и ечемик:			
96.	ЛЕНТАГРАН ВП Белхим Кроп Протекшън – Белгия -Удостоверение № 01141-1/21.10.2011г. Валидно до: 13.10.2021г.	450 г/кг пиридат		срещу едногодишни широколистни и плевели:	2230	42 дни – <i>Brassica</i> ; 28 дни праз	2
			200 г/дка (2 кг/ха)	-Зеленчуци от род <i>Brassica</i> , вид <i>Brassica oleraceae</i> (главесто зеле (бяло, червено, савойско), къдраво зеле, брюкселско зеле карфиол, броколи) – прилага се еднократно през пролетта, 2-4 седмици след засаждане (4-6-ти лист на културата), в доза 2 кг/ха -праз лук-прилага се еднократно през пролетта, след засаждане, когато трети лист е ясно видим (>3 см), в доза 2 кг /ха Максимален брой приложение: 1 Количество на работния разтвор: 15-40 л/дка при зеленчуци от род <i>Brassica</i> ; 15-40 л/дка при праз.			
97.	ЛЕОПАРД 5 ЕК/ /НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г.	50 г/л квизалафоп-П-етил		срещу едногодишни житни плевели при:	1210	90 дни за рапица; 60 дни за всички останали култури	3
			150 мл./дка	-слънчоглед -захарно цвекло -тютюн -соя -домати -картофи			
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			

			200 мл/дка	-слънчоглед -захарно цвекло -тютюн -домати -картофи -соя Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
			120 мл/дка	срещу самосевки от житни култури при: -зимна маслодайна рапица			
98.	ЛИНТУР 70 ВГ Синджента -Удостоверение № 01010-ПРЗ/ 06.10.2009 г.	4,1 % триасулфурон+ 65,9 % дикамба		срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	>2000	-	3
			15 г/дка	-пшеница и ечемик – внася се от 3 лист до края на братене на културите и 2-4 лист на плевелите			
99.	ЛИНУРЕКС 45 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 142/22.12.2004 г.	450 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			200 мл/дка	-кориандър			
			300 мл/дка	слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите			
100.	ЛИНУРЕКС 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 174/10.03.2004 г.	500 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	60	2
			150-200 мл/дка	-кориандър			
			200-250 мл/дка	-картофи			
			250-300 мл/дка	-слънчоглед -соя Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
101.	ЛИНУРОН 45 СК И Пи Чи -Удостоверение № 161/06.01.2005 г.	450 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	4000	90	2
			200 мл/дка	-кориандър			
			250-300 мл/дка	-слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване на културите			

102.	ЛИСТЕГО 40 БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 0210 – ПРЗ-4 / 27.06.2014 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40					
103.	ЛОГОС 4 СК Сапек Агро -Удостоверение № 01097-ПРЗ/ 16.06.2010 г.	40 г/л никосулфурон		срещу едногодишни житни, някои широко- листни плевели и балур от коренища и при:	5000	-	3
			125 мл/дка	-царевица – внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата			
104.	ЛОГРАН 20 ВГ Синджента Кроп Протекшън АГ Удостоверение №01252– ПРЗ/29.007.2014г. Валидно до: 31.12.2016 г.	200 г/кг триасулфурон		Срещу широколистни плевели при:			3
			3,75 г/дка	-пшеница (мека и твърда) -ечемик *Приложение: от 4-ти лист до вретенене на културата и фаза 2-6 лист на широколистните плевели			
105.	ЛОНТРЕЛ 72 СГ Дау АгроСайансис -Удостоверение № 01235–ПРЗ/ / 17.04.2014 г. Валидно до: 30.04.2018г	клопиралид - 720 г/кг		срещу широколистни плевели при:		Не се изисква	3
			17-21 г/дка	маслодайна рапица, лук, чесън, дребен лук Шалот			
			17-21 г/дка	брюкселско, главесто, червено, савойско, бяло и китайско зеле			
			11-14 г/дка	царевица (за зърно и фураж), пшеница, ечемик, овес и ръж			
			11-21 г/дка	захарно и фуражно цвекло			
106.	ЛОНТРЕЛ 300 СЛ Дау Агросайънсис -Удостоверение № 0245-4/05.03.2013 г.	300 г/л клопиралид		срещу широколистни плевели (паламида, лайка, лепка, млечок, подрумче и др.) при:	4300	-	3
			30-40 мл/дка	-ягоди - внася се след беритба на плодовете			
			30-50 мл/дка	-цвекло -лен Внася се през вегетацията на културите (фаза “елхичка” на лена) и ранни фази на плевелите			

			40-50 мл/дка 35-40 мл/дка 35-40 мл/дка	-пшеница – внася се във фаза братене на културата -лук (за глави) – внася се във фаза “камшиче” на културата -зимна маслодайна рапица -пролетна маслодайна рапица				
107.	ЛУМАКС 538 СК Синджента -Удостоверение № 1029-ПРЗ /18.02.2010 г.	375 г/л S-метолахлор+ 125 г/л тербутилазин+ 37,5 г/л мезотрион		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:	>2000	-	2	
			300 мл/дка	-царевича – внася се вегетационно за културата и ранни фази на плевелите (2-3 лист), или				
			300-400 мл/дка	-царевича – внася се след сеитба, преди поникване на културата				
108.	МАГНЕТО СЛ Ню Фарм -Удостоверение № 01066-2/26.05.2011 г.	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ						
109.	МАЙСТЕР ОД Байер Кропсайнс -Удостоверение № 351/22.03.2006 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 21.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 21.09.2016 г.	30 г/л форам-сулфурон+ 1 г/л йодосулфурон + 30 г/л изоксадифенетил (антидот)		срещу едногодишни житни и широколист-ни плевели, вкл. Балур от семе и коренища при:	>5000	-	3	
			120; 150 мл/дка	-царевича – внася се във фаза 3-8 лист на културата, от котиледони до 6 лист на едногодишните плевели и 15-25 см височина на балура Забележка: по-високата доза се използва при преобладаващо запле-веляване с балур				
110.	МАТОН 600 ЕК НюФарм -Удостоверение № 0546/30.01.2009 г.	600 г/л 2,4 Д естер		срещу широколистни плевели при:	375		3	
			110 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 3-5 лист на културата				
			120-150 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите				
111.	МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК Байер Кропсайнс -Удостоверение № 01127/18.05.2011 г. Валидно до:09.05.2021г.	240 г/л изоксафлутол	42 мл/дка	-царевича за зърно и силаж – прилага се след сеитба, преди поникване (ВВСН 00) или във фаза 1-3 лист (ВВСН 00-13) на културата , срещу едногодишни житни и широколистни плевели.	>5000	-	2	

112.	МЕТСУРАМ 200 ВГ /РИКОРСО Ротам Агрокемикъл -Удостоверение №01076-ПРЗ/ 16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон-метил		срещу едногодишни широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:	>5000	-	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	-пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист			
113.	МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД /САМСОН ЕКСТРА 6 ОД /ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД /НИШИН ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	60 г/л никосулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни, включително балур от семена и коренища и някои широколистни плевели при:	>5000	-	2
			65-75 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	-царевича – внася се във фаза 1-8 лист на културата, 2-4 лист на плевелите или височина на балура 15-25 см. Максимален брой приложения: 1			
114.	МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148/12.07.2013г. Валидно до: 27.02.2022г	Второ търговско име на . ХЕМНИКО 24 СК					
115.	МОДАОН 4 Ф Фейнхими Швобда -Удостоверение № 176-2/28.08.2013 г.	480 г/л бифенокс		срещу едногодишни широколистни плевели при:	>5000	-	3
			150 мл/дка	-слънчоглед – внася се след сеитба, преди поникване или вегетационно във фаза 3-5 лист на културата			
			100 мл/дка	- рапица – внася във фенофаза 4-8 лист на културата			
116.	МОНСУН АКТИВ ОД Байер КропСайанс АД - Удостоверение №01255 –ПРЗ /29.07.2014г. Валидно до: 30.06.2025 г.	31,5 г/л форамсулфурон - натрий 10 г/л тиенкарбазон-метил 15 г/л ципросулфамид (антидот)		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:		-	1
			150 мл/дка	Царевича: Приложение разтваряне на втори-осми лист (ВВСН 12-18)			
			75 мл/дка	Царевича: брой приложения -2 1) втори лист-трети лист (ВВСН 12-13); 2)пети-осми лист (ВВСН 15-18)			

				срещу балур от коренища (<i>Sorghum halepense</i>) при				
			200 мл/дка	Царевича: Приложение - разтваряне на втори- осми лист (ВВСН 12-18)				
117.	МУСТАНГ 306,25 СК Дау Агросайънсис -Удостоверение № 156/05.01.2005 г.	6,25 г/л флорасулам+ 300 г/л 2,4 Д естер		срещу широколистни в т.ч. слабо-чувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при:	1593	65	3	
			40 мл/дка или 60 мл/дка	-царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата. При наличие на паламида се използва високата доза (60 мл/дка)				
			60-80 мл/дка	-пшеница – внася се във фаза братене на културата				
118.	НАВИГАТОР 5 ЕК Аган Кемикъл Манюфакчърърс АД -Удостоверение № 01094-ПРЗ-3/ 19.06.2012 г.	Второ търговско име на ЛЕОПАРД 5 ЕК						
119.	НАСА 360 СЛ Зени Кроп Сайънсис АД – Лихтенщайн -Удостоверение № 31-3/04.05.2012 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	5600	30	3	
			400-1200 мл/дка	-овощни градини -лозя -свободни площи (стърница) Внася се във фаза бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели				
120.	НЕМАСОЛ 510 Таминко -Удостоверение № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	-галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилийум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена – за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен	896	-	1	
121.	НИКОГАН 4 СК Аган Кемикъл -Удостоверение № 01129-ПРЗ/18.05.2011 г.	40 г/л никосулфурон		срещу едногодишни и многогодишни житни, в т. ч. балур от семе и коренища и някои широколистни плевели (обикновен щир, бяла куча лобода, просфорник, татул и	>2000	-	3	

Валидно до:09.05.2021г.

				черно куче грозде)				
			125 мл/дка	- царевича – прилага се по време на вегетацията във фенофаза от разтваряне на втори лист до фенофаза разтваряне на 8-ми лист на културата (ВВСН 12-18), до 15 см височина на балура и фенофаза първа двойка листа (ВВСН 12-15) на едногодишните житни плевели				
122.	НИРВАНА БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 0589/27.03.2009 г. -Краен срок за предлагане на пазара: 21.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 21.09.2016 г.	16,7 г/л имазамокс+ 250 г/л пендиметалин		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	30	3	
			300 мл/дка	- слънчоглед (имитолерантен хибрид “Рими” на ф. “Лимагрейн”) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите				
			300-400 мл/дка	- слънчоглед (имитолерантни хибриди) – внася се във фаза 3-5 лист на плевелите, като високата доза се използва при прерастнали плевели и силно заплевеляване от паламида				
123.	НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД						
124.	НИШИН ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД						
125.	НОМИНЕ 400 СК+ БИОПАУЪР Кумиай кемикъл -Удостоверение № 392/02.02.2007 г.	408 г/л биспирибак- содиум		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	-	3	
			5 мл/дка+ 100 мл/дка Биопауър (аджувант)	- ориз – внасят се във фаза 4-6 лист на културата и 4-5 лист на житните плевели при източена вода				
126.	НУФЛОН СК Белхим Кроп Протекшън	450 г/л линурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:		-	1	
			100 - 200 мл/дка	фасул и грах				

	-Удостоверение № 01197-ПРЗ/ 19.11.2103г. Валидно:05.11.2023г.		100 - 160 мл/дка	картофи			
127.	ОКСИГАН 240 ЕК Аган Кемикъл -Удостоверение № 278-ПРЗ-2/31.07.2012 г.	Второ търговско име на ГАЛИГАН 240 ЕК					
128.	ОПТИКА ТРИО НюФарм -Удостоверение № 0548/30.01.2009 г.	130 г/л мекопроп-П+ 310 г/л дихлорпроп-П+ 160 г/л МЦПА		срещу широколистни в т. ч. някои слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: -пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите	1083	-	2
129.	ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Удостоверение № 0210 – ПРЗ-4 / 26.06.2014 г.	Второ търговско име на ПУЛСАР 40					
130.	ПАЛАС 75 ВГ Дау Агросайънсис експорт –Франция -Удостоверение № 01118-3/28.08.2013 г.	75 г/кг пироксулам		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при: -пшеница – внася се във фаза братене на културата (ВВСН 23-29), 3-5 лист (начало на братене на житните плевели) и 2-4 до 6-8 лист на широколистните плевели	5000	-	3
131.	ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК					
132.	ПАНТЕРА 40 ЕК /РАНГО 40 ЕК /ПАНАРЕКС 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	40 г/л квизалофоп-П-тефурил		срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик при: -рапица – внася се във фаза 1-3 лист на самосевките и 3-5 лист на плевелите	1140	60	3
			80 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при:			

			150 мл/дка	-слънчоглед -соя -захарно цвекло -домати			
			175 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: -слънчоглед -домати -тютюн (ориенталски и едролитен)			
			250 мл/дка	-соя -захарно цвекло Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
133.	ПАСИФИК СЛ Ню Фарм -Удостоверение № 01066-2/26.05.2011 г.	Второ търговско име на ДИФЕНДЪР СЛ					
134.	ПАСИФИКА ВГ+ БИОПАУЪР Байер Кропсайанс -Удостоверение № 578-2/19.03.2012 г.	30 г/кг мезосулфурон+ 10 г/кг йодосулфурон+ 90 г/кг антидот (мефемпир-диетил)	35 г/дка+ 70 мл/дка Биопауър	срещу едногодишни житни и широколистни в т.ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели при: -пшеница – внася се във фаза 3 лист до средата на братене на житните плевели и от 2-3 до 6 лист на широколистните плевели	>2000	-	3
135.	ПЕНДИГАН 330 ЕК Аган Кемикъл- Удостоверение № 01074-2/06.12.2012г Валидно до:05.03.2020 г.	330 г/л пендиметалин	400 мл/дка 400-600 мл/дка 400-600 мл/дка 400 мл/дка 400-600 мл/дка	срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при: -царевича, след сеитба преди поникване; -царевича, след поникване във фаза ВВСН 10 – 14, приложен с 20-40 л/вода/дка; -слънчоглед, след сеитба преди поникване, приложен с 20-40 л/вода/дка; -тютюн, след сеитба преди поникване; -тютюн - преди разсаждане или след разсаждане, междуредово във фаза ВВСН 17, приложен с 20-40 л/вода/дка;	1050	30	3

			450 мл/дка	-ориз (суха почва) - преди разсаждане, приложен с 20-50 л/вода/дка;			
			400 - 600 мл/дка	-овощни градини - след поникване (Преди цъфтеж) приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			300-500 мл/дка	-домати – преди разсаждане или след разсаждане, междуредово, до фаза ВВСН 20, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400- 600 мл/дка	-картофи - преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			300- 500 мл/дка	-лук I, II година - внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
			400 – 600 мл/дка	-чесън - внася се след сеитба, преди поникване или във фенофаза ВВСН 11 – 13, приложен с 20-40 л/вода/дка;			
136.	ПЕНДИГАН 330 ЕК НОВ Адама Аган, Израел Разрешение № 01288 – ПРЗ-1/ 30.01.2015 Валидно до : 31.07.2017г.	пендиметалин - 330 г/л		Срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:			втора професионална
			0,4 л/дка	Пшеница - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата	90		
			0,4 л/дка	Ечемик- Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата	90		
			0,4 л/дка	Ръж- Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-13 на културата	90		
			0,53 л/дка	Царевица- Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата	90		
			0,53 л/дка	Слънчоглед - Преди поникване на културата	Не се прилага		
			0,4 л/дка	Чесън - Преди поникване или след поникване във фаза ВВСН 10-12 на културата	75		
			0,53 л/дка	Грах- Преди поникване на културата	Не се прилага		
			0,53 л/дка	Картофи - Преди поникване на културата	Не се прилага		
			0,3 л/дка	Соя - Преди сеитба или преди поникване на културата	Не се прилага		
			0,4 л/дка	Лук - Преди поникване/разсаждане или след поникване на във фаза ВВСН 10-13 на	Не се прилага		

				културата			
			0,530 л/дка	Тютюн - Преди разсаждане на културата		Не се прилага	
			0,400 л/дка	Тревни площи - След поникване на културата. Може да се прилага както през пролетта, така и през есента, срещу плевели, характерни за сезона		Не се прилага	
			0,450 л/дка	Объл артишок - Преди разсаждане или преди поникване на културата, само в междуредието		60	
			0,275 л/дка	Карфиол - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Броколи - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Главесто зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,275 л/дка	Брюкселско зеле - Преди разсаждане на културата		100	
			0,360 л/дка	Нахут - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Фасул - Преди поникване на културата		Не се прилага	
			0,360 л/дка	Копър - Преди или след поникване на културата		75	
			0,275 л/дка	Патладжан - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Пипер (зеленчукова култура) - Преди разсаждане на културата		75	
			0,275 л/дка	Домати - Преди разсаждане на културата		75	
			0,450 л/дка	Ориз (засят в суха почва) - Преди засяване на културата		90	
			0,450 л/дка	Топола - След засаждане		Не се прилага	
			0,275 л/дка	Украсни (декоративни) култури (включително разсадници)		Не се прилага	
137.	ПИК 75 ВГ Синджента -Удостоверение № 01031-ПРЗ/ 18.02.2010 г.	750 г/кг просулфурон		срещу едногодишни широколистни плевели при:	1000	Зърно -не се Изисква;	1
			1,5 г/дка+ 0,2 % Атиплос с 20 л/дка работен	-царевича – внася се във фаза 3-8 лист на културата и 2-4 лист на плевелите		60 -фураж	

			разтвор				
138.	ПИТОН 75 ВДГ ГАТ Макроенкапсю- лейшън АГ -Удостоверение № 01078-3/21.10.2011 г. Валидно до : 13.10.2021г.	Второ търговско име на КОРИДА 75 ВДГ					
139.	ПЛЕДЖ 50 ВП Сумитомо Кемикъл Агро Юръп -Удостоверение № 543/18.10.2007 г.	500 г/кг флумиоксазин		срещу широколистни и някои житни плевели при: -слънчоглед -царевица Внася се след сеитба, преди поникване на културите, или вегетационно при слънчоглед във фаза 2-4 лист на културата	5000	-	3
140.	ПОЙНТЕР УЛТРА ДюПонт ИО -Удостоверение № 01056-ПРЗ-2/ 05.04.202013 г. Валидно до:05.03.2020г.	Второ търговско име на АЛАЙ МАКС					
141.	ПРИНЦИПАЛ ДюПонт ИО -Удостоверение № 01109-ПРЗ/02.11.2010 г. Валидно до: 19.10.2020 г.	429 г/кг никосулфурон + 107 г/кг римсулфурон		срещу едногодишни житни и много-годишни житни (в т.ч. балур от коренища) и някои широколистни плевели при: -царевица за зърно и силаж (фураж), внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15- 25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели	5000	-	3
142.	ПРИНЦИПАЛ ПЛЮС 66,5 ВГ ДюПонт ИО - Удостоверение № 01170/05.03.2013г. Валидно до: 18.02.2023г.	92 г/кг никосулфурон + 23 г/кг римсулфурон + 552 г/кг дикамба	440 г/ха (44 г/дка).+ 0,1 % Тренд 90	срещу едногодишни и многогодишни житни (в т.ч. балур от коренища) и широколистни плевели, при: - царевица за зърно и силаж (не –при захарна царевица и за пуканки и за семепроизводство	5000	-	3
143.	ПРОТУГАН 50 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 224/09.11.2004 г.	500 г/л изопротурон		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при: -пшеница и ечемик – внася се след 3 лист на културите, или	1826	45	3

			400-500 мл/дка	пшеница и ечемик – внесен след сеитба, преди поникване на културите				
144.	ПУЛСАР 40 /ЛИСТЕГО 40 / ПАСАТ 40 БАСФ Агро Б.В. Удостоверение № 0210 – ПРЗ-4 / 26.06.2014 г.	40 г/л имазамокс		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели при:	5000	90	3	
			120 мл/дка	-слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) – внася се във фаза 2-6 лист на културата; -люцерна млада – внася се един месец след засяване				
			120 мл/дка + 230 мл/дка Стомп нов 330 ЕК	-слънчоглед (CLEARFIELD/ КЛИЪРФИЙЛД хибриди) внесени едновременно във фаза 2-6 лист на културата				
145.	ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ Байер Кропсайанс -Удостоверение № 173/10.01.2005 г.	69 г/л феноксапроп- П-етил + антидот		срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	3040	60	1	
			100 мл/дка	-пшеница и ечемик – внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)				
146.	РАНГО 40 ЕК Кемтура -Удостоверение № 01071-ПРЗ -3/ 28.01.2014 г.	Второ търговско име на ПАНТЕРА 40 ЕК						
147.	РАУНДЪП Монсанто Юръп -Удостоверение № 0240-3/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат+180 г/л сърфактант	200 мл/дка	-памук -пютюн внесен преди сеитба (разсаждане) на културите	5000	14-пшеница, ечемик; 10 –пасица; 7- за всички останали култури	2	
			400 мл/дка	-пшеница, ечемик внася се преди жътва като десикант				
			500 мл/дка	-топола -орех (над 3 години) -смърч (над 2 години)				
			400-1000 мл/дка	-овощни градини -лозя -свободни площи (стърнища) -канални				
			1000 мл/дка	-ж.п.линии -пасища (срещу орлова папрат)				

148.	РАУНДЪП ЕКСТРА Монсанто Юръп -Удостоверение № 1154/01.08.2012 г. Валидно до: 30.07.2022 г.	540 г/кг глифозат (662 г/л калиева сол на N- фосфонометил глицин)	50 мл/дка	-люцерна (срещу кускута)	>5000	люцерна, домати – 2; памук, тютюн, фъстъци, соя, цвекло и други окопни култури, ориз, овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали, топола, орех, смърч, ЖП линии – 7; пасища – 10; слънчоглед, соя, пшеница, ечемик – 14;	3
			100-130 мл/дка	-домати (безразсадни)			
			130 мл/дка	-памук, тютюн, фъстъци			
			130-200 мл/дка	-соя, цвекло и други окопни култури			
			130-200 мл/дка	-ориз, срещу оризовия тросък			
			270 мл/дка	- слънчоглед, соя, пшеница, ечемик			
			270-700 мл/дка	- овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали			
			330 мл/дка	- топола, орех (над 3 години), смърч (над 2 години)			
650-700 мл/дка	- ЖП линии - пасища (срещу орлова папрат)						
149.	РАУНДЪП МАКС СЛ Монсанто Европа СА -Удостоверение № 01261-ПР3 /11.08.2014 г. Валидно до: 01.08.2024 г.	480 г/л глифозат – (глифозат под формата на калиева сол- 588 г/л)		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:		овощни градини, лозя-7 дни; пшеница, ечемик -14 дни	3
			300-450 мл/дка	- овощни градини (над 3 годишни дървета) - лозя (над 2 години)			
			300 мл/дка	-пшеница и ечемик *като десикант, приложение: преди жътва (при влажност в зърното под 30%), восъчна зрялост на пшеницата			
			450 мл/дка	-Ж.П. линии			
			300-450 мл/дка	-напоителни, дренажни канали и стърнища			
150.	РАФТ 400 СК Байер Кропсайнс -Удостоверение № 7/23.01.2003 г. Краен срок за предлагане на пазара: 09.05.2015 Краен срок за употреба на наличните количества: 09.12..2015 г.	400 г/л оксадиаржил		срещу едногодишни широколистни и житни плевели при:	>5000	-	3
			80-100 мл/дка	-слънчоглед -картофи Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите			

151.	РЕГЛОН ФОРТЕ Синджента -Удостоверение № 01032-2/05.03..2013 г.	150 г/л дикват + прилепител		срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:	408	10-картофи; 7-10- маслодайна рапица; 30 за всички останали култури	1
			300 мл/дка	-лозя -овощни градини			
			100 мл/дка 150-200 мл/дка 250 мл/дка 250-300 мл/дка 300 мл/дка 300 мл/дка 250 мл/дка 250 мл/дка	дефолиант/десикант при: -памук -кориандър -слънчоглед -люцерна за семепроизводство -соя -ориз - маслодайна рапица - картофи			
152.	РИКОРСО /МЕТСУРАМ 200 ВГ Ротам Агрокемикъл -Удостоверение №01076-ПРЗ/ 16.03.2010 г. Валидно до: 05.03.2020 г.	200 г/кг метсулфурон- метил		срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните херби-циди плевели при:	>5000	-	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	-пшеница, ечемик и тритикале – внася се във фаза 2 лист (пшеница) и 3 лист (ечемик) до преди поява на флагов лист			
153.	РОТЕР ВГ Стоктон Кемикъл -Удостоверение №01184- ПРЗ/22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023г.	600 г/кг метсулфурон метил	10 г/ха (1г/дка)	Срещу едногодишни широколистни в т. ч. слабочувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: -пшеница	>1200	-	2
154.	САМСОН 4 ОД /ФОРНЕТ 4 ОД /НИШИН 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	40 г/л никосулфурон		срещу едногодишни, многогодишни житни и широколиствни плевели при :		-	2
			100 - 150 мл/дка	Царевица във фаза разтваряне на втори лист- разтваряне на осми лист (ВВСН 12-18)			
			100 мл/дка 50 мл/дка	двукратно прилагане срещу балур: -Прърво третиране -Второ третиране 7-10 дни по-късно			

155.	САМСОН ЕКСТРА 6 ОД -Удостоверение № 01101-3/18.12.2013 г. Валидно до:28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
156.	САНАФЕН Дау Агросайънсис -Удостоверение № 215/20.10.2004 г.	600 г/л 2,4 Д ам.сол		срещу широколистни плевели при:	375	-	3
			120 мл/дка	царевича – внася се във фаза 3-5 лист на културата			
			150-200 мл/дка	пшеница и ечемик – внася се във фаза братене на културите			
157.	САТЕЛИТ 360 СЛ Индустриас Афрази -Удостоверение №01162/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	360 г/л глифозат	0.600-1.000 л/дка	-едногодишни житни и широколистни плевели при овощни видове на повече от 3-4 години –семкови (ябълка и круша) и костилкови (кайсии, праскови, нектарини, череша и сливи) -изчистване на свободни площи (преди засяване)	>2000	-	3
		0.150-0.600 л/дка	-срещу едногодишни, многогодишни житни и широколистни плевели, за пътища, ливади, напоителни канали и противопожарни защитни пояси.				
158.	СИЛБА СК Синджента -Удостоверение № 01001-ПРЗ - 2/19.11.2013г. Валидно до: 08.07.2015г.	Второ търговско име на ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛД 500 СК					
159.	СИРИО 4 СК /КРЮ 4 СК НюФарм САС -Удостоверение № 01055-2/ 28.02.2012 г.	40 г/л никосулфурон		срещу едногодишни житни, балур от кореница и някои широколистни плевели при:	5000	-	3
			125 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата			
160.	СУОРД 240 ЕК Аган Кемикъл Мануфакчърс АД	240 г/л клодинафоп-пропаргил		При пшеница (във фенофаза ВВСН 13 – 29 (от трети лист до край на братенето на културата)):		-	2

	-Удостоверение № 01211 – ПРЗ / 29.01.2014г. Валидно до: 31.01.2018 г.		17мл/дка	срещу полска лисича опашка (<i>Alopecurus myosuroides</i>) и див овес (<i>Avena spp.</i>)			
			20мл/дка	срещу тръстичина (<i>Phalaris spp.</i>), пролетно просо (<i>Milium vernale</i>)			
			25мл/дка	срещу райграс и житна пиявица (<i>Lolium spp.</i>)			
161.	СЕКАТОР ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 371-2/19.03.2012 г.	100 г/л амидо-сулфурон+ 25 г/л йодосулфурон + 250 г/л антидот (мефемпир-диетил)	10 мл/дка	срещу едногодишни широколистни в т. ч. устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели и паламида при: -пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	>5000	-	3
162.	СЕЛЕКТ 240 ЕК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение № 01122-ПРЗ/01.02.2011 г.	240 г/л клетодим	40 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: -домати -захарно цвекло -слънчоглед -соя -картофи -фасул	1630		3
			80 мл/дка	срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при: -домати -захарно цвекло -слънчоглед -соя -картофи -фасул Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) Прилага се с прилепител (Амиго, Акарзин, Масло РЗ)			
163.	СЕЛЕКТ СУПЕР 120 ЕК Ариста Лайфсайънс -Удостоверение за № 0348/01.12.2005 г.	120 г/л клетодим	80 мл/дка	срещу едногодишни житни плевели при: -слънчоглед -захарно цвекло -фасул -картофи	1360	-	3
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч.			

				балур от коренища при:			
			160 мл/дка	-слънчоглед -захарно цвекло -фасул -картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
164.	СЕРИДОР МЦПА НюФарм -Удостоверение № 0551/30.05.2011 г.	Второ търговско име на АГРОКСОН					
165.	СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ /ИМАСПРО 7,5 ЕВ Зенит Кроп Сайънсис АД- Лихтенщайн Удостоверение № 0600- 3/04.05.2012 г.	69 г/л феноксапроп- П- етил+антидот		срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	>5000	60	3
			100 мл/дка	-пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес			
166.	СМЕРЧ 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 374/28.08.2006 г	240 г/л оксифлуорфен		срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3
			80 мл/дка	-слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите			
			80-100 мл/дка	-слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие			
			150 мл/дка	-лозя - внася се вегетационно (април-май) с насочено пръскане			
167.	СПЕКТРУМ БАСФ СЕ -Удостоверение № 360/26.04.2006 г	720 г/л диметенамид- П		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1480	-	3
			80-140 мл/дка	-царевица -слънчоглед -захарно цвекло -соя -картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите			

168.	СТАРАНЕ ГОЛД Дау АгроСайънсис С.А.С., Франция -Удостоверение № 01294 – ПР3-1/ 19.03.2015 г. Валидно до: 31.12.2016 г.	флуроксипир – 100,0 г/л флорасулам – 1,0 г/л		Срещу широколистни плевели:		Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале	Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), пролетна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале - 50 дни; Царевица за зърно и силаж	втора професионална
			180 мл/дка	Овес (зимен и пролетен), зимна пшеница (мека и твърда), ечемик (зимен и пролетен), ръж (зимна и пролетна), тритикале				
			120 мл/дка	Царевица за зърно и силаж * Да не се прилага при сладка царевица и царевица за семепроизводство				
169.	СТЕЛАР 210 СЛ БАСФ СЕ -Удостоверение № 01090-2/04.09.2013 -Краен срок за предлагане на пазара: 30.09.2015 г. -Краен срок за употреба на наличните количества: 30.09.2016 г.	50 г/л топрамезон+ 160 г/л дикамба		срещу едногодишни житни и широко-листни плевели и паламида при:	>2000 1707	-	1	
			100 мл/дка раб.р-р 20-40 л/дка	-царевица - внася се във фаза 2-5 лист на културата и фаза 2-5 лист на плевелите				
170.	СТОМП® АКВА БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 01011-ПР3-2/ 30..01.2015г. Валидно до: 14.08.2019 г.	455 г/л пендиметалин		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1250	Царевица, лук, слънчоглед -60; кориандър 75; нахут 40; памук, тютюн, картофи:- неприложим	3	
			350 мл/дка	-царевица -слънчоглед -памук -лук (от арпаджик) -нахут -тютюн -кориандър -картофи Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване и преди разсаждане на тютюна				
			350 мл/дка	-царевица -слънчоглед -лук (от арпаджик) Внася се в началото на вегетацията на културите и до 2-ри лист на плевелите				

				*Гратисен период за употреба и предлагане на пазара на продукта с употреби разрешени със Заповед №12-54/14.08.2009 г. на министъра на земеделието и храните (Удостоверение № 01011-ПРЗ/12.10.2009 г.) до 10.06.2015г			
171.	СТОМП НОВ 330 ЕК БАСФ Агро Б.В. -Удостоверение № 01007/06.10.2009 г. Валидно до:30.04.2019 г.	330 г/л пендиметалин		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1250	40-нахут, фасул, соя, фъстъци; 60-лук, ягоди, малини, царевича, слънчоглед; 75 - домати и пипер разсадни, мента, кориандър; 90 –пшеница, ечемик, ориз; неприложим – картофи, памук, тютюн, гладиоли	3
			230 мл/дка+ 40-120 мл/дка Пулсар 40	- слънчоглед (клиърфилд хибриди) - срещу едногодишни житни и широколистни плевели и синя китка, внесени при формиране на 2-3 двойка листа на културата			
			300-400 мл/дка	- гладиоли (луковици) - внася се след засаждане, преди поникване на културата			
			400 мл/дка	- царевича - слънчоглед - памук - - фасул - соя - фъстъци - кориандър Внася се след сеитба, преди поникване на културите - тютюн - внася се преди засаждане - мента - внася се преди или след засаждане - ягоди - внася се рано напролет, след първата обработка на почвата			
			400-500 мл/дка	- картофи - лук I, II год. Внася се след сеитба (засаждане), преди поникване на културите - домати (разсадни) - пипер (разсаден) Внася се преди засаждане на културите			
450 мл/дка	- ечемик - внася се след сеитба, преди поникване на културата - нахут - внася се след сеитба, преди поникване на културата - царевича - слънчоглед						

				Внася се в начало на вегетация на културата и до 2 лист плевелите			
			500 мл/дка	-пшеница - внася се след сеитба, преди поникване на културата			
			600 мл/дка	-малини -овощни градини - рано на пролет, след първата обработка на почвата -ориз - внася се след сеитба, преди поникване на културата или след поникване на културата във фаза 2-3 лист			
172.	СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение за № 580/07.01.2009 г.	Второ търговско име на ФОКУС УЛТРА					
173.	СУЛКОГАН 300 СК Аган Кемикъл Мануфакчърс АД, Израел -Удостоверение №01228–ПРЗ/ 17.04.2014г. Валидно до: 28.03.2024г.	сулкотрион – 300 г/л		срещу едногодишни житни и широколистни плевели		не се изисква	1
			100 -150 мл/дка	-царевича			
174.	СУЛТАН 500 СК /БРАДЪР 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 01067-4/28.11.2013 г.	500 г/л метазахлор		срещу едногодишни широколистни плевели при:	2150	70	1
			200 мл/дка	-маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: да се използва единствено всяка трета година за една и съща обработваема площ			
175.	ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК /ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил		срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:	>2000	60	3
			200 мл/дка	-слънчоглед - внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
176.	ТАЙФУН СЛ Файнкеми Швобда, Аган Кемикъл, Монсанто Юръп	360 г/л глифозат		срещу едногодишни и многогодишни широколистни и житни плевели при:	2000	30 дни-слънчоглед	3
			300 мл./дка	-Слънчоглед, царевича, внесен преди сеитба на културите;		царевича, соя;	

	-Удостоверение №01174-1/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023г.		400 мл./дка	-Слънчоглед, (като десикант), внася се преди прибиране на културата, при влажност на зърното под 30 %;		14 дни-пшеница	
			400-1200мл./дка.	-Овощни градини, стърнища, свободни площи, внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж);			
			400-1200 мл./дка	-Лозя, внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на ж.п. (плевели в активен растеж);			
			1200 мл./дка	-ЖП линии внася се при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж);			
			440 мл./дка	- Пшеница зимна, внася се в ранна восьчна, при бутонизация на ш.л. и изкласяване на жит.плев. (плевели в активен растеж);			
177.	ТАРГА СУПЕР 5 ЕК Нисан кемикъл -Удостоверение № 01054-ПРЗ/04.03.2010 г.	50 г/л квизалофоп-П-етил	120 мл/дка	- маслодайна рапица - срещу кокоше просо, видове кощрява, кръвно просо, ветрушка, лисича опашка, див овес и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-3 лист на самосевките и плевелите	2550	90 рапица; 60 останалите	3
				срещу едногодишни житни плевели при:			
			150 мл/дка	- слънчоглед - соя - захарно цвекло - памук - лук - тютюн - фасул - картофи - домати - ягоди - малини			
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			175 мл/дка	- домати			
			200 мл/дка	- слънчоглед			
			200-250 мл/дка	- соя - захарно цвекло - памук - тютюн - фасул			

			250-300 мл/дка	-картофи -домати -лук -ягоди			
			300 мл/дка	-малини			
			300-600 мл/дка	-лозя Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
178.	ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД ДюПонт ИО -Удостоверение № 01065-3/25.10.2013 г.	Второ търговско име на ТИТУС ПЛЮС ВГ + ТРЕНД					
179.	ТЕНДЪР ЕК Синджента -Удостоверение № 01012-ПРЗ-3/ 19.11.2013г.	Второ търговско име на ДУАЛ ГОЛД 960 ЕК					
180.	ТЕРИДОКС 500 ЕК Синджента -Удостоверение № 01096-ПРЗ/16.06.2010 г.	500 г/л диметахлор		срещу кокоше просо, кръвно просо, сива кощрява, зелена кощрява, прешленеста кощрява, балур от семе, видове щир, татул, видове лайка, врабчови чревца, бръшлянолистно великденче, бяла куча лобода, дребноцветна галингоза, овчар-ска торбичка, тученица, черно куче грозде, едногодишна метлица, самосевки от пшеница, полско подрумче, полски синап, войничница, лечебен росопас при:	1600-2000	-	2
			200 мл/дка с 40 л/дка работен разтвор	-зимна маслодайна рапица - внася се след сеитба, преди поникване и ранни фази на плевелите			
181.	ТЕРМИНАТОР 4 СК Шарда Уърлдуайд Експортс Пвт. Лтд -Удостоверение за № 0598-2/06.08.2012 г.	40 г/л никосулфурон		срещу балур от семе и коренища, зелена и сива кощрява, кокошо просо, кръвно просо, пирей, райграс, лисича опашка, див овес, кисели треви при:	5000	-	3
			125 мл/дка	-царевича - внася се във фаза 2-4 лист на балура и до 8 лист на културата.			

182.	ТИТУС 25 ДФ ДюПонт ИО -Удостоверение № 0543/20.10.2008 г.	250 г/кг римсулфурон		срещу едногодишни житни плевели и балур от коренища при:	5000	30	3
			4-6 г/дка	-царевича -картофи			
			5 г/дка	-домати Внася се във фаза 2-4 лист на плевелите (20-25 см височина на балура) и до 8 лист на царевичата *При царевича може да се комбинира с 2,4 Д ам.сол. Прилага се с прилепител Тренд - 0,1 %, а при царевича и с прилепител Елект 90 ЕК - 0,15%. *Да не се използва при картофи сорт Бинте			
183.	ТИТУС ПЛЮС ВГ + ТРЕНД / ТАРОТ ПЛЮС + ТРЕНД ДюПонт ИО -Удостоверение № 01065-3/25.10.2013 г.	3,26 % римсулфурон + 60,87 % дикамба		срещу широколистни и житни плевели (вкл. срещу балур от семе) при:		-	2
			30,7 г/дка+ 1 % Тренд 90	-царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16)			
			38,4 г/дка+ 1 % Тренд 90	- царевича (зърно и силаж) във фаза 2-6 лист (ВВСН 12-16) По-високата разрешена доза се използва при по-силно заплевеляване и при прераснали плевели			
184.	ТОЛУРЕКС 500 СК Мактешим Аган -Удостоверение № 503/18.06.2007 г.	500 г/л хлортолурун		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	10000	30	3
			350-400 мл/дка	-пшеница и ечемик - внася се след сеитба, преди поникване, или след 3 лист на културите и ранни фази на плевелите			
185.	ТОПИК 080 ЕК Синджента -Удостоверение № 01033-2/ 12.05.2011 г.	80 г/л клодинафоп +антидот		срещу едногодишни житни плевели в т.ч. див овес при:	1829		3
			30-40 мл/дка	-пшеница - внася се от фаза 3 лист до края на братене на дивия овес			
186.	ТОРИНКА /ФР – 888 Монсанто Юръп -Удостоверение № 01172/05.03.2013 г. Валидно до: 18.02.2023 г.	360 г/л глифозат	200 мл./дка 400 мл./дка 400-1000 мл./дка.	прилага се при: -памук, тютюн., внесен преди сеитба (разсаждане) на културите - при 5-10 см височина на плевелите; -пшеница, ечемик (преди жътва, и като десикант); -овощни градини, лозя, свободни площи (стърнища), канали (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните	5000	14 дни – пшеница, ечемик 10 дни-пасища; 7 дни- за всички останали култури	2

			500 мл./дка 1000 мл./дка 1000 мл./дка	плевели); -топола, орех (над 3 г.), смърч (над 2 г.) - при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели; -ЖП линии (при бутонизация на широколистните и изкласяване на житните плевели); -пасища (срещу орлова папрат <i>Pteridium aquilinum</i> – при пълно развитие на плевела, локално третиране);			
187.	ТОРНАДО 5 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение № 191-3/21.05.2012 г.	Второ търговско име на ТАЙГЪР ПЛАТИНИУМ 5 ЕК					
188.	ТРАКСОС 50 ЕК Синдженга Кроп Протекшън Удостоверение № 01216-ПРЗ/ 29.01.2014 г. Валидно до: 29.01.2017 г.	25 г/л пиноксаден 25 г/л клодинафоп пропаргил 6,25 г/л клоквинтоцет-мексил (антидот)	120 мл./дка	срещу едногодишни житни плевели (в т.ч. и див овес): Пшеница Момент на приложение (фаза на приложение): от 3-ти лист до втори възел на културата (ВВСН 32), от фаза 3-ти лист до края на братене на дивия овес; фаза 3-5-ти лист на останалите житни плевели		-	2
189.	ТРЕВИСИМО СК Ариста Лайфсайанс -Удостоверение № 317/0.12.2005 г. Краен срок за предлагане на пазара и употреба на наличните количества: 09.05.2015	250 г/л диурон+ 250 г/л глифозат	500+500 мл./дка с 30 л/дка раб.р-р	срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при: -Лозя - внася се двукратно, като: 1-во третиране преди отваряне на пъпките на лозата, а на площи заплевелени с балур при 20-25 см височина на балура; 2-ро 60 дни след първото с насочено пръскане	2000	-	2
190.	ТРИБЕ 75 ВГ Шарда Кропхем Лимитид Разрешение № 01307-ПРЗ-1/ 08.04.2015г. Валидно до: 31.10.2018 г.	трибенурон – метил - 750 г/кг	2 гр./дка	Срещу едногодишни широколист-ни певели: -Пшеница, Ечемик (пролетен и зимен), Овес (пролетен и зимен), Ръж, Тритикале * ВВСН 12 – 39 (разтворени два листа – флаговият лист е напълно разтворен, лигулата е едва видима		-	втора професионална
191.	ТРИМЕР 75 ДФ ДюПонт Ю -Удостоверение № 01028-ПРЗ/14.10.2008 г.	Второ търговско име на ГРАНСТАР 75 ДФ					

192.	ТЪЧДАУН СИСТЕМ 4 360 СЛ Синджента -Удостоверение № 010015-ПРЗ/ 14.10.2009 г.	360 г/л глифозат		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	>5000	30	3
			150 мл/дка	-стърнища			
			200 мл/дка	-лозя -овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели			
				срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели при:			
			300 мл/дка	-пшеница и ечемик внася се преджътвено, при влажност на зърното под 30 %			
				срещу многогодишни житни и широколистни плевели при:			
			400 мл/дка	-стърнища			
	600 мл/дка	-лозя -овощни градини Внася се във фаза изкласяване (изметляване) на житните и бутонизация на широколистните плевели					
193.	У 46 М ФЛУИД* Ню фарм	500 г/л МЦПА		срещу широколистни плевели при:	700	-	2
			200 мл/дка	-пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите			
194.	УИДМАСТЕР 464 СЛ Синджента -Удостоверение №528/17.06.2008 г.	344 г/л 2,4 Д+ 120 г/л дикамба	80-100 мл/дка	срещу широколистни в т. ч. слаб-очувствителни на хормоноподобните хербициди плевели при: пшеница и ечемик - внася се във фаза братене на културите	1347	-	3
195.	УИНГ-П БАСФ -Удостоверение № 530/12.07.2007 г.	212,5 г/л диметенамид-П+ 250 г/л пендиметалин		срещу едногодишни житни и широколистни плевели при:	1480	30	3
			300-400 мл/дка	-царевича -слънчоглед Внася се след сеитба, преди поникване на културите			
196.	ФЕН 24 ЕК Зенит Кроп Сайънсис АД - Лихтенщайн -Удостоверение №	240 г/л оксифлуорфен		срещу едногодишни и някои много-годишни широколистни плевели при:	5000	45	3
			80 мл/дка	-слънчоглед - внася се вегетационно за културата и фаза 2-4 лист на плевелите			

	367-3/21.05.2012 г. Краен срок за предлагане на пазара: 03.04.2014 г. Краен срок за употреба на наличните количества: 03.04.2015 г. Заповед № РД 11-1033 от 03.10.2013г. *Заповедта не е в сила, поради обжалване		80-100 мл/дка 150 мл/дка	- слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която се преодолява впоследствие - лозя - внася се вегетационно (април- май) с насочено пръскане			
			80-100 мл/дка	- слънчоглед - внася се след сеитба, преди поникване на културата. Забележка: Възможна е проява на фитотоксичност, която впоследствие се преодолява			
197.	ФИНИ ВГ Брабант Кеми Б.В., Холандия -Удостоверение № 1237-ПРЗ/27.06.2014 г. Валидно до: 20.06.2024 г.	метсулфурон-метил–200 г/кг		срещу едногодишни широколистни		пшеница, ечемик, овес, тритикале -90 дни	3
			3 г/дка раб.р-р 20-40 л/дка	- пшеница, ечемик, овес, тритикале и внася се във фаза ВВСН 13- 39 (от развитие на 3 лист до Край на братене) на културата и Ранни фази на развитие на плевелите ВВСН 12-14 (2-4 лист)			
				- свободни площи внася се в ранни фази на развитие на плевелите (ВВСН 12-14)			
198.	ФОКСТРОТ 69 ЕВ Хеминова -Удостоверение № 518/12.07.2007 г.	69 г/л феноксапроп-П-Етил + антидот		срещу едногодишни житни в т. ч. див овес при:	>5000	60	1
			100 мл/дка	- пшеница и ечемик - внася се от фаза 3 лист до края на братене на плевелите (дивия овес)			
199.	ФОКУС УЛТРА /СТРАТОС УЛТРА БАСФ СЕ -Удостоверение за № 580/07.01.2009 г.	100 г/л циклоксидим		срещу едногодишни житни плевели при:	3940	60	3
			100 мл/дка	- захарно цвекло - соя - фасул - грах - люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура) - маслодайна рапица - срещу едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури - внася се във фаза 2-5 лист на плевелите и самосевките			
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			

			200 мл/дка	-слънчоглед -захарно цвекло -соя -фасул -грах -люцерна Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
				срещу едногодишни и многогодишни житни плевели при:			
			200 мл/дка с 30-40 л/дка работен	-царевича - циклоксидим толерантна (СТМ) - внася се вегетационно за културата и 3-5 лист на плевелите. Забележка: трокот-умерено чувствителен			
200.	ФОРНЕТ 4 ОД ИСК -Удостоверение № 01030-5/19.11.2013 г. Валидно до: 11.11.2023 г.	Второ търговско име на САМСОН 4 ОД					
201.	ФОРНЕТ ЕКСТРА 6 ОД ИСК -Удостоверение № 01101-3/ 18.12.2013 г. Валидно до: 28.11.2023 г.	Второ търговско име на МИСТРАЛ ЕКСТРА 6 ОД					
202.	ФРОНТИЕР СУПЕР БАСФ СЕ -Удостоверение № 184/10.03.2004 г. (СПЕКТРУМ) -Удостоверение № 360/26.04.2006 г.	720 г/л диметенами д-П		срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели при:	1480	-	3
			80-140 мл/дка	-царевича -слънчоглед -захарно цвекло -соя -картофи Внася се след сеитба, преди поникване на културите			

203.	ФУЗИЛАД ФОРТЕ Синджента -Удостоверение № 264/05.04.2005 г.	150 г/л флуазифоп- П-бутил+ прилепител		срещу едногодишни житни плевели при:	3680	60	3
			50 мл/дка	-маслодайна рапица - срещу самосевки от житни култури, внесен във фаза 3-5 лист на самосевките			
			80 мл/дка	-слънчоглед			
			90 мл/дка	-памук -гютюн -соя -фасул -фъстъци -домати -пипер -картофи			
				срещу многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища при:			
			100-130 мл/дка	-слънчоглед -памук -гютюн -домати -фасул			
			130 мл/дка	-соя -фъстъци -пипер -картофи Внася се във фаза 3-5 лист на плевелите (10-20 см височина на балура)			
204.	ХАРМОНИ ЕКСТРА СГ ДюПон Интернешънъл Оперейшънс САРЛ Разрешение № 0538- ПРЗ/01.12.2014г Валидно до: 31.12.2016	тифенсулфу рон-метил - 333 г/кг трибенурон- метил - 167 г/кг		Срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при:		Не се изисква	непрофесионална
			7,5 г/дка	Мека и твърда зимна пшеница			
			7,5 г/дка	Мека и твърда пролетна пшеница			
			7,5 г/дка	Зимен и пролетен ечемик			
			7,5 г/дка	Зимен и пролетен овес			
			7,5 г/дка	Зимна ръж			
			7,5 г/дка	Тритикале			
205.	ХЕМНИКО 24 СК / МИСТРАЛ ОПТИ 240 СК Хеминова - Удостоверение №01148-2/12.07.2013г. Валидно до:	240 г/л никосулфурон		срещу: многогодишни житни плевели (обикновен пирей и балур); едногодишни житни плевели (лисича опашка, едногодишна метлица, райграс и кощрява); едногодишни широколистни плевели (обикн. звезда, абутилон, щир, лепка, пача трева, и див синап)	>2000	-	2

	27.02.2022г.		21 мл/дка	- царевица			
206.	ХЕМТРИБЕ 75 ВГ Хеминова -Удостоверение №01160/28.11.2012г. Валидно до: 19.11.2022г.	750 г/кг трибенурон метил		срещу едногодишни широколистни плевели в т.ч. слабочувствителни на хормоноподобни хербициди при:	>2000	30	3
			1,5 г/дка	-пшеница -ечемик			
207.	ХЕРБАФЛЕКС Щелер -Удостоверение № 291/06.10.2005 г.	85 г/л бефлубугамид + 500 г/л изопротурон		срещу едногодишни житни и широколи-стни в т. ч. слабочувствителни на хормо-ноподобните хербициди плевели при:	>2000	90	2
			200 мл/дка	-пшеница - внася се от 3 лист до края на братене на културата			
208.	ХУСАР МАКС ВГ+ БИОПАУЪР* Байер Кропсайанс -Удостоверение № 322/06.01.2006 г. Краен срок за предлагане на пазара: 09.05.2015 Краен срок за употреба на наличните количества: 09.12..2015	30 г/кг мезосулфур он+ 30 г/кг йодосулфур он+ антидот (мефенпир- диетил)		срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. слабочувствителни на хор- моноподобните хербициди плевели при:	5000	-	3
			20 г/дка+Биопауър (прилепител) - 40 мл/дка; 25 г/дка+Биопауър (прилепител) - 50 мл/дка	-пшеница - внася се от фаза 3-ти лист до края на братене на културата. Забележка: ниската доза се препоръчва срещу широколистни, а високата срещу житни плевели (див овес, лисича опашка)			
209.	ХУСАР МАКС ОД Байер Кропсайанс -Удостоверение № 523-2/19.03.2012 г.	7,5 г/л мезосулфуро н+ 7,5 г/л йодосулфуро н+ 22,5 г/л антидот (мефенпир- диетил)		срещу едногодишни житни и широко-листни в т.ч. устойчиви на хормонопо-добните хербициди плевели и див овес при:	5000	-	3
			100 мл/дка	-пшеница - внася се от 3 лист до братене на културата			
	ШАРПЕН 33 ЕК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение № 01279 – ПРЗ-1/ 23.02.2015г Валидно до: 31.07.2017 г.	пендиметали н - 330 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели		Аспержи -28; Марули, Ендивия, Цикория - 75; Слънчоглед, царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране),	Втора професи онална
			360-600 мл/дка	Слънчоглед - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Царевица- След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Фасул - След сеитба, преди поникване (ССПП)			

			360-600 мл/дка	Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)		Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Lupина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,некта рини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело), Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Трeви за семена(AGSTE , ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение	
			360-600 мл/дка	Грах (за консервиране), нахут - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-600 мл/дка	Моркови, ряпа - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			400-600 мл/дка	Аспержи - Период на покой			
			360-600 мл/дка	Картофи - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			360-600 мл/дка	Тютюн - Преди разсаждане			
			400-600 мл/дка	Пипер - ССПП или преди разсаждане			
			300-600 мл/дка	Марули - - ССПП или преди разсаждане			
			300-600 мл/дка	Ендивия - ССПП или преди разсаждане			
			300-600 мл/дка	Карфиол - Преди разсаждане			
			300-500 мл/дка	Цикория - Преди разсаждане			
			240 мл/дка	Козя брада - ССПП			
			360 мл/дка	Лупина - ССПП			
			400-600 мл/дка	Памук - ССПП или преди разсаждане			
			280-360 мл/дка	Топола - След разсаждане			
			400-600 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) - В периода на зимен покой			
			400-600 мл/дка	Ябълки, круши, дюли - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			400-600 мл/дка	Кайсии, праскови, нектарини - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			400-600 мл/дка	Овощни разсадници - Преди или след разсаждане			
			400-600 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - В периода			

				между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			400-600 мл/дка	Фъстъци - ССПП			
			300-730 мл/дка	Декоративни растения и разсадници - Преди или след разсаждане			
			210-400 мл/дка	Триви за семена (AGSTE, ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FFESSS, AGSST) - След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)			
210.	ШАРПЕН 40 СК Шарда Кропчем Лимитед Разрешение № 01280-ПРЗ - 1/30.01.2015г Валидно до: 31.07.2017 г.	пендиметал ин – 400 г/л		Едногодишни житни и широколистни плевели:		Аспержи -28; Марули, Ендивия, Цикория - 75; Слънчоглед, царевица, Фасул, Соя, Грах (за консервиране), Нахут, Моркови, Ряпа, Картофи, Тютюн, Пипер, Карфиол, Козя брада, Лупина, Памук, Топола, Лозя (винени и десертни сортове), Ябълки, круши, Кайсии, праскови,нектарини, Овощни разсадници, Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело),	непрофесионална
			300-500 мл/дка	Слънчоглед - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-500 мл/дка	Царевица - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-500 мл/дка	Фасул - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			250-500 мл/дка	Соя - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-500 мл/дка	Грах (за консервиране) - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-500 мл/дка	Нахут - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			250-500 мл/дка	Моркови - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			250-500 мл/дка	Ряпа - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			330-500 мл/дка	Аспержи - Период на покой			
			300-500 мл/дка	Картофи - След сеитба, преди поникване (ССПП)			
			300-500 мл/дка	Тютюн - Преди разсаждане			
			330-500 мл/дка	Пипер - ССПП или преди разсаждане			
			250-500 мл/дка	Марули - ССПП или преди разсаждане			
			250-500 мл/дка	Ендивия - ССПП или преди разсаждане			
250-500 мл/дка	Карфиол - Преди разсаждане						
250-410 мл/дка	Цикория - Преди разсаждане						

			200 мл/дка	Козя брада - ССПП		Фъстъци, Декоративни растения и разсадници, Триви за семена(AGSTE , ALOPR, ARRAL, CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST - Ограничен от фазата на приложение	
			300 мл/дка	Лупина - ССПП			
			330-500 мл/дка	Памук - ССПП или преди разсаждане			
			230-300 мл/дка	Топола - След разсаждане			
			330-500 мл/дка	Лозя (винени и десертни сортове) - В периода на зимен покой			
			300-500 мл/дка	Ябълки, круши - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			300-500 мл/дка	Кайсии, праскови,нектарини - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			330-500 мл/дка	Овощни разсадници - Преди или след разсаждане			
			300-500 мл/дка	Цитрусови култури (портокали, лайм, мандарини, грейпфрут, помело) - В периода между прибиране на реколтата и оформяне на завръза			
			330-500 мл/дка	Фъстъци - ССПП			
			250-600 мл/дка	Декоративни растения и разсадници - Преди или след разсаждане			
			170-330 мл/дка	Триви за семена – (AGSTE, ALOPR , ARRAL , CYXCR, DECCA, LOLSS, PHLPR, POASS, FESSS, AGSST) - След поникване, през есента или пролетта (при повече от 6 братя/растение)			
211.	ШОГУН 100 ЕК Мактешим Аган -Удостоверение № 01093-ПРЗ/ 12.05.2010 г.	Второ търговско име на АЖИЛ 100 ЕК					