

Н Е М А Т О Ц И Д И

№	Продукт, фирма	Активно вещество	Концентрация (доза) за употреба	Култура, вредител, при които се прилага продуктът	ЛД ₅₀ мг/кг орално за плъх	Карантинен срок в дни	Категория за употреба
1.	БАЗАМИД ГРАНУЛАТ Канешо Сойл Тритмънт -Удостоверение № 144/05.02.2004 г.г.	980 г/кг дазомет	50-70 кг/дка	галови нематоди по оранжерийни домати (45-50 дни преди засаждане)	520	45-50 при почв. влага 70-80% от ППВ	1
2.	БИО АКТ ВГ Профита -Удостоверение за разрешаване № 74/26.01.2004 г.	спори на гъбата <i>Raecilomices lilacinus</i> щам 251, титър 1x10 ¹⁰ жизнени спори на гр. продукт	0,4 кг/дка или 0,2 г/растение, но не повече от 0,4 кг/дка 5-10 г/100 растения 0,2 г/растение с 200-250 мл вода	галови нематоди по оранжерийни зеленчуци - домати, краставици, тиквички, пипер, приложен по схема: 1. Третиране на почвата 14 дни преди засаждане - напръсква се с 10-50 л работен разтвор и се инкорпорира на 10-15 см. 2. Третиране на разсадите непосредствено преди засаждане 3. Приложение след засаждането- 6 седмици след засаждането и последващи третирания през 6-8 седмици.			
3.	ВИДЕЙТ 10 Г ДюПонт ИО -Удостоверение № 0572-3/25.10.2013 г Валидно до: 25.01.2023 г.	100 г/кг оксамил	25 кг/ха	-нематоди по моркови прилага се при засаждане (браздово)-	34	75 дни-морков; 84 дни-Картоф и патладжан; За тютюн и домати не се налага	1
			30 кг/ха	-галови нематоди по патладжан, прилага се при засаждане (браздово)			
			45-55 кг/ха	-галови нематоди по патладжан, прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата			
			40 кг/ха	-цистообразуващи нематоди по картофи (ранни), прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата			

			40-55 кг/ха	-цистообразуващи нематоди по картофи (основна култура), прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата			
			30 кг/ха	-галови нематоди по домати, прилага се при засаждане (браздово)			
			45-55 кг/ха	-галови нематоди по домати, прилага се при засаждане (браздово).			
			30 кг/ха	-галови нематоди по тютюн, прилага се при засаждане (браздово)			
			42,5-55 кг/ха	-галови нематоди по тютюн, прилага се преди засаждане, с инкорпориране на 10 см дълбочина в почвата.			
4.	ВИДЕЙТ 10 Л ДюПонт ИО -Удостоверение за разрешаване № 0573-ПРЗ- 2 /22.05.2013г. Валидно до: 29.04.2023 г..	100 г/л оксамил	1-2 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по пипер, Прилага се веднага след засаждане. Брой приложения: 1	41	домати, патладжан – 28 дни, пипер – 35 дни, краставици – 50 дни	1
			1 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по пипер . Прилага се 10-14 дни след засаждане (ВВСН 11) до 42 дни след засаждането (ВВСН 62). Брой приложения: 1-2			
			1-2 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по патладжан, Прилага се веднага след засаждане. Брой приложения: 1			
			1 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по патладжан, Прилага се 10-14 дни след засаждане (ВВСН 11) до 42 дни след засаждането (ВВСН 61). Брой приложения от 1-3			
			1-2 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по краставици, Прилага се веднага след засаждане. Брой приложения: 1			
			1 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по краставици, Прилага се от 10 дни до 14 дни след засаждане (ВВСН 11). Брой приложения: 1			
			1-2 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по домати (вкл. чери домати). Прилага се веднага след засаждане. Брой приложения: 1			

			1 л/дка	Нематоди (<i>Meloidogyne sp.</i>) по домати (вкл. чери домати). Прилага се 10-14 дни след разсаждане (ВВСН 11) до 42 дни след разсаждането (ВВСН 61). Брой приложения: 1-3			
5.	МОКАП 10 Г Байер Кропсайанс -Удостоверение за продължаване на разрешението № 286/04.02.2005 г.	100 г/кг етопрофос	5-8 кг/дка	галови нематоди по оранжерийни домати (в зависимост от заразеността на почвата - внесен една седмица преди разсаждането)	62	14	1
			15-20 кг/дка	галови нематоди по тютюна (в зависи-мост от степента на заразата - внесен една седмица преди разсаждането)			
6.	НEMACОЛ 510 Таминко -Удостоверение за разрешаване № 363/08.06.2006 г.	510 г/л метам содиум	80-100 л/дка	галови нематоди, почвени патогени (Фузариум, Вертицилийум, Корки рут, Питиум, Ризоктония Склеротиния) и плевелни семена за обеззаразяване на почва (в отсъствие на растения) в стоманено-стъклени оранжерии, като по-високата доза се прилага при преобладаващо нападение от почвени патогени. Внася се посредством апликатор с валиране, както и чрез системите за капково напояване, с последващо валиране или покриване с полиетилен	896	-	1
7.	НEMАТОРИН 10 Г Ай Ес Кей Биосайънсис Юръп -Удостоверение № 01117-ПРЗ/ 01.02.2011г. Валидно до: 18.01.2021 г.	100 г/кг фостиазат	1,5 кг/дка	картофена цистообразуваща нематода при картофи		120	Картоф и домати не се изисква
			3 кг/дка	-галообразуващи нематоди при домати			
8.	РЕЙСАН 51 Лайнко -Удостоверение за разрешаване № 524/12.07.2007 г. -Удостоверение № 524/12.07.2007 г.	420 г/л метам содиум	100 л/дка.	галови нематоди при оранжерийни култури	1000	-	1

